未婚男性의 性行態에 관한 硏究

林鍾權
金惠蓮
張東鉉
金柱亨
金漢敬

韓國保健社會硏究院

머 리 말

급속한 産業化와 都市化, 性文化의 開放, 性衝動을 유발하는 매스 미디어의 광범위한 보급과 더불어 性에 대한 무지와 적절한 青少年 性敎育의 부재는 우리 나라 青少年들의 무분별한 性行態를 급속하게 증가시키고 있다. 이것은 결과적으로 青少年 자신의 生殖保健問題 뿐만 아니라 性病 및 AIDS 感染과 傳播, 不願妊娠에 의한 未婚女性의 인공임신중절, 未婚母의 발생을 증가시켜 社會的인 문제를 惹起하고 있다. 이러한 문제들을 青少年 자신들의 노력과 이를 지원하는 社會的인 서비스를 통해서 豫防하지 않는 한 더욱 加重될 것으로 보인다.

한편 우리 나라의 性文化는 性에 관한 문제의 露出이 금기시 되고 있는 반면, 男性들의 性行爲에 대하여는 女性에게서와는 달리 상당히 許容되는 문화를 유지하여 왔기 때문에 특히 男性들에 대한 性敎育은 적극적으로 실시되지 못하였고 學校 및 職場과 家庭에서 실시되어 온 性敎育은 거의 없거나 극히 皮相的이며 지속적이지 못한 실정이다. 뿐만 아니라 젊은 世代들이 보호받지 못하는 위험한 性行爲에 어느 정도 露出되어 있는지, 우리의 社會 文化的인 배경에서 어느 要因들이 性行態에 중요하게 영향을 미치고 있는지에 관해서 거의 조사연구가 되어 오지 않았다. 이러한 기본 情報와 資料의 부족은 社會敎育 및 保健政策 차원에서 적절하고 구체적인 프로그램을 開發하고 施策을 펴지 못하는 障碍要因이 되어 왔다.

이와 같은 背景에서 本 硏究는 특히 未婚 勤勞男性들에 대한 性行態 연구가 전무한 상태에서 미혼남성의 性行態와 性病感染에 관하여 역점을 두고 영향을 미치는 要因들을 보다 심도 있게 把握한 것으로써 앞으로 青少年의 性問題와 性病豫防을 위한 對策樹立에 유용하게 활용되고, 아울러 전세계적으로 問題가 되고 있는 AIDS 管理對策 樹立에 基礎資料를 제시해 줄 것으로 기대된다.

끝으로 본 연구를 위하여 財政支援을 해 주신 세계보건기구에 感謝를 표하며, 資料蒐集에 적극적으로 協助하여 주신 조사대상 産業体의 勞動組合 幹部들과 조사에 협조해 주신 産業体의 關係者, 조사 大學의 敎授님들께 심심한 사의를 표한다. 또한 本 硏究를 遂行한 硏究陣에게도 그 勞苦를 치하하는 바이다.

1994年 9月

韓國保健社會硏究院
院長 延 河 淸

目　　次

머 리 말

第 1 章　序　論 1

第 1 節　研究背景 및 必要性 1

第 2 節　研究目的 4

第 2 章　先行研究 및 분석틀 5

第 1 節　先行研究 및 理論的 背景 5

1. 性行爲 經驗의 測定(性交經驗率) 5
2. 性病感染과 聯關된 行態 要因 6
3. 性行態와 關聯된 人口·社會學的 要因 8
4. 性行態와 關聯된 社會的·心理的 要因 9

第 2 節　健康行爲에 관한 理論的인 모델(분석틀) 15

1. Precede-Proceed 모델(Green 모델) 16
2. 生涯의 週期에 따른 發達過程 疫學모델(발전역학모델) 19
3. Social Action Theory(SAT) 21
4. 각 모델의 長短點 23
5. 性行態 分析을 위한 統合모델 23

第 3 章　研究方法 25

第 1 節　標本抽出 및 調査方法 25

1. 標本抽出 및 資料蒐集 25
2. 調査票 設計 및 調査內容 29
3. 調査實施 및 結果集計 31
4. 로지스틱 회귀분석에 活用된 變數 31

第 2 節 分析 方法 38
1. 信賴度(Reliability) 38
2. 要因分析(Factor Analysis) 40
3. 로지스틱 회귀분석(Logistic Regression) 42
第 3 節 硏究의 制限點 43

第 4 章 性行態의 一般 樣相 48
第 1 節 應答者의 社會·人口學的 特性 48
1. 應答者의 社會·人口學的 特性 48
2. 吸煙 및 飮酒 實態 53
第 2 節 性에 關한 知識 55
1. 性敎育 履修 現況 55
2. 性에 대한 知識 60
3. 性에 관한 知識 및 相談 要求度 66
第 3 節 性에 관한 態度 69
第 4 節 性行爲 經驗 實態 77
1. 異性交際 經驗 77
2. 性行爲 經驗 77
3. 淪落女性과의 性行爲 86
4. 콘돔 使用實態 92
5. 婚前 同居實態 95
6. 相對 女性의 婚前 姙娠 經驗 98
第 5 節 性病感染 經驗實態 103
1. 性病感染 實態 104
2. 社會·人口學的 特性別 性病感染 樣相 112

第 5 章　性行態에 影響을 미치는 要因 分析 118
第 1 節　性經驗에 대한 二變量 로지스틱 회귀분석 118
1. 一般(全體) 性經驗 118
2. 淪落女性과의 性經驗 123
3. 女子親舊와의 性經驗 128
4. 우연히 만난 女子와의 性經驗 133
第 2 節　性經驗에 대한 多變量 로지스틱 회귀분석 138
1. 一般(全體) 性經驗 138
2. 淪落女性과의 性經驗 142
3. 女子親舊와의 性經驗 145
4. 우연히 만난 女子와의 性經驗 147

第 6 章　要約 및 結論 150
第 1 節　要　約 150
第 2 節　論　議 158
第 3 節　政策建議 167

參考文獻 177

附　錄 187
1. 未婚 男性勤勞者 調査票 189
2. 未婚 男子大學生 調査票 205

表 目 次

표 2-1. 既存 文獻에 나타난 婚前 性交經驗 6
표 3-1. 勤勞者 調査結果의 標本規模 27
표 3-2. 大學生 調査結果의 標本規模 29
표 3-3. 大學別 學年別 標本數 29
표 3-4. 性行態 및 性病의 關聯要因 分析에 사용된 變數 35
표 4-1. 應答者의 一般特性 49
표 4-2. 應答者의 經濟的 特性 52
표 4-3. 應答者의 吸煙率 53
표 4-4. 應答者의 飮酒 實態 54
표 4-5. 應答者의 性敎育 履修 實態 56
표 4-6. 應答者의 性敎育 履修 程度 및 敎育評價 57
표 4-7. 性敎育效果에 대한 自己評價(勤勞者) 58
표 4-8. 性敎育效果에 대한 自己評價 (大學生) 59
표 4-9. 避妊方法에 대한 知識 60
표 4-10. 避妊方法에 대한 知識 情報源 61
표 4-11. 應答者의 性에 관한 知識 水準(認知率) 62
표 4-12. 性病傳染 및 性病豫防에 대한 認知率 63
표 4-13. 性病에 대한 知識 情報源 64
표 4-14. AIDS에 대한 知識水準 64
표 4-15. AIDS에 대한 知識 情報源 65
표 4-16. AIDS의 深刻性에 대한 態度 66
표 4-17. 本人의 AIDS 感染 可能性에 대한 態度(大學生) 66
표 4-18. 性에 대한 知識 要求度 및 性問題 相談希望 與否 67
표 4-19. 應答者의 特性別 性知識 要求 68

표 4-20. 應答者가 원하는 性敎育 內容別 要求度 69
표 4-21. 婚前 純潔에 대한 態度 70
표 4-22. 勤勞者의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(남자측) 71
표 4-23. 大學生의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(남자측) 72
표 4-24. 勤勞者의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(여자측) 74
표 4-25. 大學生의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(여자측) 75
표 4-26. 性行爲 對象別 婚前 性行爲에 대한 態度 76
표 4-27. 婚前妊娠의 結果에 대한 態度 76
표 4-28. 同性戀愛 및 混宿에 대한 態度 77
표 4-29. 異性交際 經驗實態 78
표 4-30. 應答者의 一般特性別 性行爲 經驗率 80
표 4-31. 應答者의 性에 대한 知識과 性行爲 經驗率 81
표 4-32. 應答者의 性行爲에 대한 態度別 性行爲 經驗率 82
표 4-33. 應答者의 異性交際와 性行爲 經驗率 83
표 4-34. 應答者의 첫 性行爲 經驗 實態 84
표 4-35. 첫 性行爲 대상별 飮酒與否 및 避妊使用 實態 85
표 4-36. 淪落女性 類型別 性行爲 經驗率 86
표 4-37. 應答者의 一般特性別 淪落女性과의 性行爲 經驗率 88
표 4-38. 婚前純潔 및 性行爲에 대한 態度別 淪落女性과의 性交經驗率 89
표 4-39. 月平均 收入 및 용돈사용에 따른 淪落女性과의 性行爲 經驗率 90
표 4-40. 淪落女性과의 性行爲 實態 91
표 4-41. 勤勞者의 性行爲 대상 및 시기별 콘돔사용 實態 93
표 4-42. 大學生의 性行爲 대상 및 시기별 콘돔사용 實態 94
표 4-43. 應答者의 異性과 同居 經驗 與否 96
표 4-44. 應答者의 特性別 同居 經驗 實態 97
표 4-45. 應答者의 性行爲 相對女性의 妊娠經驗實態 99

표 4-46. 勤勞者의 特性別 性行爲 相對女性의 姙娠 및 出産經驗實態 101
표 4-47. 大學生의 特性別 性行爲 相對女性의 姙娠 및 出産經驗實態 102
표 4-48. 性病感染 經驗實態 및 感染時 飮酒 및 콘돔사용실태 106
표 4-49. 性病感染源 및 治療實態 107
표 4-50. 性病 感染源別 性行爲 當時 콘돔사용 및 飮酒實態 108
표 4-51. 性病感染 當時의 飮酒狀態別 콘돔사용 實態 109
표 4-52. 性行爲 對象者別 勤勞者의 性病感染 經驗率 110
표 4-53. 最近의 性行爲 時期別 勤勞者의 性病感染 經驗率 110
표 4-54. 淪落女性 類型別 淪落女性과의 性行爲經驗者의 性病感染率 111
표 4-55. 勤勞者의 諸特性別 性病感染 經驗率 114
표 4-56. 大學生의 諸特性別 性病感染 經驗率 115
표 4-57. 勤勞者의 知識, 態度 및 性行爲 經驗과 性病感染 經驗率 116
표 4-58. 大學生의 知識, 態度 및 性行爲 經驗과 性病感染 經驗率 117
표 5-1. 一般(全體) 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者) 119
표 5-2. 一般(全體) 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(大學生) 121
표 5-3. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者) 125
표 5-4. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(大學生) 126
표 5-5. 女子친구와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者) 130
표 5-6. 女子친구와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(大學生) 131

표 5-7. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 이변량
로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者) 134
표 5-8. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 이변량
로지스틱 회귀분석 結果(大學生) 136
표 5-9. 一般(全體) 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(勤勞者) 140
표 5-10. 一般(全體) 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(大學生) 141
표 5-11. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(勤勞者) 143
표 5-12. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(大學生) 144
표 5-13. 女子친구와의 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(勤勞者) 145
표 5-14. 女子친구와의 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱
회귀분석 結果(大學生) 147
표 5-15. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 다변량
로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者) 148
표 5-16. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 다변량
로지스틱 회귀분석 結果(大學生) 149

그 림 目 次

그림 2-1. 健康增進과 評價를 위한 Precede-Proceed 모델 16
그림 2-2. 生涯의 週期에 따른 發達過程 疫學모델 20
그림 2-3. Social Action Theory(SAT) 모델 22
그림 2-4. 性行態 分析을 위한 統合모델 24
그림 3-1. 調査 基本設計 25

第 1 章　序　論

第 1 節　硏究背景 및 必要性

오늘날 靑少年期는 과거에 비해 社會的 心理的 成熟에 앞서 身體的인 成熟이 빨라져서 生殖能力을 갖추는 시기가 앞당겨지는 한편, 結婚年齡은 연장되면서 점점 그 기간이 길어지고 있다. 동시에 과거의 傳統的인 價値觀과 態度가 바뀌고, 家族의 影響力이 감소되고 産業化와 人口移動이 매우 보편화되면서 젊은 계층은 보다 쉽게 매스 미디어에 露出되고 있다. 젊은이들의 性行態는 사회적인 影響에 매우 敏感하게 영향을 받는데 이러한 모든 狀況들이 社會全般의 變化와 더불어 性行態에도 영향을 미치고 있다.

특히 우리 나라는 2次大戰 以後의 西洋文物의 流入과 1960年代 이후의 急速한 産業化, 都市化가 가세하여 젊은이들 사이의 性文化는 傳統的인 관념에서 벗어나 현저하게 開放風潮를 보이고 있으며, 무분별한 性接觸에 따라 性病의 危險이 높아지고 있다.

靑少年期는 疾病의 罹患이 老人層이나 年少層보다 生理學的으로 낮은 時期이기 때문에 청소년의 健康問題 중 가장 중요한 문제는 다음 세대의 生産을 위한 生殖保健과 그로 인해 派生되는 문제라고 要約될 수 있다. 청소년은 다음 세대의 父母가 되는 세대로서 개개인이 健康한 어린이를 養育할 수 있는 충분한 計劃을 습득하고, 자신의 健康에 대한 潛在力을 키워야 하는 時期이다.

全世界的으로 願하지 않는 姙娠과 人工姙娠中絶, 性病의 感染, 出産 어린이의 抛棄 및 遺棄 등의 문제가 결혼전의 靑少年層에서 증가하고 있어 젊은이들의 막대한 에너지와 創意力을 消耗하고 있다. 반면 이러한 문제들은 젊은 세대 自身들의 努力과 이를 支援하는 社會的인 서비스를 통해서 상당

부분 豫防할 수 있다. 世界保健總會(World Health Assembly)에서는 청소년 保健을 1990-1995년 기간중의 WHO의 8번째 주요과제로 선택하고 早期姙娠을 防止하고 청소년에게 接近可能한 性敎育과 家族計劃指導를 실시하도록 促求하고 있으며, 이러한 배경에서 WHO는 젊은이들의 성행태에 영향을 미치는 要因들을 밝혀내고 이러한 知識과 情報를 정확하게 提示할 수 있는 硏究의 必要性을 强調하고 있다(WHO, 1989).

많은 사회에서 靑少年의 性에 관한 사항은 禁忌(taboo)로 되어 있어 일반적으로 어느 정도 청소년들이 여러 가지 危險하고 保護되지 않는 性行動에 처해 있는지에 대해 무지한 것이 세계적인 現況이다. 청소년에게는 이에 관한 有用한 知識과 情報, 避妊器具 등에 접근하기가 어렵다. 더군다나 衝動的인 性行爲와 避妊方法의 비사용은 알콜과 藥物濫用 등에 의해 더욱 惡化되는 수가 많다. 不願姙娠은 보통 不法的이고 秘密리에 이루어지는 人工姙娠中絶로 귀착된다. 姙娠이 지속되는 경우라도 가능한 한 감추어져야 하기 때문에 적절한 産前管理를 받지 못함으로써 母性과 胎兒에게 커다란 健康威脅으로 작용한다.

또 한가지 문제는 잘 알려지지 않고 保護되지 않는 靑少年의 性行爲는 최근에 와서는 致命的인 AIDS를 포함한 性病에 대한 露出을 增加시킨다. 젊은이들은 性病에 관해서 무지하고 적절한 情報와 指針이 부족하기 때문에 性病의 豫防을 위한 적절한 措置를 취하지 못하며 適期에 專門的인 醫療를 받지 못하고 危險한 自家治療를 취하기 쉽다. 그 결과 그들 자신 및 가족 나아가서 社會에 長期的으로 影響을 미치는 不姙, 永久的인 心理的 缺陷과 심지어는 死亡까지 招來할 수 있다.

우리 나라는 1962년 導入된 家族計劃事業이 出産率을 減少시켜 人口代置水準以下의 出産率(1990년 TFR 1.6)에 到達하여 人口를 抑制하는데는 큰 성공을 거두었으나(공세권 외, 1992), 家族計劃事業이 女子를 주 사업대상으로 하였고, 男性에 대한 프로그램과 사업을 度外視하였기 때문에 높은 性病感染, 未婚女性의 높은 人工流産率, 남성들의 避妊에 대한 낮은 지식수준을

나타내어 우리 나라의 家族計劃事業이 남성집단에 대해서는 成功的이라고 評價하기는 어렵다.

性病診療의 상당부분이 露出되지 않고 많은 성병환자들이 藥局 등에서 賣藥을 통해 解決하고 있으며, 性病이 增加趨勢에 있어 1977년 이래 국가에서 性病 治療를 醫療保護 1종 對象으로 취급하여 醫療保護 基金으로 保健所 및 指定機關에서 無料로 治療하도록 하고 있다(임종권 외, 1990). 따라서 性病患者의 상당수가 의료보호 수혜자로서 치료를 받고 있을 것으로 보이는데, 1993년 醫療保護 診療件數 750만건중 성병이 차지하는 비율은 42%로 172,163건에 이르고 있다(보사부, 1994).

일반 의료기관을 통하여 진료비 請求가 이루어진 性病患者의 推移를 보면 1989년 전국민의료보험이 導入된 이후의 入院 및 外來 性病診療件數는 1990년 208,421건, 1991년 223,968건, 1992년 225,941건으로 증가하고 있으며, 특히 25-29歲의 男子에서 성병빈도가 높은 것으로 나타나고 있다(의료보험연합회, 1990, 1991, 1992).

그러나 아직까지 우리 나라의 靑少年 및 젊은 남성들의 性病有病水準과 感染의 經路 및 治療狀態에 대해서는 把握되어 있지 않으며, 일반적으로 젊은 남성들은 性病의 感染을 防止할 수 있는 相談所와 治療場所에 대해서 잘 모르고 있는 상태로 특별한 關心이 주어져야 함에도 불구하고 政策當事者에게 필요한 성병에 관한 關聯資料가 부족하여 이들을 위한 適切한 프로그램과 서비스를 開發하지 못하고 있는 걸림돌이 되어 있다.

특히 많은 외국의 연구에서 청소년을 비롯한 젊은이들의 危險한 性行爲 및 性病感染이 社會經濟的으로 劣惡한 계층에서 더 높게 發生한다는 것이 提示되고 있는데 우리 나라에서 相對的으로 性病과 避妊에 대한 知識水準이 낮고, 부모의 保護를 떠나서 생활함으로써 性行態에 대하여 危險度가 높은 集團이 될 수 있는 未婚의 勤勞者 階層에 대한 실태는 女性을 대상으로 한 調査 몇 편 있었을 뿐 남성측에 대한 조사는 전혀 이루어지지 못해 왔다.

젊은이들의 性行態는 社會的인 影響에 매우 敏感하게 영향을 받기 때문에 성행태에 관한 知識과 관련 技術을 강화하는 것이 매우 有效하며, 또한 적절한 서비스가 젊은 사람들의 具體的인 要求에 맞게 提供될 수 있도록 많은 努力이 傾注되어야 한다.

따라서 本 硏究에서는 우리 나라 靑少年 中 後期 청소년에 속하는 젊은 男性들 중에서 社會經濟的 측면에서 성행태의 危險이 높을 것으로 考慮되고 있는 工團地域의 未婚의 男性勤勞者들을 1차 대상으로 하였으며 이들과 對照되는 미혼 남성집단인 大學生을 2차 대상으로 하여 이들 두 集團의 性에 대한 知識과 態度 및 性行爲와 性病感染의 實態를 把握하고, 이에 影響을 미치는 人口, 社會, 心理的인 要因의 影響을 分析하였다. 본 연구는 結婚前 靑少年 集團의 구체적인 요구에 맞는 效率的이고 效果的인 社會的 서비스와 政策 등의 具體的인 介入方案을 樹立하고 實踐하는데 필요한 基礎資料를 提供하기 위하여 試圖되었다.

第 2 節　硏究目的

本 硏究는 後期 靑少年 集團인 未婚男性 특히 勤勞階層과 이에 對照되는 집단인 大學生의 性病有病率을 정확히 把握하고 이와 관련된 性行態의 樣相을 정확히 파악하여 性病感染을 防止할 수 있는 적절한 措置를 講究하기 위한 資料를 산출하기 위하여 다음과 같은 目的을 가지고 試圖되었다.

1. 未婚 男性 工團 勤勞者와 大學生의 성(性) 및 性病에 관한 知識, 態度, 行爲(성행태: KAP on sex-related behaviors)를 정확히 파악하고,
2. 未婚 男性 工團 勤勞者와 大學生의 性行態와 이와 관련된 人口社會學 및 心理學的 變因을 比較 分析하며,
3. 상기결과를 基礎로 하여, 향후 未婚 男性을 위한 性敎育 및 生殖保健 增進을 위한 具體的인 改善方案을 提示한다.

第 2 章 先行硏究 및 分析틀

第 1 節 先行硏究 및 理論的 背景

婚前 性行爲는 대부분의 文化圈에서 일종의 禁忌(taboos)사항이기 때문에 性行爲에 관한 體系的인 硏究는 최근에 와서야 시작되었다. 本 章에서는 전세계적으로 젊은이들이 오늘날 처하고 있는 性病의 威脅과 性行爲에 대하여 行動科學 및 心理學的 관점에서 논의된 外國의 實證的인 資料와 理論的인 背景에 대한 觀點을 提示하고자 하며, 아울러 그간 우리 나라에서 이루어진 性에 관한 調査硏究 結果를 提示하고자 한다.

1. 性行爲 經驗의 測定(性交經驗率)

結婚 前의 性行爲 經驗은 文化圈과 年齡에 따라 큰 差異가 있기 때문에 여기서는 우리 나라의 旣存 硏究結果를 간단히 要約하였다.

그간 이루어진 硏究는 性에 대한 態度에 관한 조사는 많았으나, 실제 性行爲 經驗을 조사한 硏究는 制限되어 있다. 즉 勤勞者 집단에서는 女性을 대상으로 한 조사가 몇 편 있으며, 男性에 대해서는 中.高等學生 및 大學生 等 學生에 국한된 조사가 있었을 뿐으로 대상자 接近이 難易한 勤勞者 集團에 대해서는 調査가 아직까지 이루어지지 않았다.

<表 2-1>을 보면 性交經驗率은 增加하고 있으나 조사자간 또 조사대상간에 差異가 큰 것으로 나타나고 있다.

外國에서도 性交經驗에 대한 조사결과는 調査方法의 妥當性과 調査道具의 信賴度 및 應答率에 대해 많은 論難이 提起되고 있는 부문이다.

表 2-1. 既存 文獻에 나타난 婚前 性交經驗

	조사년도	조사대상	성교경험률(%)	
			남 자	여 자
1)	1965	여자고등학생	-	3.6 (4,604)
2)	1971	남자 중고등학생	18.5 (2,154)	-
3)	1975	여자고등학생	-	6.2 (603)
4)	1977	대학생	35.9 (1,445)	4.1 (665)
5)	1981	고등학생	27.7 (610)	14.5 (600)
6)	1984	미혼근로여성	-	37.8 (918)
7)	1988	고등학생	11.7(145,012)	2.8(23,585)
8)	1988	중학생	1.4(104,853)	0.2(99,462)
9)	1990	미혼근로여성	-	21.6 (583)

* ( )의 숫자는 표본수임.

자료:

1) 서봉연 외, "순결교육을 위한 기초조사", 중앙의학연구소 조사연구, 제38집, 1965
2) 강준상, "중고교학생의 성에 대한 태도", 가족계획, 대한가족계획협회, 1971.
3) 구본석, 이성교제에 관한 조사연구, 고대교육대학원 석사학위논문, 1975.
4) 대한가족계획협회, 대학생의 가족계획 및 성에 대한 태도, 1977.
5) 조정숙, 고교생의 성교육 필요성에 관한 고찰, 동국대 교육대학원 석사학위논문, 1981.
6) 홍문식 외, 미혼근로여성의 인구 및 성에 대한 지식, 태도 조사연구, 1984.,
7·8) 김한경 외, 한국 청소년들의 생식보건에 관한 연구(Ⅰ), 1988.
9) 김한경 외, 산업체 가족계획 및 성교육 프로그램 효과 및 전략개발 연구, 대한가족계획협회, 1991.

2. 性病感染과 聯關된 行態 要因

우리 나라에서 性行態에 관한 硏究는 그리 이루어지지 않았으며, 그것도 대부분이 一部地域의 淪落女性에 국한하여 이루어진 경우에 치우쳐 우리 나라 全體의 性病有病 水準과 變化推移는 把握되어 있지 않다.

一部 性病診療所의 성병환자 335명을 對象으로 한 調査에서 남자의 경우 67.1%가 29세 이하였으며 대부분 賣春婦를 통해서 感染된 것으로 나타났다. 또한 65.8%가 未婚者였으며 미혼자의 2.8%만이 콘돔을 使用한 적이 있는 것으로 調査되었다(임종권 외, 1990).

1991년 12월 김포공항 면세구역에서 海外旅行을 나가는 男性 旅行者 571명(미혼, 기혼 포함)에게 自己記錄式(self-administered)으로 조사한 硏究結果는 과거 5년간 性的으로 활발했던 사람이 81%였으며, 그 중 24%는 淪落女性을 接觸하였으며, 46%는 두명 이상(평균 6명)의 性相對(multiple partners)와 性行爲를 경험한 것으로 나타났으며, 44%는 과거 콘돔을 使用한 적이 없으며 14%만이 항상 콘돔을 사용하는 것으로 調査되어 많은 우리 나라 남성들이 性病感染 危險이 높은 성행위에 露出되어 있을 可能性을 示唆하는 結果를 보이고 있다(Choi et al., 1992).

性病과 淪落女性과의 性接觸 관계는 성병의 原因菌이 알려지기 전부터 널리 알려져 있었다. 북미지역과 유럽에서는 일반 異性間의 性交에서는 梅毒이 극히 드물었기 때문에 賣春婦로부터 유래하는 것으로 믿어왔다. 淋疾의 有病率도 賣春婦에서 매우 높아 네덜란드의 Groningen에서 10%, Nairobi의 일부 賣春婦에서 50%로서 전세계적으로 淋疾의 發病은 淪落女性과 그들의 顧客을 통해 전파되는 것으로 알려져 왔다(Plummer et al., 1990).

1960년대 以後 우리 나라의 梅毒 有病率에 대한 조사결과는 對象群에 따라 상당한 차이를 보이는데 接待婦나 淪落女性의 VDRL 陽性率은 여러 연구에서 5.6-25.2%에 이르며 1985-86년 일부 지역의 保健所 登錄者에서는 3.0% (N=6,210)를 보였다(강정원 외, 1988). 1990년 465명의 淪落女性에 대한 조사결과는 거의 100%의 윤락여성이 性病에 感染된 旣往歷을 가지고 있으며, 70.5%가 淋疾에 감염된 經驗이 있는 것으로 나타났다(임종권 외, 1990). 1993년 442명의 淪落女性에 대한 조사결과에서도 性病의 感染 經驗率은 梅毒 5.2%, 淋疾 36.2%로 나타났다(손명세 외, 1993).

AIDS에 관해서는 태국에서 최근 조사된 硏究結果 賣春婦(나이트 클럽, 바, 마사지 업소, 커피샵, 콜걸 등)와 性接觸이 보다 頻繁한 男性과 HIV Type 1 陽性反應 사이에는 직접적이고도 統計的으로 의미 있는 선형관계가 있음을 보여 주었으며, 매주 윤락여성과 接觸하는 경우에서는 32%에 이르는 높은 HIV Type 1 陽性 反應을 나타냈다(Celentano et al., 1992, p.3).

콘돔은 膣性交(vaginal intercourse)에서 성병예방 效果가 93% 이상이 되지못하지만(Biglan et al., 1990), 과거 한달간 콘돔을 使用한 사람에게서 性病의 感染을 32% 減少시키는 것으로 알려졌다(Upchurch et al., 1992).

3. 性行態와 關聯된 人口·社會學的 要因

젊음 자체는 間接的으로 活潑한 性行態와 그와 관련된 성병감염으로 이끄는 間接的인 危險要因이라고 알려져 있다(Aral and Holmes, 1990). 특히 經濟形便을 나타내는 收入의 차이는 젊은 남성들에게 있어서 淪落女性과의 性接觸 頻度에 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 早期 異性交際도 頻繁한 異性交際가 잦은 성접촉의 可能性을 부여하기 때문에 早期 性交와 연관되어 있다. 지속적인 異性交際의 경험을 통해서 많은 靑少年들이 愛撫나 性交 等 보다 進展된 性接觸을 가지는 것으로 알려져 있다(Chilman, 1983). 한 연구에서는 大學 以上의 높은 敎育水準을 가진 집단에 비해 大學敎育을 받지 못한 男女에서 과거 1년간 및 과거 한달간 보다 많은 異性과 性接觸을 가진 것으로 나타났다(Schwartz and Gilmore, 1990).

前記한 태국의 조사에서도 淪落女性과의 接觸은 敎育水準이 낮은 階層, 피고용자 계층, 異性의 친구가 있는 階層, 性交 經驗이 빠른 계층에서 보다 頻繁한 것으로 나타났다(Celentano, et al., 1992).

많은 연구가 宗敎性이 젊은이에게 早期 性行爲 경험 또는 성경험의 遲延에 影響을 미치는 점을 밝히고 있다. 宗敎的인 觀念은 성에 대한 態度와 異性과의 성경험에 否定的인 영향을 뚜렷이 미치는 것으로 나타나고 있다.

즉 宗敎性이 强한 사람일수록 성에 대해 덜 許容的이며 성경험이 적은 것으로 나타나고 있다(Zucherman, 1975, p.13).

4. 性行態와 關聯된 社會的·心理的 要因

가. 個人의 性向

性的으로 抑制力이 강한 사람과 비교하여 그렇지 않은 사람은 性經驗을 보다 일찍 가지며, 관계에 있어 深刻하지 않으며, 동시에 한명 이상과 관계를 가지며, 여러 명의 性相對者를 추구하는 경향이 있다고 알려져 있다(NIAAA, 1992). 절제가 없는 경향은 性格이나 性에 대한 個人的인 態度, 또는 이 두 요소 모두에서 기인된다. 感覺的인 것을 追求하는 性向은 타고난 氣質을 이해하는 것이 중요하다. 일반적으로, 多樣하고 신기한, 복잡한 感覺을 추구하며, 이를 위해 身體的·社會的 危險도 감수할 意思가 있는 것을 '性向'이라고 정의한다.

Zucherman 등의 연구는 男女 모두에서 센세이션을 추구하는 사람이 藥物使用, 飮酒, 다양한 성경험을 보다 많이 하는 것으로 나타나고 있으며(Zucherman, 1972, p.309), 그들은 보다 多樣한 성상대자와 多樣한 성행위를 가지는 것으로 나타났다(Horvath and Zuckerman, 1993).

나. 父母의 養育(parenting)과 父母養育의 技術

Patterson과 Stouthamer-Loeber는 父母의 養育(parenting) 즉 부모가 자녀를 모니터링하고 規律을 정하고 문제해결을 해 주며 肯定的 反應을 주는 것은 상호 相關關係가 있다는 것을 밝혔다. 여기서 規律을 정하는 것이란 부모가 자녀의 否定的인 行動을 줄이기 위한 일련의 施行이며, 문제 해결이란 부모와 자녀가 葛藤을 같이 해결해 나가는 一連의 상호작용이고, 肯定的인 반응이란 자녀의 긍정적인 行動에 대한 부모의 반응이 將來에 同一行動을 다시 誘導하는 것을 의미한다. 모니터링에 대해서 Patterson과 Stouthamer-Loeber는 자녀의 모니터링은 效果的으로 家族을 관리하기 위

해서는 必需的인 것이나 家族管理에 관련된 여러 變數들은 자녀의 成長過程에서 상이한 役割을 한다고 하였다. 예를 들면, 부모의 監督을 벗어난 시간이 늘어남에 따라 부모는 關聯된 規律을 바꿀 필요가 있다는 것이다. Baumrind(1985)는 어린 子女에게는 說明이 필요 없는 具體的인 指針을 내리고 이를 적용시키는 것이 適合하지만 成長發達 過程에서 權威에 대하여 疑問을 가지게 되는 靑少年 時期에는 적합하지 않음을 밝혔다.

이 방면의 연구결과들이 다소 모호하기는 하지만 몇몇 연구에서는 父母와의 緊密한 관계가 性行爲의 始作을 늦추는 作用을 한다고 보고 있다. 예를 들면, Jessor and Jessor(1975)은 十代의 靑少年과 그들의 부모의 價値觀과 비슷할수록 그들 사이에 보다 높은 紐帶感과 支持感을 가지며 젊은 사람들이 家庭과 紐帶感을 가질수록 性的으로 덜 활발하게 한다고 하였다. 그렇지만 부모와 자녀간의 對話(communication)가 일어나는 여러 가지 측면에 대한 연구 즉 부모와 커뮤니케이션을 몇 살 때 하는가, 이러한 커뮤니케이션이 자녀의 性行動 前 또는 後 中 언제 이루어지는 것이 效果的인가에 대해서는 具體的으로 연구가 이루어지지 않았다.

社會的인 관점에서 콘돔의 非使用 요인을 評價한 연구를 보면, 性交를 經驗했다고 보고한 靑少年 中에서 콘돔을 사용하지 않은 경향이 있는 그룹은 부모와의 對話와 만남이 부족한 경우에 많았다. DiClemente(1992)는 이러한 聯關性을 위험한 性行態(high risk-sexual behaviors)를 豫測할 수 있는 중요한 要因으로 보고 있다. 危險要因이 높은 성행태는 그 부모님과의 接觸이 별로 없고 부모님의 도움이 없는 청소년에게서 나타나기 쉽다. 靑少年의 危險한 성행위는 肯定的인 社會的 行動과 스스로 위험을 自招하지 않는 行動을 발달시키지 못한 데서 招來되는 것으로 알려져 있다. Ross(1990)는 4개의 西歐國家에서의 연구결과에서 父母와의 관계는 性病을 예측할 수 있는 중요한 變數라고 하였고, Morton도 知的이고 愛情이 가득한 부모님의 돌봄이 不足한 데에서 危險한 性行動이 초래될 수 있음을 지적하였다. 부모의 嚴格함이 보통인 청소년에 비하여 부모가 異性交際에 대

해 지나치게 엄격하여 많은 規制를 한다고 느끼는 청소년에서 性에 대한 태도와 性交經驗에 대해 自由奔放하였다. 그러나 대체로 부모의 規則과 嚴格性이 부족한 경우에는 性에 대한 태도나 性交經驗에 있어 自由奔放하였다.

부모나 家族要因은 性行態에 관한 同僚의 영향에도 영향을 미칠 수 있다. 經濟的으로 潤澤한 가정은 貧民地域에 사는 빈민가정의 부모보다 그들의 10대 子女들을 보다 잘 統制할 수 있다. 그것은 居住地와 學校를 선택할 때 早期에 성행위를 경험할 수 있는 危險要素들을 줄일 수 있기 때문이다 (Brooks-Gunn et al., 1989).

다. 同僚集團의 影響

社會의 영향은 그 屬性에 따라서 개인에게 變化를 促求하기도 하고 沮止시키기도 하고 弱化시키기도 한다. 예를 들어 同僚集團은 특정한 非行을 저지를 機會를 준다든지 혹은 反社會的인 行動을 하는 것을 合理化하고 動機를 誘發한다고 여겨진다.

한 硏究는 청소년 組織에서는 非行을 저지른 친구가 동료집단에서 상당한 優待를 받는 반면 사회에 順應한 행동에 대해서는 罰을 받는다는 것을 밝혔다(Patterson, 1989).

Hornick는 經路分析을 통해서 社會的 背景이 되는 特性變數들은 준거집단(즉 부모 또는 동료의 태도)과 個人의 心理的인 性向을 통해서 개인의 성에 대한 態度와 行爲에 영향을 미친다는 것을 觀察하였다(Newcomb and Bentler, 1988).

Schultz 등은 大學生의 婚前 性經驗에 대한 모델을 개발하기 위하여 6개 變數를 고려하였는데, 그 중에서 친구의 性經驗 變數가 自身의 성경험에 直接, 間接的으로 가장 큰 영향을 행사하는 것을 提示했다(Newcomb).

흔히 남자들은 性經驗을 갖도록 친구로부터 壓力을 받으며 성교경험에 대하여 친구들에게 이야기함으로써 社會的인 地位를 획득한다고 느낀다고 應答하고 있다(Christophers and Roosa, p.124, 1991).

라. 性行爲에 미치는 藥物使用 要因

많은 연구자들이 性行爲의 危險을 감수하는 가장 潛在力이 높은 要因으로 알콜을 꼽고 있다. 알콜과 性行爲와의 關聯性에 대해서는 歷史的 由來나 文學이나 大衆文化에서도 어느 정도 合意에 이르고 있다. 靑少年에게 알콜은 性的으로 과감성을 부여하며, 性에 대해 보다 奔放한 態度와 行動, 早期 性行爲 開始와 성행위 정도에 영향을 미친다. 그러나 性行爲 狀況에서 飮酒가 위험을 감수하는 성행위를 誘發하는 것인지, 아니면 알콜과 위험한 성행위가 個人의 性向과 生活樣式 變數와 같은 제3의 屬性과 連繫되어 있는 것인지에 대해서는 아직까지 명확하게 밝혀져 있지 않다(Cooper, 1992).

1) 飮酒와 문제시되는 性行爲

靑少年期는 健康에 미치는 여러 가지 行態를 習得하고 實行하기 시작하는 時期이다. Shaper는 위험감수(risk-taking)를 "젊은이들이 그들의 행위가 自身들이나 他人에게 미치는 短期的, 長期的 결과에 대하여 거의 또는 전혀 이해하지 못하고 저지르는 潛在的인 破壞行爲"라고 정의하고 있다.

연구자들은 한가지 形態의 위험한 行動을 자주 試圖하는 사람은 흔히 잠재적으로 위험한 行爲로 가득한 生活方式을 가지는 傾向이 있다고 밝히고 있다. 예를 들면 興味本位로 吸煙과 飮酒를 하는 것이 早期 性行爲 및 避妊을 실천하지 않는 것과 상당한 연관이 있는 것으로 나타나고 있다(Shafer, 1988).

연구자들은 "問題行動"은 한가지 행동이 다른 行爲를 誘發시키는 일련의 發達過程이 아닌가 推測하고 있다. 이와 같은 문제행동의 症狀은 性病感染과 매우 聯關이 있는 것으로 보인다. 어린 나이에 성행위를 시작하거나 성상대자를 여러명 가지는 청소년은 性病에 感染될 危險性이 매우 높다. 이 부분에 대해 연구자들은 어린 靑少年들이 危險한 行爲를 하는 것은 認知能力의 발달에 限界가 있기 때문일 수 있다는 論難도 제기되고 있다. 이러한

주장에 青少年들이 어른들과 같이 危險을 感知하는 能力은 있으나 어떤 결정을 내릴 때 결정의 결과로 인한 長·短點을 比較 分析할 수는 없다고 한다(Jessor and Jessor, 1977).

최근 無作爲抽出 조사대상에 대하여 연구한 Cooper와 Peirce는 알콜의 效果가 AIDS와 관련된 危險行爲와 직접적인 관계가 있음이 證明하는 자료를 밝혔다. 性交前이나 도중에 飮酒를 하지 않는 응답자에 비하여 飮酒를 한 응답자는 성대상자와 AIDS의 危險性에 대해서 이야기를 덜하며, 콘돔을 적게 사용하고, 選擇하는 성상대를 구별하지 않는 傾向이 있으며 여러 명의 性相對를 가지는 경향이 있는 것으로 나타났다(Cooper, 1992).

2) Disinhibitory Factor(解禁要因)로서의 飮酒

心理에 작용하는 藥物과 性的인 위험한 性行態와의 상호관계는 매우 복잡하다. Disinhibition은 보통 때는 여러 社會的 혹은 다른 要因들 때문에 억눌려 있던 행동을 "表出시키는" 것을 말한다. 많은 社會的, 法的, 醫學的 專門分野 연구에서 활동하는 연구자들은 알콜의 解禁效果가 性的 表現을 억누르는 社會的·文化的인 水門을 열어주는 可能性에 대해 큰 관심사항이 되고 있다(Woods and Mansfield, 1981, p.4).

알콜과 다른 藥物은 性行爲 상황을 변경시키기 때문에 '危險 變更要因'으로 간주되고 있다(Aral Holmes et al., 1990). 高危險 性行爲를 했다고 자신이 보고한 경우와 飮酒를 했다는 보고는 아주 명확한 相關關係를 보인다(Newcomb and Bentler, 1988). 그 외에도 많은 연구가 飮酒를 하지 않거나 줄이면 危險이 높은 性行爲를 감소시키는 것을 밝히고 있다(NIAAA, 1992).

① 認知에 障碍를 招來하는 알콜의 作用(飮酒의 藥物的인 效果)

다른 또 하나의 술의 效果는 어떤 것이 사회적으로 禁止되어 있는가를 判別하는 能力을 둔하게 하여 禁止되었던 행동을 하도록 만들어 주는 것이

다. 즉 抽象的인 思考能力을 弱하게 하고, 눈에 보이는 상황에만 關心이 集中되도록 하는 것이다. 하지만 술을 심하게 마시면 거의 모든 行動이 行態를 減少시키는 것이 확실하다는 것이 여러 行態 硏究에서 밝혀져 있다 (Crowe and George, 1989).

② 心理的인 과정을 통한 알콜의 作用(Alcohol expectancies)

술의 期待心理에 대해서 처음으로 연구를 한 사람은 Marlatt, Demming 과 Reid이다(Brown et al., 1985). 술이 社會的인 判斷을 調整할 수 있다는 것과 술로 인한 행태의 變化에 대한 믿음은 일반적으로 "술의 期待心理"라고 알려져 있다.

MacAndrew와 Edgerton은 술이 行爲에 影響을 미치는 것은 直接的인 술의 藥物的인 작용보다는 文化的으로 習得된 效果일 수 있다는 점을 제기하였다. 즉 그들은 알콜로 인하여 惹起된 행위의 變化들은 文化와 文化에 따라 다르며 같은 文化圈內에서도 時代에 따라 다르다는 것을 많은 人類學的인 證據들을 수집하여 提示하였다(Leigh, 1989).

Leigh의 연구에서는 술에 대한 期待感이 높은(중앙치 이상) 남성들은 性行爲의 36% 정도에서 飮酒를 한 반면, 기대감이 弱한 남성들은 단지 성행위의 17% 정도가 飮酒와 關聯이 있음을 밝혔다(Leigh, 1990). 음주를 심하게 하는 사람은 飮酒를 적게 하거나 적당히 하는 사람에 비하여 性的으로 보다 衝動的, 攻擊的이며 性과 관련된 보다 많은 快樂을 기대하는 경향이 있다고 한다(Leigh, 1987).

Steele과 Southwick(1985)는 飮酒의 효과와 期待感에 관한 효과를 分離하여 제시하였다. 즉, 음주를 적게 했을 때는 기대감의 效果가 명확하게 影響力을 나타냈으며 內在化된 기준을 選擇的으로 無視하는 役割을 하는 것으로 보았다. 飮酒를 많이 했을 경우에는 認知的인 節制能力이 減少되어 葛藤을 일으키는 水準까지 이르게 되어 술이 일으킨 認知能力이 감소되어 禁止되었던 행태가 發顯되도록 한다. 따라서 술에 취함에 따라 기대감에

의한 效果와 同時에 禁止된 行動이나 상황을 알려주는 認知能力의 痲痺로 인하여 禁止된 행동을 실행하게 될 可能性이 높아진다. 이러한 결과를 볼 때 알콜의 作用은 조금 마셨을 때에는 주로 期待感 때문에, 음주를 많이 했을 때는 알콜의 藥物效果가 함께 작용하여 性行態에 영향을 미치는 것을 飮酒者가 경험하는 것으로 여겨지고 있다(Brown et al., 1980).

性行爲時에만 飮酒를 하는 사람은 음주를 하지 않는 사람에 비하여 婚外의 性關係 頻度 면에서 危險度가 2배가 되는 성관계를 가지는 것으로 나타났다(NIAAA, 1992).

마. 學業 成就

本 硏究에서 學業成就 變數는 大學生에게 적용될 수 있는 實證的 根據가 될 수 있다. 靑少年에서 학업성취도가 낮고 학업에 대한 熱意가 낮은 집단은 學業에 대한 열의가 높고 成就가 높은 집단에 비해 性行爲를 많이 하는 傾向이 있는 것으로 알려져 있다(Hofferth and Hapes, 1987).

위에서 열거한 要因 外에도 靑少年層에 性行爲에 影響을 미칠 수 있는 要因으로서 學業 및 職業에 대한 스트레스가 性行態에 影響을 미칠 수 있는 重要한 變數로 把握되어 있다.

第 2 節 健康行爲에 관한 理論的인 모델(分析틀)

앞에서는 靑少年의 性行爲의 前例들에 대한 經驗的이고 理論的인 결과들을 涉獵한 것이며, 이번 節에서는 이러한 短篇的인 연구결과를 어떻게 綜合分析할 수 있는 지에 대해 세 가지 理論的 모형을 제시한다. 이들 모델은 個人의 健康과 관련된 行爲에 대하여 社會心理學的으로 최근 많이 활용되고 있는 이론으로써 上記한 個別的인 결과를 통합한 槪念的인 모델들이다.

1. Precede-Proceed 모델(Green 모델)

Precede모델 構造의 특성은 健康狀態를 설명하는데 있어 많은 變數를 考慮하며, 事業計劃者에게 事業投入에 필요한 變數를 選定하는데 集中的으로 焦點에 맞추게 한다. Precede 모델은 特定 目的과 基準을 평가할 수 있으며 政策을 개발하고 프로그램을 새로 投入하고 遂行過程에 관한 평가가 可能하도록 하였다(Green, 1992).



그림 2-1. 건강증진과 평가를 위한 Precede-Proceed 모델

Precede와 Proceed를 통한 작업은 수수께기를 푸는 과정과 같다. 演繹的인 推論을 거쳐 最終的인 結果로부터 原因을 거슬러 올라간다. 그 過程은 6개의 基本段階로 이루어지며, 프로그램의 산출과 효과를 평가할 때는 평가의 필요에 따라 7단계 혹은 8단계까지 연장된다(그림 2-1 참조). 단계 5에

서 단계 9는 프로그램을 投入(intervention)할 때 考慮되는 단계이다. 本 硏究에서는 性行爲와 性病의 危險要因을 밝히는 데 目的을 두었기 때문에 프로그램 투입단계를 考慮하지 않았다. 政策提言 부분에서는 未婚 男性의 性行爲를 減少시키기 위한 效果的인 戰略을 제시하기 위하여 一部 過程이 고려될 것이다.

靑少年의 性行爲에 관하여 각 단계에 대한 설명을 간단히 하면 다음과 같다.

가. 1段階(Social diagnosis)

硏究對象이 되는 人口集團(本 硏究에서는 勤勞者와 大學生)의 일반적인 문제나 要求度를 評價하여 대상자의 生活의 質을 考慮한다. 어떤 地域社會의 社會的인 문제가 실질적인 생활의 질이라고 볼 수 있는데, 이번 연구에서는 未婚 男性의 性行爲로 인한 不願妊娠, 人工流産, 海外入養, 勤勞者의 低生産性 등이 社會的인 문제의 예시가 된다.

나. 2段階(Epidemiological diagnosis)

段階 1에서 제시된 社會的인 문제에 影響을 미치는 特定 健康問題를 밝히는 과정이 단계 2이다. 이용가능한 資料와 적절한 探索과 疫學的 醫學的 硏究過程을 거쳐 연구자는 몇 가지 건강문제에 優先順位를 정하게 된다. 예를 들면 본 연구에서는 關心事를 性病과 AIDS로 定할 수 있다.

다. 3段階(Behavioral and environmental diagnosis)

段階 3은 段階 2에서 注目한 健康問題와 관련된 特定 健康 行爲와 環境的인 要因을 밝혀내는 단계이다. 이것은 나중에 投入 프로그램을 취할 때 危險要因이 되기 때문에 아주 具體化되어야 하며 주의 깊게 順位가 정해져야 한다. 環境的인 要因은 대개 개인이 統制할 수 없는 外部的인 要素이다. 本 硏究에서는 性病을 誘發하고 다른 사회적인 문제를 招來하는 가장 중요한 行態的 요인으로 性行爲를 꼽을 수 있다.

라. 4段階(Education and organizational diagnosis)

수많은 要因들이 健康行爲에 영향을 미칠 수 있는 潛在力을 가지는데 Precede 모델에서는 行爲의 變化를 통해서 健康增進을 가져오는 敎育프로그램과 戰略을 크게 3범주의 요인 즉 個人屬性要因(predisposing factors), 强化要因(reinforcing factors), 可能要因(enabling factors)으로 區分하였다.

1) Predisposing factors

行爲 以前에 先行되는 행위의 動機에 대한 正當性을 부여하는 것으로써 個人的 屬性에 개인이나 集團의 행동에 動機를 부여하는 知識, 態度, 믿음, 價値觀, 認識되어진 요구와 行爲能力 등이 이에 속한다. 좀 더 자세히 언급하면, 알고, 느끼고, 믿고, 價値評價를 하고, 自信感을 갖는 이른 바 認知的·情緖的 側面을 포함한다. 본 연구에서는 年齡, 飮酒年齡, 吸煙, 飮酒量, 음주에 대한 期待感, 性行爲에 대한 態度, 異性交際 年齡, 個人的인 센세이션 追求 경향, 宗敎 등이 이 範疇에 屬한다.

2) Reinforcing factors

行動者가 行爲의 결과에 대해서 社會的으로 肯定的 혹은 否定的으로 받는 對價(feedback)로서 reinforcing factors는 社會的, 物理的, 實體的(tangible)인 報償이나 處罰 등을 통해 行爲를 反復하게 하거나 하지 않게 하는 役割을 한다. Reinforcing factors는 社會的인 支持, 同僚集團의 影響과 保健醫療供給者가 제공하는 相談 등이 포함될 수 있다. 軍隊經歷, 父母의 關與, 同僚親舊의 性的 影響 등이 이 範疇에 속한다.

3) Enabling factors

環境의 變化는 물론 바람직한 행위를 促求하거나 沮止하는 資源 等을 말하며, 주로 社會的 體系나 影響力에 의해 만들어진다. 障碍要因, 技術 等 行爲에 변화를 招來할 수 있는 要因들로서 收入, 현재의 異性交際 狀態, 學業의 스트레스 等이 이에 속한다. 간단히 말해, enabling factors란 行態에 變化를 가져올 수 있도록 도와주는 모든(주로 物質的) 要素를 말한다.

이 모델은 매우 包括的이어서 여러 變數를 세 가지 範疇의 要因으로 分類할 수 있는 長點이 있다.

2. 生涯의 週期에 따른 發達過程 疫學모델(發展疫學모델)

人口學的인 疫學硏究는 人口集團의 健康狀態를 설명하기보다는 敍述하기 위한 것이라고 볼 수 있다. 이러한 면에서 역학연구는 인구의 統計的 연구와 類似하다고 볼 수 있다. 地域社會疫學은 說明과 分析을 위한 目的에 적합한데, 특히 疾病의 原因과 과정을 이해하는 것을 目標로 하고 있다. 최근에 體系化된 發展疫學이란 地域社會疫學을 生涯週期發達과 統合한 형태이며, 本 性病硏究에서 分析모델로 이용되었다.

Kellam의 Life Course-Social field 槪念은 發展疫學의 중요한 分析틀로 Erikson(1959, 1963), Havighurst(1952) 等의 연구에 理論的 根據를 두고 있다. 개인의 生涯週期는 發達에 있어서 그 時點에 따라 특정한 社會的 영향력이 重要한 役割을 한다는 觀點이다. 그림 2-2는 生涯의 각 단계가 각각의 時期별로 중요한 事件에 따라서 展開되는 것을 보여주고 있다. 막대의 넓이는 각 시점에 있어서 特定分野의 相對的인 重要性을 말해준다. 예를 들면 人間을 個別的인 個體로서보다는 사회에서 어떤 위치를 차지하고 있는지 또 각 개인들이 그들이 처한 領域에서 당면하는 評價者들의 期待에 副應하는가에 대한 疾病을 일으키는 變數를 찾아내려고 하는 것이다.

靑少年期에는 家族, 學校, 同僚(친구), 異性關係가 社會的으로 중요한 영향력을 가진다. 이 모델이 가지는 基本 假定은 疾病은 生涯의 週期에 따라서 발생하는 多樣한 事件에 영향을 주는 社會領域 內에서 個人과 環境間의 相互作用의 結果라고 보는 것이다(Kub, p.65).

이 모델에서 '社會的 適應'은 각각의 사회 영역 속에서 個人이 周邊에 있는 평가자들에 의해 주어지는 社會的 役割成就 點數로 판단되어진다(Kellam et al., 1983).



그림 2-2. 생애의 주기에 따른 발달과정 역학모델

本 硏究에서 이 모델이 의미가 있는 理由는 生涯의 週期에서 각각의 社會的인 影響들의 相對的인 重要性을 파악하기 때문이다. 즉 本 硏究 즉, 靑少年層의 연구에서는 여러 가지 社會的인 影響 중에서 同僚(친구)가 가장 강력하게 影響을 주는 것을 쉽게 보여주고 있다.

3. Social Action Theory(SAT)

Ewart가 提示한 Social Action Theory는 바람직한 健康行爲를 효과적으로 維持하기 위해 必需的인 일련의 行動들을 보여준다. 그림 2-3에서 보면 動機評價過程이 行態의 初期에 있어서 意思決定을 支配하는 것을 나타내고 있다(Ewart, 1991).

SAT 모델은 動機過程(Motivational Processes)에서의 評價가 문제해결을 促求하는 行爲에 영향을 미치며, 다시 그러한 行爲가 새로운 行爲를 招來하는 것을 제시하고 있다. 動機過程이 問題를 해결하는 水準은 社會의 相互作用과 派生된 能力에 의해 調整된다. Ewart는 效果的으로 문제를 解決하고 行動計劃을 세우기 위해서 개인은 當面한 環境 속에서 他人과의 相互作用과 커뮤니케이션을 잘 해야 한다고 설명하고 있다. 즉 "기꺼이 문제를 認識하고 公開的으로 議論(orientations)하는 데서, 家族構成員이 다른 構成員의 感情을 듣고 이해하는 기술을 가지는 데서(engagement), 特定 行爲를 어떻게 변화시키고 일관된 規則을 세우는 가를 아는 대상에서(control)" 관계가 일어나기 쉽다고 하였다(Ewart, 1989).

이 理論에서 生成된 能力(generative capability)이란 어느 정도 수준 높은 社會的인 行動을 수행하는데 필요한 認知的이고, 情緖的이며, 行動할 수 있는 기술을 나타내며, 社會的인 適切性(social competence)이란 여러 가지 다른 環境 與件에서 중요한 사회적 課題를 수행하는데 필요한 行動技術에 의해서 決定된다(Ewart, 1991).

SAT모델에서 마지막 要素는 'Coping Resources'라고 하는 것이다. 여기에는 生物的 資源과 氣質을 포함하는 內的/個人的 要因들과 개인의 社會的 네트워크, 社會參與, 職業, 收入 등의 外部的인 要因들이 包含된다. 이 모델은 動機過程과 社會的인 相互作用 및 派生된 能力은 개인의 사회적 個人的 Coping Resource 資産과 性向에 의해서 영향을 받는다는 假說을 가진다. 이 모델에서 動機過程은 性病에 관한 지식과 성병과 性行爲에 관련된 ①健康에 대한 생각(health beliefs) ② 認知하는 危險, 그 深刻性의 程度, 豫防的인 행동에 대하여 有益하냐 障碍가 되는가에 대한 認識의 結果에 대한 期待, ③個人의 基準과 目標(宗敎的인 믿음과 敎育的인 成就 등)와 관련되어 있다고 보고 있다.

行爲에 미치는 動機의 效果는 個人이 처한 社會의 맥락에 의해서 조정되는 것으로 보인다. 本 硏究에서 社會的인 맥락의 範疇에 포함되는 變數는 父母와의 커뮤니케이션, 친구와의 相互作用, 異性交際 등이다. 動機와 行爲間의 관계는 社會的인 技術(social skills)과 행위에 대한 趣向(危險을 감수하는 性向과 藥物使用 等)을 포함하는 派生된 능력에 의해 調整이 된다. 危險感受와 藥物使用은 部分的으로 衝動을 調節하고, 目標를 세우고, 社會的인 암시를 理解하고 計劃을 遂行하는 技術이 부족하다는 것을 反影하기 때문에 否定的으로 生成된 能力의 領域에 屬한다(Ewart, 1991).

이 모델은 個人을 한 시점이 아닌 어느 期間동안 觀察하는 것이 중요하다고 보고 있다. 즉 안전한 性行爲를 수행하느냐 성행위를 하지 않느냐는 判斷은 한순간의 판단이 아니고 여러 가지의 個人的, 文化的 環境 하에서 持續的으로 再評價된 結果라고 보기 때문이다.

이 모델은 社會的인 影響力과 個人, 問題解決 과정 사이의 상세한 相互過程을 묘사하는데 有用한 모델이다(그림 2-3 참조).



그림 2-3. Social Action Theory(SAT) 모델

4. 각 모델의 長短點

Precede-Proceed모델은 當面한 課題와 問題를 理解하는 모든 가능한 危險要因들을 포함하기 때문에 첫 단계에서 有效하다. 그러나 한정된 시간내에 社會的인 영향들의 優先順位를 제시하지 못하며 사회적인 要素와 個人의 屬性間의 상세한 相互作用과 관계를 描寫하지 못하는 한계점이 있다. 모든 사회적인 影響要素를 現實的으로 전부 考慮할 수 없기 때문에 특히 프로그램 投入段階에서는 사회적으로 適切한 영향력 있는 變數를 選擇하고, 社會的인 要素와 個人的인 屬性 相互間에 支持되고 統制된 과정을 이해하는 것이 특히 중요하다. 또한 문제해결을 위해서 相互間의 주고받는 커뮤니케이션 과정을 이해하는 것이 중요하다. 本 硏究에서는 Precede-Proceed모델을 變數選定에서 첫 段階로 考慮하였고, 대상자의 特性에 따라 相對的으로 중요한 變數를 가리기 위하여 發達過程 疫學모델을 고려하였으며, 社會的 影響力과 개인간의 相互作用을 이해하는 방법으로 Social Action Theory를 統合하여 利用하였다.

5. 性行態 分析을 위한 統合모델

本 硏究에서 사용된 모델은 앞에서 소개된 3가지 모델을 統合한 것이다 (그림 2-4 참조). 다시 말해 Precede-Proceed 모델에서는 性行態를 설명하기 위한 3개 그룹(즉 個人의 屬性, 社會的 影響, 그 외에 성행태를 가능하게 하는 要因들)의 變數들을 選定하였고, 發達過程 疫學모델에서는 Precede-Proceed 성행태 모델 變數 중에서 生涯段階過程에서 중요한 影響을 미치는 社會的 變數를 우선적으로 定하였으며(父母와 同僚), 마지막으로 Social Action 모델에서는 이러한 성행태를 助長하는 個人的 要因과 社會的 要因 그리고 그 외 요인들과의 相互關係를 볼 수 있었다. 따라서 제시된 統合모델은 Precede-Proceed 모델을 근거로 하여 社會的 要因은 發達過程 疫學모델을 빌려 좀 더 상세히 설명하였고, 社會的 要因과 個人的 屬性과의 相互作用은 Social Action 모델을 통하여 설명을 하고자 <그림 2-4>와 같은 分析틀을 시도하였다.



그림 2-4. 性行態 分析을 爲한 統合모델

第 3 章 硏究方法

第 1 節 標本抽出 및 調査方法

1. 標本抽出 및 資料蒐集

本 調査의 대상은 우리 나라의 未婚 男性[1]중 서울 및 서울주변 工團地域의 勤勞者 집단과 이에 社會 階層的으로 대응되는 집단인 서울지역의 大學生 集團을 調査 對象 集團으로 하였다.



그림 3-1. 調査 基本設計

1) 조사표 점검과정에서 미혼자중 사실혼인 경우는 제외시킴.

가. 勤勞者

性行態에 관한 조사는 個人의 性行爲에 대한 사항을 개인의 秘密을 保障하면서 가급적 率直하고 正確하게 조사할 수 있는 接近方法은 選擇이 중요하다. 外國의 연구들을 보면 집단을 조사할 경우 自己가 記錄하도록 하는 方式을 택하는 경우와 面接者가 說問調査하는 방식 2가지를 모두 活用하는데, 조사대상자의 特性과 조사 狀況에 따라 選擇한다. 우리 나라에서 그간 실시된 女性 勤勞者에 대한 調査(홍문식 외, 1984)(김한경 외, 1991) 및 大學生에 대한 조사(대한가족계획협회, 1977)는 自己記入式으로 응답하게 한 後 回收하는 方式을 택하고 있다.

조사대상 産業場의 선정은 硏究設計時에는 工團地域의 業體別 男子勤勞者數에 대한 자료를 土臺로 系統抽出 方法을 고려하였으나 業體別로 結婚狀態別 男子 職員數가 파악된 자료가 없으며, 우리 나라의 現實에서 대부분의 業體가 民間機關으로서 직원의 人的事項에 관한 사항이 公開되는 것을 回避하며 또한 勤勞時間中 조사가 허용되지 않아, 조사대상자의 接近에 상당한 어려움을 겪었다. 따라서 다음의 5가지 다각적인 조사접근 방법을 시도하였으나 그 중 ①, ②, ③의 調査方法은 現實的으로 不可能하여 ④, ⑤의 經路를 통하여 對象業體를 有意標集方法(Purposive sampling)으로 選定하여 조사대상자를 선정하였다.

<u>試圖된 調査 接近方法 :</u>

① 勞動部의 協助를 통하여 業體의 조사 협조를 구하는 方案
② 事業主 協議會를 통하여 調査 協助를 구하는 方案
③ 産業場 특수 身體檢査(精密 身體檢診)를 하는 大學病院들을 통하여 業體에 接近하는 方案
④ 産業場의 職員厚生 管理擔當者를 통하여 調査協助를 구하는 方案
⑤ 勞動組合을 통하여 調査 協助를 구하는 方案

④, ⑤의 방법은 政府나 事業主體側의 權威主義的 접근이 아니기 때문에 自記 記錄式(Self-administered) 조사방법을 택한 本 硏究에서 결과를 보다 솔직하게 응답할 수 있는 長點을 가졌다고 할 수 있다.

④, ⑤의 경로를 통해서 조사지역 및 業體種類를 감안하고 總 調査 對象者가 1,000명 정도의 規模로 하여 서울시 구로공단의 9개 業體와 서울 주변 부천市의 2개 業體, 총 11개 業體를 選定하였다. 조사실시는 硏究陣이 조사에 대한 有意事項을 설명한 후 封合된 調査票를 勞組幹部 또는 會社의 厚生管理擔當 部署에서 産業場內의 생산직 未婚 男性 全員에게 封印된 상태로 조사표를 配付하게 한 후 回收하였다.

業體別 조사대상 및 回收된 조사표는 <表 3-1>과 같다. 總 1,105名에게 배부된 조사표 중 應答 不應, 조사표 未回收, 조사표 未完 等으로 인하여 66명을 除外하고 최종적으로 集計 分析된 조사표는 1,039명으로 94%의 높은 應答率을 나타내었다.

表 3-1. 勤勞者 調査結果의 標本規模

업체(산업부문)	조사대상 (A)	조사표 미완, 부실, 미회수, 조사불응 등 (B)	완료된 조사표 (C=A-B)	응답률 (C/A)
계	1,105	66	1,039	94.0
대기업				
A (식품)	153	9	144	94.1
B (식품)	130	16	114	87.7
C (비철금속)	127	3	124	97.6
D (철강)	102	4	98	94.2
E (기계)	122	8	114	93.4
중소기업				
F (인쇄출판)	103	5	98	95.1
G (전기기계)	137	7	130	94.9
H (전기기계)	94	5	89	94.5
I (전기기계)	50	47	47	94.0
J (산업화학)	57	3	54	96.4
K (의복)	30	27	27	90.0

나. 大學生

勤勞者 集團과 對照되는 집단으로 大學生 집단에 대한 조사는 근로자 조사와 周邊環境 여건을 類似하도록 하기 위해 서울시내 大學에 局限하여 實施하였다.

조사대상 大學生의 標本選定은 2段階의 系統抽出 方法으로 대학과 系列을 선정한 후 1학년에서 4학년까지 전학년이 調査對象으로 뽑힐 수 있도록 학년을 層化한 後 學科를 선정하였으며 선정된 학과에 대하여는 原則的으로 最終 調査單位를 30명 정도의 집락(cluster)으로 하였다. 標本抽出 방법은 1차로 서울시내 각 大學의 學科 및 學年別 定員이 수록된 교육부의 1994년 大學編制定員標(교육부, 1994)를 통하여 학생수를 累積하여 系統抽出을 하였다. 1차적으로 4개의 조사 대학이 선정되었다. 선정된 대학에서 2차로 系列別 학생수를 累積하여 系統抽出 방법으로 2개의 系列을 선택한 후 系列內에서 학년별로 層化抽出方式으로 학과를 선정하였다. 現員을 고려하지 않은 것은 현원은 學年別, 學期別로 變動이 있고 大學에 따라서는 公開를 꺼리며 실제로 定員과 類似한 水準이기 때문이다.

현실적으로 選定된 學科에서 調査協助를 받지 못한 경우에는 隣接學科를 조사대상으로 하였다. 선정된 學科의 定員이 적거나 男學生數가 적어 조사대상자가 30명에 크게 未達되는 경우에는 隣接學科를 追加로 조사대상으로 包含하였고, 수업에 참여한 學生數가 學年當 50名을 超過하는 경우에는 出席番號를 基準으로 50명까지를 조사대상으로 하였다. 또한 該當學科의 學生들을 가급적 漏落없이 조사하기 위하여 出席率을 사전에 把握하고 專攻必須 科目時間을 割愛 받아 조사를 실시하였다. 실제 조사 當時에는 대부분의 大學이 4學年 定規受業時間이 적고 受業參與率이 낮아 4학년 調査學生數는 他 學年에 비해 적었다.

위의 3次에 걸친 系統抽出 결과 선정된 總 4개 大學을 조사하여 얻은 最終調査 대상수는 1,151명이며, 조사에 응하지 않거나 조사표 記載가 全般的으로 不實한 48명의 조사표를 除外하고, 총 1,103명에 대한 조사표를 集計

分析하였다(표 3-2, 표 3-3 참조).

表 3-2. 大學生 調査結果의 標本規模

대학교	조사대상 (A)	조사표 미완, 부실, 미회수, 조사불응등 (B)	완료된 조사표 (C=A-B)	응답률 (C/A)
계	1,151	48	1,103	95.8
A 대학	277	14	263	94.9
B 대학	298	16	282	94.6
C 대학	306	13	293	95.8
D 대학	270	5	265	98.1

表 3-3. 大學別 學年別 標本數

	계	A대학	B대학	C대학	D대학
1학년	265	39	87	84	55
2학년	285	78	75	57	75
3학년	321	85	69	92	75
4학년	232	61	51	60	60

2. 調査票 設計 및 調査內容

調査道具가 된 조사표는 先行硏究 및 外國의 연구를 통하여 性行態와 關聯이 있을 수 있는 居住形態, 收入程度, 職業 滿足度, 飮酒, 吸煙, 趣味活動, 부모의 特性 等의 一般的인 變數, 性에 대한 知識變數, 避妊方法에 대한 認知도, 性行爲에 대한 態度 變數, 성행태 변수들을 調査項目으로 構成하였다. 이와 같은 조사항목은 2차에 걸친 事前調査와 産業場 管理者 및 勞組 幹部와의 협의를 거쳐 勤勞者가 응답할 수 있는 水準으로 調査問項의 길이, 應答完了時間, 語彙, 문항의 순서와 skip-pattern 等의 내용을 修正하고, 專門家의 諮問會議를 거쳐 補完되었으며 WHO의 擔當諮問官의 訪韓時 충분한 회의를 거쳐 최종적으로 確定되었다.

1次로 勤勞者에 대한 調査를 완료한 후 調査經驗을 바탕으로 大學生에 대한 조사는 조사 대상자에 대한 接近이 相對的으로 容易하고 조사내용(문항의 난이도 등)과 조사시간의 制約을 덜 받을 수 있는 調査與件을 고려하여 조사항목을 追加하였다. 또한 대상자 選定에서도 上記한 바와 같이 制限的이기는 하나 任意抽出(random sampling) 방법을 試圖하였다. 조사표 내용은 附錄에 收錄되어 있다.

1) 勤勞者 調査票
   - 對象者의 一般的 事項
   - 性敎育 履修 狀態
   - 性에 대한 知識水準
   - 性行爲에 대한 態度
   - 避妊方法 및 性病에 대한 認知度
   - 性病 및 AIDS에 대한 知識
   - 性行態에 관한 事項
     - ◦ 一般 性經驗
     - ◦ 淪落女性과의 性經驗
   - 性病感染 經驗
   - 性敎育에 관한 要求度

2) 大學生 調査票

   勤勞者 조사표와 同一한 項目 이외에 다음 항목을 追加 調査함.
   - 父母의 態度 및 支援
   - 술의 心理的인 影響程度
   - 大學生活에 대한 滿足度와 同僚(peer) 集團의 性向
   - 콘돔 使用에 대한 態度
   - 性行爲 對象別(淪落女性, 女子親舊, 우연히 만난 女子) 性行態에 問項
   - 調査對象者의 타고난 센세이션한 傾向
   - 宗敎에 관한 項目

3. 調査實施 및 結果集計

勤勞者 조사는 事前調査가 5월에 실시되었고 本調査는 6-8월에 실시되었다. 조사기간이 길었던 것은 調査協助를 받는 과정에서 會社 또는 勞動組合側의 事情에 따라서 실제조사가 遲延된 業體가 많았기 때문이다. 조사는 本 硏究陣이 업체를 訪問하여 노동조합 幹部 또는 會社管理部署 職員에게 說明을 한 후 이들이 조사대상자에게 傳達하는 間接的인 方法을 活用하였으며 각 조사표는 각각 封函 봉투에 넣어져서 自己가 記錄하도록 配布하고 2-3日後 回收하였으며 연구진이 수시로 출장하여 조사를 指導 監督하였다.

大學生 조사는 事前調査가 9月에 실시되었고 10-11月에 本調査가 실시되었다. 조사는 본 연구진이 敎授 및 助敎의 협조를 얻어 受業時間의 일부를 할애 받아 講義室에서 직접 학생들에게 調査 趣旨를 설명한 후 自己가 直接 記錄하도록 하여 연구담당자가 直接 조사표를 回收하였다.

回收된 조사표는 일일이 調査票 回收段階의 檢討와 資料入力 後의 檢討過程을 거쳐 不實한 조사표는 除外시켰으며 자료의 分析에는 SPSS 및 SAS-PC패키지 프로그램이 이용되었다.

4. 로지스틱 回歸分析에 活用된 變數

分析에 활용된 從屬變數와 獨立變數를 정리하면 <表 3-4>와 같다.

가. 從屬變數

分析을 위해 從屬變數를 二元化했다. 즉 응답자가 性病(STDs)을 적어도 한 번 이상 經驗했다고 응답한 경우에는 1로, 경험한 적이 없었다면 2로 符號化 하였다. 勤勞者와 大學生들 모두 全生에 걸친(Life time) 性病에 대한 有病率이 計算되었다.

有病率은 어떤 時點 또는 一定期間 동안에 發生한 疾病의 程度를 測定하여 醫療, 社會서비스 그리고 豫防事業의 必要性을 測定하는 有用한 指標이다.

또 하나의 從屬變數는 賣春婦, 愛人, 우연히 만난 파트너와의 性行爲 經驗與否이다. 이들 각 변수는 성행위를 했다면 1로, 한 적이 없었다면 2로 符號化 되었다.

나. 獨立變數

獨立變數들에 있어서 工團勤勞者와 大學生들 간에 약간의 차이가 있다. 變數들은 카이제곱근 分析을 위하여 範疇形 變數로 符號化 하였고, 몇몇 변수들은 로지스틱 回歸分析을 위하여 連續變數로 사용되었다. 그 이유는 로지스틱 回歸分析에서는 범주형 變數와 連續變數 모두를 통한 統計分析이 가능하기 때문이다.

大學生에서 感情(센세이션)의 경향 測定尺度는 刺戟과 興奮의 個人水準의 차이 尺度로서 Zuckerman에 의해 개발되었으며, 총 10개 項目으로 구성되어 있는데 본 연구에서는 7개 항목을 調査하였다. 각 항목의 1 또는 2로 符號化 되었으며, 해당 항목에 대한 應答者의 選擇을 基礎로 하여 合計點을 求한 後 尺度값을 둘로 나누어 하나는 "0", 다른 하나는 "1"을 주었다. 飮酒經驗의 경우 性行爲에 미치는 음주영향에 관한 13가지 효과가 Leigh(1990)에 의해 개발되었다. 각 항목은 "전혀 아니다"와 "매우 많이"의 범주를 가진 4尺度로 調査되었다.

婚前 性行爲에 대한 태도는 응답자에게 一般女性, 約婚女, 우연히 만난 여자, 그리고 賣春婦와의 性交에 관한 9가지 質問을 하였으며, 4尺度가 사용되었다. 실제 질문의 한 예는 "約婚女와의 性行爲에 대해 어떻게 생각하느냐"이다. 응답척도 선택은 "성행위를 한다"의 1에서 "해서는 안된다"의 4까지 構成되어 있다.

宗敎에 관한 항목도 4응답척도(1: "중요치 않다", 4: "매우 중요하다")를 사용했다.

父母의 養育에 관한 變數는 1989 Baltimore What's Happening Questionnaire에 父母介入에 관한 항목을 修整한 것이다. 14개 항목으로 되어 있고, 각 항목은 1에서 4까지의 4尺度들을 갖고 있다. 大學生活에 관한 질문은 대학생활에서의 滿足과 飮酒消費의 性的經驗에 同僚集團의 影響要素들을 가진 11개 항목으로 구성되어 있다.

알콜 사용과 性行爲間의 聯關性을 조사하기 위해서는 응답자들은 첫번째 性交와 한 번 이상 性交經驗이 있는 사람의 경우 가장 最近의 性交 당시 그들의 알콜 消費와 性行爲에 관해 質問되어졌다.

本 硏究에서는 平素의 일반적인 飮酒패턴에 대해서도 調査되었다. 본 연구에서 알콜사용에 대해서는 알콜의 使用頻度와 使用量을 종합적으로 고려하였다.

알콜 연구분야에서 消費와 알콜의 總量에 대한 測度에 관한 2개의 學說이 최소한 存在하고 있다. 첫째 학설은 일반적으로 평소에 음주하는 날들의 알콜 消費量과 알콜이 消費되는 날수를 指標로 사용해서 이 두 지표들을 곱해서 總 飮酒消費量을 推計하는 방법이다. 두번째 학설은 첫번째 학설에서 고려된 사항 외에 平素와는 달리(예: 過飮時) 飮酒한 경우에 消費한 알콜의 量과 각각의 경우에 알콜이 消費되는 날들의 數를 測定한 다음 총 소비량은 각 飮酒패턴시 消費되는 알콜 量을 더해서 推計한다.

本 硏究에서는 兩 接近方法을 모두 활용하여 大學生에서는 後者의 방법으로, 勤勞者에서는 測定 變數가 제한되어 있어 前者의 방법으로 總알콜 消費量 指數를 계산하였다.

즉 1日 동안 알콜을 消費할 確率(F)에 365를 곱해서 1년동안 알콜을 消費할 확률을 구하고, 이 數値에서 不規則的으로 평소보다 많은 알콜 消費가 발생한 즉 過飮日數를 뺀 후 여기에 평소 알콜 消費量을 곱하고, 過飮時 알

콜 消費量에 過飮日數를 곱하여 합하면 일년 동안 소비된 에탄올의 온스(Ounces)가 구해진다. 이를 365로 나누면 그 결과치는 해당 飮酒의 하루 소비량을 意味한다(Polich, 1979, p.147).

이 公式은

$$\frac{A \times D + Q(365F - D)}{365}$$

A : 평소와는 다른 과음시 알코올 소비량
D : 평소와는 다른 과음시 알코올 소비가 발생한 날수
Q : 평소 알코올 소비량
F : 1일 동안 알코올을 소비할 확률

위 公式에 각각의 술의 種類別로 알콜량으로 換算하여 適用하였다. 막걸리, 정종, 청주, 포도주 등은 본 연구에서 計算되지 않았는데, 그것은 조사대상인 勤勞者와 大學生들이 이들 술을 많이 마시지 않으며, 이들 술은 에탄올 농도가 일정하지 않아 계산에 適用하기가 어려웠기 때문이다.

表 3-4. 性行態 및 性病의 關聯要因 分析에 使用된 變數

변 수	항 목
종속변수 ◦ 성행위 경험 - 일반(전체) - 윤락여성 - 우연히 만난 여성 - 여자친구 및 결혼대상자	1. 성행위(성교)경험 2. 성행위 미경험
◦ 성병감염기왕력(life time)	1. 성병감염경험(과거 및 현재) 2. 성병 미감염
독립변수 ◦ 연령 I (Logistic Regression분석) ◦ 연령 II (χ^2 분석)	실수 4분위수(quartile)에 의해 1. 20세 이하 2. 21-22세 3. 23-24세 4. 25세 이상으로 구분
◦ 교육수준(근로자)	0. 중졸이하 1. 고졸 2. 전문대졸 이상
◦ 교육수준(대학생)	0. 1, 2학년 1. 3, 4학년
◦ 군경력	1. 군필 0. 군미필, ROTC
◦ 결혼전 순결에 대한 태도(근로자)	0. 기타 1. 꼭 지켜야 한다
◦ 여자친구와의 성행위에 대한 태도 (근로자)	0. 된다 1. 안된다
◦ 우연히 만난 여자와의 성행위 대한 태도 (근로자)	0. 된다 1. 안된다
◦ 윤락여성과의 성행위에 대한 태도 (근로자)	0. 필요하다 1. 삼가는 것이 좋다 2. 절대로 안된다
◦ 부모와 동거여부	0. 함께 산다 1. 떨어져 산다

표 3-4. (계속)

변 수	항 목
◦ 현재 데이트 여부	0. 안한다 1. 한다
◦ 음주 시작연령	0. 19세 이후 1. 18세 이전
◦ 데이트 시작연령	0. 19세 이후 1. 18세 이전
◦ 수입(대학생)	0. 20만원 미만 1. 20만원 이상
◦ 수입(근로자)	0. 70만원 미만 1. 70만원 이상
◦ 직업만족도(근로자)	0. 매우만족, 만족 1. 그저 그렇다 2. 불만족, 매우불만족
◦ 학업성적(대학생)	0. 나쁘다 1. 좋다
◦ 전공만족도(대학생)	0. 불만족 1. 만족
◦ 감각적 성향(대학생) 7문항의 합계점을 이분위 (50th percentile)로 나눔	0. 1-8점(경향이 적음) 1. 9-14점(경향이 많음)
◦ 음주가 성행위에 미치는 영향(대학생) 13항목중 factor analysis에 의하여 5문항의 합계점을 이분위로 나눔.	척도: 1~4 1(전혀그렇지않다)~4(상당히그렇다) 1. 전혀 그렇지 않다 2. 거의 그렇지 않다 3. 조금 그렇다 4. 상당히 그렇다 부여한후 항목합계치를 2분위로 나눔 → 0. 13점 이하 1. 14점 이상

표 3-4. (계속)

변 수	항 목
◦ **혼전 성행위에 대한 태도(대학생)** 일반여성, 약혼녀, 우연히 만난 여자, 윤락여성에 대한 9문항중 - 일반 7문항 - 윤락여성문항 2문항 - 여자친구, 우연히 만난 여자 5문항을 선정하여 각각의 합계점을 2분위로 나눔	척도: 1~4 1(한다)~4(해서는 안된다) <일 반> 0. 18점 이하 1. 19점 이상 <윤락여성> 0. 6이하 1. 7이상 <여자친구, 우연히 만난여성> 0. 12점 이하 1. 13점 이상
◦ **종교성: 4항목(대학생)**	척도: 1~4 1(중요치않다)~4(매우중요하다) → 0. 7점 이하 1. 8점 이상
◦ **부모의 양육(Parenting: 14항목)** **(대학생)** 14항목에 대한 factor analysis 후 5항의 합계점을 2분위로 나눔	척도: 1~4 1(항상그렇다)~4(결코 그렇지 않다) → 0. 13점 이하 1. 13점 이상
◦ **대학생활과 친구영향: 11항목(대학생)** 11항목에 대한 factor analysis 후 3항목의 합계점을 2분위로 나눔	척도: 1-4 1(전혀 그렇지 않다)~4(정말 그렇다) → 0. 6점 이하 1. 6점 이상
◦ **음주정도=음주 확률(대학생)** $\frac{A \times D + Q(365F - D)}{365}$ A: 과음한 날의 에탄올 소비량 D: 과음한 날(日)수 Q: 평소의 알코올 소비량 F: 1일간 알코올 소비확률 ◦ **음주정도(근로자)** $\frac{Q \times 365F}{365}$	0. 15 이하 1. 16-39 2. 40-91 3. 92 이상

第 2 節 分析 方法

本 硏究에서는 선정된 項目의 信賴度를 높이고 測定하는 항목의 客觀的 측정을 위하여 Cronbach(1951)의 Coefficient alpha(α)와 要因分析(factor analysis)의 주성분 분석을 통해서 최종적으로 分析에 사용할 變數를 選定하고 일부 변수는 統合하였으며, 카이스퀘어 分析을 통한 技術的인 분석결과를 토대로 로지스틱 回歸分析을 시도하였다.

1. 信賴度(Reliability)

勤勞者 조사에서는 社會心理學的 변수를 조사하지 않았기 때문에 조사표 내용에 포함된 社會心理學的 變數에 대한 信賴度 및 妥當度를 평가할 필요가 없어 이 부분은 大學生 조사항목에만 適用하였다.

조사항목과 항목의 尺度(scales)에 대한 信賴度를 測定하지 않고서는 結果의 의미를 一般化시키고 推定할 수 없다. 측정 방법에 대한 理論은 대부분 心理學的 측정에서 發展되었으며 社會學 分野에서는 知能을 테스트하는데 처음으로 활용되었다. 그 후 軍隊에서 職業適性 檢査方法으로 활용되면서 심리학적인 측정방법의 劃期的인 發展을 보았으며 2次 世界大戰中 그 중요성이 絶頂에 달하였다. 1950年 以後 測定理論, 誤差, 信賴度, 妥當度 等에 대한 연구와 관심은 敎育學的 테스트 분야에서부터 여러 分野의 사회적인 測定全般에 걸쳐 廣範圍하게 활용되고 있다(Celentano, 1976).

尺度測定과 신뢰도는 標本 모델영역(domain)에 기초를 두고 있다. 모델에서는 假說的인 母集團 항목영역에서 無作爲로 抽出하여 얻은 특정한 標本項目들을 測定하게 된다. 特定 槪念을 가진 항목들은 一般的으로 無作爲 抽出된 항목과 비교할 때 특정 平均값을 갖는다. 基本槪念은 無限定한 거대한 相關行列(matrix)을 가지는 전체 항목영역이 있다고 할 때 項目間의 重複과 相關關係로 인하여 각 항목과 항목간의 平均相關關係가 존재하며

전체영역을 代表하는 항목의 셀을 抽出해 낼 수 있다는 假定에 기초하고 있다. 즉, 信賴度 계수는 항목간 相關係數의 平均値로 나타내는 것으로, 항목간의 同質性과 相關關係가 높으면 상관계수의 推定値는 좀 더 정확하고 不便推定値를 얻을 수 있다. 항목의 수가 많으면 平均 相關度의 標準誤差가 작아져서 無作爲 誤差로 기인하는 신뢰도 推定値의 오차가 크게 줄어들어 信賴度 係數가 높아진다(Nunnally, 1967).

生物學이나 物理學者들은 신뢰도의 推定方法으로 여러 번 측정을 반복하여 측정의 신뢰도를 얻는다. 하지만 여러 번 反復 測定할 수 없는 狀況에서 行動科學者들은 동일한 의미를 가지는 項目을 여러 개 나열하고 이 항목간의 平均相關度에 근거해서 신뢰도를 얻을 수 있는 방법으로 한번의 檢査로서 주어진 검사에 독특한 信賴度 추정치를 얻는 方法을 開發하였다. 이런 係數를 '내적 일관도' 測定이라 한다. 이 방법은 Kuder and Richardson (1937)의 formula를 一般化시켜 Cronbach(1951)가 사용한 coefficient "alpha"(α)로서 다음과 같이 나타낸다.

$$\alpha=\frac{k}{k-1}\left[\ 1-\sum_{i=1}^{k}\sigma^2/\left(\sum_{i=1}^{k}\sigma^2+2\sum\sum_{i<j}Cov(V_i,V_j)\right)\right]$$

여기서 k는 항목수이다. 이 分散 공분산행렬을 相關關係 行列을 이용하여 간단히 나타내면 아래와 같이 간단히 나타낼 수 있다.

$$\alpha=\frac{k}{k-1}\left[\ 1-\frac{a}{a+2b}\right]$$

여기서 a는 공분산행렬의 對角線 成分의 合이며, b는 대각선 부분을 제외한 나머지 成分의 合이다.

일반적으로 항목수를 첨가하면 信賴度가 높아지지만 항목수를 無限히 더하면 신뢰도에 미치는 影響은 점차 적어진다. 또한 첨가한 項目이 항목간 平均 相關關係를 떨어뜨리는 경우에는 항목을 더하면 척도의 신뢰도가 낮아지기도 한다. 항목수가 많아지면 측정을 하는 데나 結果를 활용하는데 非經濟的이므로 적절한 水準에서 항목수를 制限하게 된다.

信賴度가 보장되더라도 妥當度 문제는 별도로 제기될 수 있으며, 신뢰도 係數는 多次元(multi-dimensionality)的인 성격의 항목을 分別하지 못하는 限界를 가지고 있다(Cel, p. 221).

2. 要因分析(Factor Analysis)

多變量 資料分析에서 중요한 관심사 중 하나는 抽象的 槪念을 나타내는 많은 변수들을 몇 개의 次元으로 묶을 수 있는가 하는 것인데, 개념의 부분적인 要素들인 變數를 묶어 보다 추상적인 요인을 統計的으로 構成하여 변수를 줄임과 동시에 보다 正確하게 從屬變數와의 관계(본 연구에서는 성행태와의 관계)를 알아보고자 하는 것이다.

이 중 주성분 要因分析(principal component factor analysis)은 변수들 간의 분산-공분산 관계를 이용하여 이 변수들의 線形結合으로 표시되는 주성분을 찾고 이중에서 중요한 몇 개의 주성분으로 가능한 한 全體의 變動(variance)의 대부분을 설명하고자 하는 多變量 分析技法으로 開發되었다. 주성분들은 서로 相關이 없거나 또는 獨立的인 새로운 변수들로서 情報의 손실이 最小化되도록 구한다. 본 연구에서 주성분분석을 活用한 목적은 變數를 몇 개의 次元으로 묶어 回歸分析에서의 설명변수의 수를 제한하고 해석을 용이하게 하는데 있다.

h^2은 각 요인의 loading의 제곱근을 합한 것이며 각 요인(factor) loading의 最小값은 .3-.4이다. 또한 h^2은 共通性(communality)의 尺度로서 回歸分析에서 決定係數와 같은 의미를 갖는다. 즉 共通要因 factor가 變數의 分散을 설명하는 부분이 된다. 100%에서 공통성을 뺀 부분은 특수성(specificity)이라 하며 그 변수에만 영향을 미치는 고유한 特殊要因에 의한 分散으로서 共通要因에 의해 설명되지 않는 나머지 부분을 나타낸다.

初期의 패턴행렬을 얻은 후 요인이 가지는 槪念上의 의미를 더욱 더 부각시키기 위해서는 패턴행렬이 單純構造를 갖도록 回轉시킬 수 있다. 본

연구에서는 보통 사용하는 方法인 Varimax 回轉方法을 사용하였다. 또한 각 요인은 一般的으로 固有値(eigen value)가 "1" 이상인 주성분만을 사용하였고, 補助的으로는 scree option을 사용하였다. Scree option이란 그래프 상으로 factor의 갯수를 정하는 것으로 SAS-PC에서 쉽게 option으로 구할 수 있다.

本 硏究에서는 센세이션 追求傾向(sensation seeking)에 관한 7개 변수는 1개의 요인으로 설명되어 回轉시키지 않았으며 요인적재계수가 음부호(-)인 경우는 재조정하여 alpha(α) 信賴係數를 구한 결과 .66이었다.

알콜의 期待感에 대하여는 13개의 문항이 조사되었다. 飮酒를 하지 않는 대상은 正確한 應答을 기대하기 어려우므로 分析에서 제외시켰다. 주성분 분석의 scree plot와 Varimax 回轉方法을 통해 3가지 요인으로 분류되었다(SAS, 1990). 즉 5개의 변수는 '요인 1'로 '對人關係에 있어서 積極性'을 나타내었으며(α=.83), 6개의 변수는 '요인 2'에 포함되었는데 '性에 관한 積極性'을 나타내었다(α=.88). 2개의 변수는 '요인 3'에 포함되었는데 '음주로 인한 統制力 喪失'을 나타내었다. 요인 3은 요인적재계수와 α계수가 낮았다.

8개의 性에 관한 態度變數에 대한 要因分析結果는 婚前의 性行爲에 대하여 5개의 변수를 포함하는 要因 1(α=.86)과 2개의 변수를 포함하는 요인 2로(α=.81)로 區分되었으며, 2개의 변수는 어느 요인에도 포함되지 않았다.

宗敎性에 관한 3개의 變數는 한가지 要因으로 分類되었으며 α계수는 .70이었다.

父母의 養育態度에 관한 14개의 문항으로 부모간의 관계, 부모의 모니터링, 부모의 性에 관한 態度 등이 조사되었는데 4개의 要因으로 區分되었다. 즉, 부모의 관계를 나타내는 '요인 1'은 4개의 변수로 構成되었는데 이중 1개의 변수가 요인적재계수와 固有値에 미치는 影響이 적어 3개의 變數만을 사용하였으며 α계수는 .76이었다. 부모의 관여와 모니터링을 나타내는 '要因 2'는 5개의 變數로 되어 있는데 α계수는 .70이었다. 性에 관한 부모의

態度를 나타내는 '要因 3'은 3개의 變數가 포함되었는데 α係數는 .68이었다. 14개의 변수중 4개의 변수는 세 가지 要因에 포함되지 않아 별도로 分析하였다.

大學生活과 친구관계에 관한 문항 11개는 '大學生活의 滿足度', '學業成就', '飮酒에 대한 친구의 壓力', '性行爲에 대한 친구의 影響'의 4개의 요인으로 分類되었다. 요인 1에는 4개의 변수(α=.40), 요인 2에는 2개의 변수(α=.32), 요인 3에는 2개의 변수(α=.48), 요인 4에는 3개의 변수(α=.74)가 포함되어 요인 4만이 의미 있는 α계수를 보였다. α계수가 낮은 요인 3의 變數는 chi-square 分析과 logistic statistics에서 個別的으로 다루었다.

3. 로지스틱 回歸分析(Logistic Regression)

로지스틱 回歸模型은 일반적으로 回歸模型과 유사한 것으로 判別分析 모형[2]과 같이 從屬變數가 二分的으로 변수의 값이 '예', '아니오'라는 결과를 얻는 것을 몇 개의 說明變數(獨立變數)와 연계하여 그 관계의 형태를 설명하는 모형을 構築하는데 사용되며 또한 그러한 二分的인 결과를 얻을 可能性을 예측하는데 사용된다(Afifi, 1984).

로지스틱 回歸分析의 基本假定은 交叉比(odds)의 자연로그는 獨立變數들과 線形의 관계를 가진다는 것이다. X변수의 分布에 대해서는 특별한 假定이 없으며(즉, 변수들이 多變量 正規分布를 한다는 假定이 불확실할 때 사용), 이 분석의 가장 큰 長點은 X변수가 序列尺度 외에도 名目尺度와 範疇尺度가 섞여있을 때 사용할 수 있다는 점이다. Multiple logistic regression models은 다음과 같이 표현된다.

$$\log\left[\frac{p(y)}{(1-p(y))}\right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_p X_p$$

---

2) 일반적으로 독립변수들이 등간 척도 이상이고 변수들이 다변량 정규분포를 하는 경우에는 판별분석을 사용한다.

여기서 從屬變數 y를 性行爲 경험이라고 하면 응답자가 경험이 있는 경우는 y=1이며, 應答者가 性行爲 경험이 없는 경우에는 y=0이 된다. X_1,..., X_p는 說明變數들로서 連續變數나 範疇變數 모두가 가능하다. β_i는 回歸係數로서 모든 다른 변수들을 統制하였을 때 X_i의 K_{th} level과 X_i의 K-1_{th} level의 비(比)인 odds 값에 로그를 취한 回歸係數이다. 본 연구에서는 SAS 패키지 프로그램의 LOGISTIC procedure을 사용하여 최우도추정치(Maximum likelihood estimates of coefficients)로 母數를 推定하였다(SAS, 1990).

第 3 節 硏究의 制限點

本 硏究는 우리 나라에서 성행태의 危險集團으로 간주되고 있는 未婚의 男子 勤勞者 集團과 이와 對照되는 男子 大學生 集團의 性行態와 性病感染 樣相을 把握하고 이들의 性行爲에 대한 規範과 성행태에 영향을 미치는 社會,人口, 心理學的 要因들과의 聯關性을 파악하며, 이러한 결과를 통하여 이들 階層의 건전한 성행태의 定着을 위한 具體的인 介入方案을 제시하고자 하는 目的에서 이루어졌다. 이러한 목적을 가진 본 연구는 向後 靑少年과 結婚前 未婚 남녀에게 效果的이고 效率的인 性敎育과 이와 관련된 사회적인 서비스를 위한 政策을 수립하고 프로그램을 實踐하는데 기여할 수 있을 것으로 보이는데, 다음과 같은 몇 가지 制限点을 內在하고 있다.

1. 橫斷資料를 통한 性行態 要因分析의 限界

本 硏究는 橫斷調査資料(cross-sectional data)이기 때문에 여기서 제시된 변수간의 관계는 직접적인 關聯性 또는 간접적인 관련성을 나타내는 것인지, 제3의 要因(confounding factor)에 의하여 나타나는 非原因的 關聯性인지를 구별할 수 없다. 특히 인간의 行態는 個人의 認知作用, 社會階層에 따라 다르게 형성된 規範과 여러 가지 社會心理的, 環境的 要因의 相互 複

合的인 相互作用을 통해서 長期的으로 효과가 나타나기 때문에 어떤 행태의 原因的 요인을 단층적으로 파악하기는 매우 어렵다고 볼 수 있다. 이러한 원인결과를 部分的이나마 判斷하기 위해서는 理論的 방법과 이론에 따른 path analysis 등을 시도할 수 있는데, 우리가 새로 提示한 統合모델은 變數간의 相互作用을 제시해 주고 있기 때문에 매우 有用하다고 볼 수 있겠으나, 이를 위하여 path analysis를 통한 檢證은 하지 않았다. 차후 經路分析을 통한 深層分析이 이루어져야 할 것으로 본다.

2. 硏究의 對象者

本 硏究의 强點은 우리 나라 최초로 젊은 男性의 두 개의 代表的인 그룹인 勤勞者와 大學生을 대상으로 하여 성행태를 體系的으로 接近하였다는 것이다. 하지만 연구결과가 얼마나 다른 지역 혹은 다른 직종의 젊은 남성들에게 一般化될 수 있는지에 대한 疑問은 당연히 제기되어야 할 줄로 믿는다. 이러한 의문점은 본 硏究結果와는 다른 결과를 보여줄 수 있다고 豫想되는 대상에 대하여 조사하였을 때 대답을 얻을 수 있으리라고 본다.

本 硏究에서 工團地域 勤勞者 조사는 조사대상자에 대한 접근이 現實的으로 상당히 어려웠기 때문에 最終的인 조사대상은 選定된 工團 地域에서 調査協助가 可能한 산업장의 근로자들을 대상으로 有意 抽出 方法에 의하여 選定하였기 때문에 연구결과를 근로자 集團 全體에 一般化하는데는 제한점이 있다. 대학생에서는 系統抽出方法에 의하여 大學과 系列을 선정하였는데 조사대상을 勤勞者 調査에 맞추어 서울지역 大學生만을 조사하였으므로 社會 文化的 여건이 相異한 農村 및 中小都市 지역의 대상자와는 差異를 보일 수 있다.

3. 性經驗과 關聯 行態의 測定方法上의 制約

本 硏究에서는 다른 일반 성행태 조사에서와 마찬가지로 自己記入式으로 作成되었다. 좀 더 客觀的인 자료를 얻기 위해 勤勞者, 大學生들과 相互信

賴를 구축하기 위하여 상당한 努力을 기울였고, 작성된 자료의 秘密이 철저히 보장된다는 사실을 認識시키기 위하여 노력을 기울였다.

그럼에도 불구하고, 본 조사가 自己記入에 의한 報告(Self- reported)이기 때문에 性經驗 및 관련된 행태를 측정하는데 있어서 妥當度와 信賴度 문제가 提起될 수 있다. Self-reported 자료의 妥當度는 性病 혹은 性交를 客觀的으로 測定하는 血液檢査, 尿檢査 等에 의하여 客觀的인 測定으로 확보할 수 있지만 이러한 방법은 觀察期間이 아주 짧아야 하고 대량의 조사에서는 현실적으로 적용하기가 어려운 방법이므로 考慮될 수 없다고 볼 수 있다. 또 한가지 측면은 이와 같은 조사를 面接方式으로 하는 경우를 고려할 수 있는데 이 경우는 資料 蒐集過程에서 個別面接과 面接者와의 信賴度 構築이 必須的이며 그렇지 못할 경우에는 Self-reported 결과보다도 過少報告될 可能性이 있다고 볼 수 있다.

外國의 사회조사 방법 중에서는 個人이 自身의 性經驗을 기록하는 방법을 改善하기 위해 부모나 친구 등 여러 가지 情報源(multiple informants)을 통해 자료를 비교하는 방법을 活用하여 應答者의 報告를 確認하는 방법이 있다. 그러나 性經驗과 性病感染에 관한 사항은 흔히 父母나 친구에게 알려지지 않고 행해지기 때문에 자신이 보고하는 것보다 더 타당하다는 보장이 없다. 동료 친구로부터 성행태를 調査하는 방법도 活用되고 있으나 어느 친구를 選擇하는가에 따라 결과가 다르고 過少 報告되는 傾向이 있다. 부모로부터 응답을 받을 경우에는 子女에 대한 期待感에 의해 偏向된 결과를 얻기 쉽다. 더군다나 이러한 여러 가지 情報源으로부터 얻은 結果의 差異를 解決하기가 어렵다.

또 한가지 사항은 본 연구에서 應答者의 性經驗을 이제까지 經驗 全體(life time)를 적도록 했기 때문에 가까운 過去의 經驗이 아닐 경우나 성경험이 많은 사람에게서 얻는 결과는 記憶의 誤差가 揭載될 수 있는 소지가 있다는 점이다.

위와 같은 사실들로 인하여 本 硏究結果가 어느 정도 過少報告되었거나 過多報告된 것인지는 확실한 證據는 제시할 수 없다. 그러나 본 연구에서 從屬變數인 性行爲의 經驗率이 標本集團別로 一貫性을 보인다는 점, 조사방법과 조사과정 중에 細密한 배려를 한 점, 본 연구와 類似한 性經驗에 대한 先行硏究結果보다 다소 낮은 水準을 보인 점, 우리사회에서 男性들의 性行爲는 女性들의 성행위에 비해 許容이 되기 때문에 숨기는 傾向이 적다는 사실들을 고려할 때 過少報告되었을 가능성이 낮아 比較的 정확한 測定이 이루어졌을 것으로 보인다.

또한 본 연구의 주안점은 性經驗率과 性病有病率의 水準 自體를 測定하는데 1次的인 目的이 있다기 보다는 성행태에 관련된 要因을 찾아내어 이들 대상에게 適切한 介入方案을 마련하는 基礎資料를 산출하는데 意義를 두고 있다. 다만 과소보고될 경우 關聯要因과의 因果關係가 稀釋되어 나타날 可能性이 있다.

性病感染經驗에 대해서는 性病의 特性상 不顯性 感染이 높으며, 性病治療에서도 自家診斷에 의한 자가치료가 많기 때문에 성병의 症狀을 自覺한 경우를 보고한 본 조사 결과는 성병의 症狀經驗 有無에 대한 測定에 그칠 수 밖에 없어 性病感染水準과 내용을 파악하는데 그 正確度 면에서 제한점이 있으며 바로 현재의 性病 有病率을 나타내는 것이 아니다. 특히 감염된 性病의 種類에서는 醫療機關의 診斷을 거친 경우가 아니면 그 正確性이 떨어진다고 볼 수 있다.

4. 勤勞者 調査와 大學生 調査內容의 不一致

勤勞者 조사와 大學生 조사내용은 共通部分과 공통되지 않은 부분이 있으며 이에 따라 조사분석에서도 部分的으로 두 그룹의 分析에 差異를 두어 성행태에 미치는 요인을 補完說明하였다. 그 이유는 勤勞者 조사가 完了된 후 大學生調査가 追加로 이루어져서 勤勞者 조사경험을 통해 補完된 사항이 있었으며, 勤勞者의 敎育水準과 調査에 응답할 수 있는 勤勞環境(産業場

環境) 여건 때문에 조사의 受容可能性을 고려할 때 說問書의 길이와 문항의 難易度에 크게 제약을 받았기 때문이다. 이에 반하여 대학생 조사에서는 勤勞者 조사내용에서 포함하지 못한 社會 心理的 測定項目을 추가하여 성행태와의 연관성을 보다 深度 있게 把握하고자 하였다.

5. 모델設定 및 調査項目 選定의 限界點

우리 나라에서 性行態에 대한 先行硏究의 制約으로 제2장에서 제시한 外國의 理論的 모델을 活用하였으나 성행태를 說明하기에 包括的인 모델을 제시하기에는 限界가 있다고 본다. 또한 앞의 4항과 관련되어 大學生 조사에서 活用한 社會心理學的 變數(즉, 父母의 養育에 관한 항목, 大學生活 및 친구의 影響에 관한 項目, 알콜의 期待心理效果에 관한 항목, 宗敎性에 관한 항목 등)가 外國에서 開發된 각 방면의 領域項目과 尺度를 우리 나라의 실정에 맞추어 다소 調整하여 사용하였고 測定項目의 信賴性과 妥當性을 分析 제시하기는 하였으나 이에 관한 先行硏究가 우리 나라에는 없는 狀況에서 각 領域의 測定項目의 包括性과 성행태 關聯要因으로서의 妥當性에 대해서는 繼續的인 연구를 통하여 補完하여야 할 事項이라고 하겠다.

6. 性行爲 相對者에 대한 性行態 把握을 통한 比較의 必要

本 硏究에서는 勤勞者와 大學生의 성행태에 대한 조사에서 男性側만을 조사하였기 때문에 이들의 性行爲의 重要한 相對者가 되는 女性側의 성행태와 直接的인 연관성을 파악하지 못하고 많은 部分에서 推測을 통하여 硏究結果를 설명해야 하는 制約이 있었다. 과거 조사자료 중 勤勞女性과 女子 大學生에 대한 조사는 1-2편이 있으나 조사시기가 10여년 經過하였고 조사지역과 조사내용이 相異하여 比較가 不可能하였다. 本 調査가 동일한 지역의 勤勞女性과 女子 大學生을 포함하였을 경우 이들의 성행태를 構造的으로 明確하게 聯關지어 이들의 성행태를 理解하는데 보다 좋은 자료를 제시할 수 있을 것으로 보인다.

第 4 章　性行態의 一般 樣相

第 1 節　應答者의 社會·人口學的 特性

본 조사에서는 未婚男子 집단으로 우리 나라 社會에서 대표되면서 社會·經濟적으로 대조되는 勤勞者 集團과 大學生 集團을 비교하고자 하였다.

1. 應答者의 社會·人口學的 特性

본 연구에서는 勤勞者는 서울과 수도권의 대단위 工團地域인 서울 구로공단과 부천시 공단지역의 製造業 부문의 産業場에서 근무하는 未婚의 男子 勤勞者들을 조사대상으로 하였으며, 大學生은 서울 시내 소재 4개 大學의 1-4학년 학생을 調査對象으로 하였는데 이들의 社會·人口學的 特性을 비교해 보면 <표 4-1>과 같다.

勤勞者의 평균 연령은 25.3세이며 25-29세의 年齡層이 가장 높아 52.7%를 차지하였고 大學生은 평균 22.1세로 20-24세의 年齡層이 60.2%로 勤勞者에 비해 19세 이하의 比率과 20-24세 年齡層의 比率이 높아 勤勞者 집단보다 연령이 낮은 것으로 나타났다. 一般 製造業 부문의 미혼 남자 勤勞者의 연령 分布와 비교하면(노동부, 1992)[1] 20대 年齡層의 比率이 약간 높고 19세 이하의 年齡層이 다소 낮은 편이었다. 敎育水準은 전체 製造業 부문 남자 賃金 勤勞者의 학력수준(통계청, 1990)보다 다소 높은 것으로 나타났다.

勤勞者의 敎育水準은 고등학교 졸업, 중퇴의 학력을 가진 勤勞者가 76.9%로 수위를 차지하고 있다.

---

1) 입직자 기준

표 4-1. 應答者의 一般 特性

특 성	근로자		대학생	
	%	N	%	N
계	100.0	(1,039)	100.0	(1,103)
연령군[1]				
≤18	7.3	(76)	19.1	(211)
20-24	29.9	(310)	60.2	(664)
25-29	52.7	(547)	20.5	(226)
30+	10.0	(76)	0.2	(2)
평균(S.D.)	25.3(3.6)		22.1(2.5)	
교육수준*				
중학이하(1년)	4.7	(49)	24.0	(265)
고등학교(2년)	76.9	(799)	25.8	(285)
전문대학(3년)	8.5	(88)	29.1	(321)
대학교(4년)	9.9	(103)	21.0	(232)
군복무 경험[2]				
군 필	70.8	(735)	42.1	(464)
군미필	29.2	(303)	57.9	(638)
주거주지				
대도시	42.4	(441)	64.5	(711)
중소도시	15.5	(161)	19.5	(215)
읍·면, 기타	42.1	(437)	16.0	(177)
현재 거처				
부모집	38.4	(399)	52.4	(578)
형제집	7.2	(75)	4.9	(54)
친척집	3.3	(34)	3.0	(33)
기숙사	23.1	(240)	8.1	(89)
하 숙	2.5	(26)	11.2	(124)
자취, 기타	25.5	(265)	21.6	(225)
부모와 별거경험(중·고재학시)[3]				
있 다	36.4	(378)	24.8	(274)
없 다	63.6	(660)	75.2	(829)

<주> * 교육수준의 ( )는 대학생의 학년임.
1) 근로자 무응답 2명 제외
2) 근로자, 대학생 무응답 1명 제외
3) 근로자 무응답 1명 제외

표 4-1. (계속)

특 성	근로자		대학생	
	%	N	%	N
부모 생존여부[4]				
두분생존	70.7	(730)	88.9	(981)
편부(부만 생존)	4.1	(42)	0.7	(8)
편모(모만 생존)	20.0	(206)	8.3	(91)
부모사망	4.0	(41)	0.6	(7)
이혼·별거	1.3	(13)	1.5	(16)
부의 교육수준[5]				
무 학	5.8	(59)	2.2	(24)
국민학교	36.8	(371)	12.3	(134)
중 학 교	25.2	(254)	13.1	(143)
고등학교	25.6	(258)	32.7	(356)
대학이상	6.5	(66)	39.7	(433)
모의 교육수준[6]				
무 학	14.5	(143)	4.1	(45)
국민학교	50.1	(496)	26.9	(294)
중 학 교	20.5	(203)	21.9	(239)
고등학교	12.6	(125)	30.5	(333)
대학이상	2.2	(22)	16.5	(180)

<주> 4) 근로자 무응답 7명 제외
5) 근로자, 대학생 무응답 각각 31명, 13명 제외
6) 근로자, 대학생 무응답 각각 50명, 12명 제외

兵役을 마친 勤勞者는 70.8%였으며 나머지 29.2%는 兵役 未畢 또는 免除者였으며, 大學生은 42.1%가 병역을 마친 것으로 나타났다.

태어난 이후 가장 오래 居住한 지역은 읍·면지역이 42.1%로써 현재 勤務地가 大都市임에도 農村地域 출신이 많은 것으로 나타났다. 이에 비하면 大學生의 成長地域은 大都市가 64.5%로 나타나 이들의 出身地別 文化的인 배경에 차이가 있는 것으로 볼 수 있다.

父母의 특성과 관련된 變數에서는 특히 勤勞者 集團과 대학생 집단의 차이를 볼 수 있다. 大學生 集團에 비해서 勤勞者 集團은 조사 현재 居住하고 있는 곳이 부모 형제집을 떠나 회사 기숙사나 자취를 하고 있는 사람의 비율이 높고,[2] 중·고등학교 시절 父母와 別居한 經驗이 있는 사람이 많았으며, 현재 父母가 생존해 있지 않고 偏母 膝下, 偏父 膝下인 경우가 높았다. 부모의 敎育水準에서도 차이를 보여 父母 모두 大學生 集團에 비해 낮은 學歷水準을 가진 것으로 나타나 勤勞者 集團은 부모의 支援과 統制를 덜 받는 階層으로 나타나고 있다.

<표 4-2>에서 勤勞者 集團과 大學生 集團의 經濟的 특성의 분포를 보면 자신이 主觀的으로 評價한 가정의 生活水準에도 근로자 집단이 대학생에 비해 가정의 經濟水準을 낮게 評價한 것으로 나타나고 있다. 月平均 收入과 용돈은 勤勞者 集團이 현재 固定 收入이 있기 때문에 높게 나타나고 있다. 勤勞者의 月平均 收入은 71만원으로 1992년 生産職 勤勞者의 月平均 賃金 727,000원(통계청, 1993)과 비슷한 수준이었다. 勤勞者의 경우 月收入의 주요 용도가 가계보조 및 자신의 生活費임을 볼 때 자신이 生計에 책임을 지고 經濟的으로 獨立한 경우가 많을 것으로 볼 수 있다.

2) 기숙사 거주가 높은 것은 일부 기업에서는 미혼의 근로자에게 기숙사를 제공하기 때문이며, 자취는 대개의 경우 공단 주변의 열악한 주택가에서 한칸 방을 사용하는 것으로 보인다.

표 4-2. 應答者의 經濟的 特性

내 용	근 로 자		대 학 생	
	%	N	%	N
계	100.0	(1,039)	100.0	(1,103)
가정의 생활수준[1]				
상	17.9	(185)	40.6	(448)
중	58.3	(602)	41.3	(456)
하	23.8	(246)	18.0	(199)
월평균 수입[2]				
50만원 미만	10.7	(104)	40.1	(413)
50-70만원 미만	34.9	(339)	4.7	(49)
70-90만원 미만	31.8	(309)	0.5	(5)
90만원 이상	22.6	(219)	0.6	(6)
없음	-	-	54.1	(558)
평균(S.D.)	71.0(20.3)만원			
월평균 용돈[3]				
10만원 미만	9.6	(94)	4.8	(52)
10-30만원 미만	72.5	(713)	72.2	(786)
30-50만원 미만	14.4	(142)	21.5	(234)
50만원 이상	3.5	(34)	1.3	(14)
월수입의 주요 용도[4]				
가계보조	16.7	(165)		
형제학비보조	1.3	(13)		
자신의 생활비	21.3	(210)		
자신의 용돈	16.0	(150)		
저 축	44.1	(436)		

<주> 1) 근로자 무응답 6명 제외
2) 근로자, 대학생 무응답 각각 68명, 72명 제외
3) 근로자, 대학생 무응답 각각 56명, 17명 제외
4) 근로자 무응답 57명 제외

2. 吸煙 및 飮酒 實態

가. 吸煙 實態

勤勞者의 吸煙實態는 근로자는 現 吸煙者가 73.9%였으며 대학생은 現 吸煙者가 54.7%로써 대학생 집단은 근로자 집단에 비해 年齡階層이 낮은 점을 감안하더라도 근로자 집단에서 吸煙人口 비율이 대학생 집단에 비해서 월등 높은 것으로 나타났다. 이는 1992년도 國民健康調査(송건용 외, 1993)의 일반인구 중 20-29세 연령층의 吸煙率과 비교할 때 근로자 집단의 吸煙率이 높은 것으로 나타났으며, 1989년도 근로 靑少年의 吸煙率 81.1% (체육부, 1989)[3]과 비교할 때는 다소 낮은 것으로 나타났다(표 4-3 참조).

표 4-3. 應答者의 吸煙率

(단위: %)

흡연실태	근로자 (N=989)	대학생 (N=1,103)	1992년 국민건강조사 20-29세 남자 (N=310)
반갑이하 피움	40.1	32.8	68.5
한갑이상 피움	33.8	21.9	-
과거 흡연	7.6	10.7	8.8
흡연 무경험	18.5	34.5	22.7

나. 飮酒 實態

선행 연구에서 제시된 바와 같이 飮酒가 性行爲 특히 위험이 내재된 性行爲에 미치는 영향이 크다는 것이 여러 行態硏究에서 밝혀지고 있다.

응답자의 飮酒實態를 보면 <표 4-4>와 같이 飮酒人口는 근로자가 90.7%, 대학생이 94.4%로 대학생의 飮酒率이 약간 높으나 飮酒頻度와 평균

3) 취업중인 근로청소년 501명에 대한 조사결과임.

음주량을 보면 勤勞者 集團에서 飮酒頻度가 잦은 사람의 비율이 높고 1회 平均 飮酒量도 많은 사람의 비율이 대학생 집단에 비하여 높았다. 1992년 國民健康調査의 일반인구중 20-29세 남자인구의 飮酒率과 비교하면 본 조사 대상자인 근로자와 대학생 집단의 飮酒人口 比率이 높은 것으로 나타났다.

표 4-4. 應答者의 飮酒實態

(단위: %)

흡연실태	근로자	대학생	1992년 국민건강조사 20-29세 남자
계	100.0	100.0	100.0
(N)	(1,038)	(1,102)	(310)
음주여부			
마 심	90.7	94.4	78.5
안마심	9.3	5.6	21.5
첫음주시 연령			
≤14	2.6	1.9	
15-19	51.9	68.6	
20+	45.5	29.4	
평균	18.9세	19.4세	
(S.D.)	(2.3)	(2.4)	
음주횟수/월			
거의 매일 마심	6.6	3.2	3.7
3-4회/1주	30.8	9.5	22.2[1)]
1-2회/1주	24.0	39.1	-
2-3회/1달	26.7	40.2	37.9[2)]
1회/1달	8.2	10.2	14.9[3)]
안마심	3.6	3.7	21.5
1회 평균음주량			
소주 1-2잔 정도	15.9	18.3	
소주 반병 정도	34.0	40.9	
소주 1병 정도	36.0	32.1	
소주 2병 이상	14.1	8.7	

<주> 1) 주 2-4회 2) 월 2-4회 3) 월 1회 이하

第 2 節 性에 關한 知識

1. 性敎育 履修 現況

미혼 근로남성과 대학생들의 性敎育 履修狀態를 파악하는 것은 性敎育이 性에 대한 知識 및 性行態에 영향을 미칠 수 있으며 앞으로 이들 대상에 대한 性敎育 方向 設定에 중요한 資料가 될 수 있다. 본 조사에서는 응답자가 받은 性敎育의 출처와 媒體의 종류를 있는 대로 표시하게 하였고 性敎育 履修 횟수와 敎育效果의 평가에 대해서는 의견을 택일하게 하였다.

응답자가 家族計劃 및 性病 등을 포함한 性敎育을 받은 經驗을 보면 교육을 받은 곳은 勤勞者에서는 학교에서 받은 경우가 60.2%로 가장 높았고 宗敎團體 등의 모임, 職場의 순서로 나타나고 있다. 대학생에서는 학교가 가장 높았고 그 다음이 모임, 기타로 나타났다. 이러한 結果는 應答者의 대부분이 性敎育을 공식적으로 받은 것에 대하여 1차로 응답하고 있는 것으로 보이는 한편 家庭에서의 敎育 및 個別相談을 받은 경우가 적은 것으로 나타나고 있다. 大學生에서는 모임이라든가 기타의 出處에서 性敎育을 받은 機會가 많은 것으로 나타나고 있다(표 4-5 참조).

性敎育을 받은 회수를 보면 勤勞者와 大學生 모두 2-3회가 가장 많았다. 근로자의 24.5%, 대학생의 19.1%가 性敎育을 전혀 받지 않았다고 하였다. 性敎育 內容에 대해서는 근로자 및 대학생 집단에서 비슷한 意見을 보여 약간 도움이 되었다는 의견이 다소 높은 편이나 별 도움이 되지 않았다는 意見도 많은 것으로 나타났다(표 4-6 참조).

어디를 통해서 받았는가, 어느 敎育資料를 보았는가, 몇 번의 敎育을 받았는가에 따라 性敎育의 效果를 구분하여 본 결과 <표 4-7>과 <표 4-8>에서 보는 바와 같이 가정에서 敎育을 받았을 때와 個別相談을 받았을 때 敎育效果가 높은 반면, 學校를 통한 교육은 별 도움이 안되는 것으로 응답

하고 있으며, 敎育媒體 별로는 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 敎育回數에 따라서는 차이를 보여 敎育回數가 많을수록 교육이 도움이 되었다고 한 반면 敎育回數가 1회일 경우에는 敎育이 별 도움이 되지 못한 것으로 評價하고 있어 性敎育 프로그램은 일시적으로 이루어져서는 效果가 없고 적어도 수 차에 걸쳐 反復해서 이루어져야 效果가 있는 것으로 보인다.

표 4-5. 應答者의 性敎育 履修實態

(단위: %)

성교육 출처 및 매체	근로자 (N=1,035)	대학생 (N=1,103)
성교육 출처		
가 정	7.8	12.6
학 교	60.2	66.8
직 장	16.5	-
모 임	20.0	26.8
개별상담	5.8	5.2
기 타	3.3	24.8
교육매체[1]		
스라이드	31.1	25.7
비 데 오	23.2	17.9
영 화	10.1	2.5
강 연	31.5	16.5
책자, 팜프렛	25.2	18.3
교육매체접촉 없음	24.4	19.1

<주> 1) 대학생의 경우 택 1을 한 결과를 백분율로 나타냄.

표 4-6. 應答者의 性敎育 履修 程度 및 敎育評價

(단위: %)

	근로자	대학생
교육이수경험 횟수		
계	100.0	100.0
(N)	(1,024)	(1,101)
1회	13.4	15.2
2-3회	41.6	48.3
4-5회	9.9	10.7
6회 이상	10.6	6.7
교육받지 않음	24.5	19.1
성교육효과 평가		
계	100.0	100.0
(N)	(781)	(887)
아주 도움이 됨	11.9	5.4
약간 도움이 됨	44.3	35.1
그저 그랬음	21.4	18.1
별 도움이 안됨	19.8	34.2
전혀 도움이 안됨	2.6	7.3

<주> 1) 성교육을 받은 경험이 없는 경우와 무응답을 제외한 백분율 분포임.

표 4-7. 性敎育 效果에 대한 自己評價(勤勞者)

평가내용	아주 도움됨	약간 도움됨	그저 그랬음	그저 그랬음	전혀 도움안됨	계
교육이수처[1]						
가 정	27.2	40.7	16.0	12,3	3.7	100.0 (81)
			χ^2=22.1(p=.002)			
학 교	11.1	43.2	21.2	21.2	3.2	100.0(622)
			χ^2=10.5(p=.0324)			
직 장	20.7	48.5	17.8	10.7	2.4	100.0(169)
			χ^2=25.4(p=.0000)			
모 임	17.6	49.3	16.1	15.6	1.5	100.0(205)
			χ^2=16.5(p=.0025)			
개별상담	25.4	35.6	15.3	20.3	3.4	100.0 (59)
			χ^2=12.5(p=.0142)			
기 타	15.2	36.4	21.2	27.3	-	100.0 (33)
			χ^2=2.6(N.S.)			
교육매체[1]						
스라이드	12.8	48.3	17.8	18.4	2.8	100.0(321)
			χ^2=5.9(N.S.)			
비 데 오	15.4	42.1	20.4	19.6	2.5	100.0(240)
			χ^2=4.1(N.S.)			
영 화	16.7	48.0	21.6	11.8	2.0	100.0(102)
			χ^2=6.6(N.S.)			
강 연	14.8	43.7	20.6	18.8	2.2	100.0(325)
			χ^2=4.6(N.S.)			
책자, 팜프렛	12.7	50.8	19.6	15.0	1.9	100.0(260)
			χ^2=9.5(p=.0494)			
교육이수 경험이수						
1회	7.3	30.7	27.7	27.7	6.6	100.0(137)
2-3회	9.6	46.9	21.7	20.0	1.9	100.0(429)
3-5회	13.7	59.8	10.8	14.7	1.0	100.0(102)
6회이상	24.8	37.6	21.1	14.7	1.8	100.0(109)
			χ^2=58.6(p=.000)			

N.S. : Not significant

<주> 1) 근로자 조사에서 성교육 이수처 및 교육매체는 있는대로 전부 응답하도록 한 결과임.

표 4-8. 性敎育 效果에 대한 自己評價(大學生)

평가내용	아주 도움됨	약간 도움됨	그저 그랬음	그저 그랬음	전혀 도움안됨	계
교육이수처[1]						
가 정	9.5	36.5	19.7	32.1	2.2	100.0(137)
			χ^2=29.1(p=.0003)			
학 교	4.9	34.5	18.0	35.1	7.5	100.0(734)
			χ^2=20.5(p=.0085			
모 임	6.6	38.4	20.1	30.1	4.8	100.0(289)
			χ^2=10.8(N.S.)			
개별상담	15.8	33.3	17.5	29.8	3.5	100.0 (57)
			χ^2=14.7(N.S.)			
기 타	5.4	31.9	18.7	35.4	8.6	100.0(257)
			χ^2=2.0(N.S.)			
교육매체[2]						
스라이드	3.9	27.9	17.7	41.3	9.2	100.0(283)
비 데 오	3.1	36.7	16.3	36.2	7.7	100.0(196)
영 화	7.4	44.4	3.7	37.0	7.4	100.0 (27)
강 연	7.7	40.7	20.3	28.0	3.3	100.0(182)
책자, 팜프렛	7.6	37.6	20.3	26.4	8.1	100.0(197)
			χ^2=37.8(p=.0092)			
교육이수 경험이수						
1회	1.8	25.7	13.8	41.3	17.4	100.0(167)
2-3회	3.8	35.5	18.0	36.3	6.4	100.0(532)
3-5회	9.3	44.1	19.5	26.3	0.8	100.0(118)
6회이상	23.3	35.0	30.0	11.7	-	100.0 (60)
			χ^2=115.2(p=.0000)			

N.S.=Not significant

<주> 1) 대학생 조사에서 성교육 이수처는 있는대로 전부 응답하도록 한 결과임.
2) 대학생 조사에서 성교육 매체는 택일하도록 한 것임.

2. 性에 대한 知識

본 연구에서는 性에 대한 知識을 避妊에 대한 知識과 性에 대한 일반 지식, 性病 및 AIDS의 전파와 感染에 관한 지식으로 나누어 근로자와 대학생의 性에 대한 知識程度를 把握하였다.

가. 避妊에 대한 知識

避妊方法에 대한 근로자 및 대학생의 知識程度를 보면 <표 4-9>와 같이 콘돔, 정관수술 등 남성측이 選擇하는 避妊方法에 대한 지식은 높았으며 여성측이 사용하는 避妊方法 중에서는 먹는 피임약에 대한 知識水準이 높았다. 근로자와 대학생을 비교하면 避妊方法별로 다소 차이가 있지만 대체로 大學生 集團이 피임방법에 대한 知識이 많은 것으로 나타났다. 9가지의 피임방법 중 한가지도 아는 방법이 없는 경우가 勤勞者에서 5.7%(58명), 大學生에서는 5.3%(59명)로 비슷하였다.

표 4-9. 避妊方法에 대한 知識

피 임 방 법	근 로 자 (N=1,024)		대 학 생 (N=1,102)	
	안다	모른다	안다	모른다
먹는피임약	70.8	29.2	67.5	32.5
콘 돔	91.5	8.5	93.0	7.0
자궁내장치	26.8	73.2	25.5	74.5
난관수술	48.9	51.1	59.1	40.9
정관수술	63.4	36.6	78.3	21.7
월경주기법	51.4	48.6	70.4	29.6
질외사정법	47.8	52.2	67.8	32.2
질 좌 약	32.9	67.1	42.1	57.9
주 사 약	14.4	85.6	11.3	88.7
전 체[1)]	94.3	5.7	94.7	5.3

<주> 1) 피임방법을 한가지 이상 아는 경우임.

避妊方法에 대한 知識의 情報源으로는 주간지나 월간잡지, 책자가 가장 많았고 그 다음이 친구, 그 다음이 라디오, TV 등의 電波媒體였다. 반면 가족이나 保健醫療人力으로부터 避妊知識을 전달받은 경우는 낮은 것으로 나타나 대부분이 大衆媒體를 통해 避妊知識을 습득하고 있는 것으로 나타났다. 전달자로는 친구가 큰 媒介 役割을 하는 것으로 나타났으며, 근로여성에 대한 調査結果(홍문식·서문희, 1984)와 비교하면 女性에서는 친구 이외에도 가족이 情報源으로서 役割을 하는 데 비하여 男子에서는 피임에 관한 情報源으로서 가족의 役割이 낮은 것으로 나타나고 있다(표 4-10 참조).

표 4-10. 避妊方法에 대한 知識 情報源

정 보 원	남성근로자[1] (N=959)	남자대학생[1] (N=1,036)	여성근로자[2] (N=918)
주간지, 월간잡지	63.8	63.6	84.1
책 자	52.1	67.0	24.6
라디오, TV	24.8	22.9	54.1
직장교육	10.4	-	39.7
학 교	30.1	33.0	49.1
친 구	53.0	59.5	66.5
가 족	4.6	3.4	28.3
의사·간호사	8.5	3.3	12.1
보건요원	11.0	2.5	21.7
기 타	1.5	3.2	5.1

<주> 1) 본조사 자료
2) 홍문식·서문희, 미혼근로여성의 인구 및 성에 대한 지식·태도 조사연구, 한국보건사회연구원, 1984.

나. 性에 대한 一般 知識程度

性에 대한 知識水準을 측정하기 위하여 性과 관련된 7개 問項을 提示하고, 이들 問項중 (1)-(3)은 正答與否를 표시하도록 하였고, (4)-(7) 문항은 보기에서 正答을 選擇하도록 하는 방법을 사용하였다.

性에 대한 知識水準은 勤勞者, 大學生 모두 높으나 대학생 집단이 좀 더 높은 것으로 나타났다. 한 번의 性交만으로도 姙娠이 가능하다는 정답률이 근로자에서 73%, 대학생이 84%, 人工姙娠中絶의 危害與否에 관하여 정답을 指摘한 勤勞者가 71.5%, 大學生은 84.1%, 근로자의 4.6%와 대학생의 0.7%가 키스만으로는 姙娠이 가능하다고 잘못 알고 있는 것으로 나타났다. 한 가지 이상의 避妊方法을 알고 있는 比率이 勤勞者의 경우 95%, 大學生이 99.8%였으며, 콘돔이 性病 및 姙娠豫防效果가 있다는 것을 알고 있는 정답률이 두 집단 모두 높아 勤勞者에서 96.7%, 大學生이 99.5%였고, 또한 고환의 生殖機能과 몽정에 관해서도 근로자, 대학생 거의 모두가 알고 있었다 (표 4-11 참조).

性病感染 및 性病豫防에 대한 知識水準을 보면 성병감염에 대해서는 잘못 알고 있는 경우가 상당수 이르고 있으며, 특히 感染經路에 대해서 키스나 공중변소, 목욕탕을 통한 感染可能性을 우려하는 사람들도 많았다. 性病이 예방접종으로 防止될 수 있다고 잘못 알고 있는 사람들도 많은 것으로 나타났다.

표 4-11. 應答者의 性에 관한 知識水準(認知率)

내 용	근 로 자		대 학 생	
	인지율	(N)	인지율	(N)
(1) 1회성교의 임신가능성 여부	73.0	(1,026)	84.0	(1,102)
(2) 인공유산 위해여부	71.5	(1,013)	84.1	(1,100)
(3) 키스에 의한 임신가능성여부	95.4	(1,014)	99.3	(1,098)
(4) 한가지 이상 피임방법 인지	95.0	(991)	99.8	(1,100)
(5) 성병 및 임신예방 겸용방법	96.7	(1,100)	99.5	(1,100)
(6) 정자생산생식기(고환)	95.8	(989)	99.8	(1,098)
(7) 몽 정	95.4	(989)	99.8	(1,099)

<주> N: 근로자, 대학생 각 문항에서 무응답을 제외한 응답자수임.

性病豫防方法 중 콘돔에 대해서는 비교적 認知率이 높으나 豫防效果가 없는 기타 방법이 效果 있다고 알고 있는 사람들이 많았다. 즉 性病感染과 豫防에 대해서 정확하게 알고 있지 않은 사람들이 상당수 있는 것으로 나타났다(표 4-12 참조).

표 4-12. 性病傳染 및 性病豫防에 대한 認知率

	근 로 자		대 학 생	
	인지율	N	인지율	N
성병감염				
성병환자와 키스하면 감염됨	55.0	(1,022)	62.1	(1,098)
공중목욕탕, 공중변소에서 감염됨	25.9	(1,025)	26.2	(1,099)
태반감염이 될 수도 있음	76.3	(1,025)	71.8	(1,100)
예방접종으로 감염이 방지됨	59.1	(1,023)	67.9	(1,098)
성병감염 경험자는 영구면역됨	83.0	(1,022)	81.7	(1,099)
성병예방				
성교시 콘돔 사용	92.5	(1,020)	93.7	(1,099)
성교 전후 항생제 복용 및 주사	32.2	(1,006)	40.3	(1,093)
성교후 즉시 소변	47.0	(1,006)	64.7	(1,092)
성교후 즉시 세척	35.8	(1,008)	52.6	(1,091)
질내에 사정을 하지 않음	62.8	(1,003)	73.3	(1,091)

<주> N: 근로자, 대학생 각 문항에서 무응답을 제외한 응답자수임.

<표 4-13>에서 性病에 대한 知識源을 보면 신문, 잡지 등의 印刷媒體가 가장 많았으며, 친구나 선후배 등 동료도 性病知識源으로서 중요한 役割을 하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-14>에서 AIDS에 대한 知識程度를 보면 AIDS가 性病이라는 사실과 治療可能性에 대해 바르게 알고 있는 사람은 2/3 정도이며 나머지 1/3은

잘못 알고 있는 것으로 나타났다. AIDS 感染經路에 대해서는 면도기를 같이 쓰는 경우의 상처를 통한 血液 感染 可能性에 대해서는 모르고 있는 사람이 다소 높은 것으로 나타났으며, 키스나 술잔 공유, 공중변소, 공중목욕탕을 통한 感染 可能性을 우려하는 사람들이 많은 것으로 보여 AIDS 感染經路에 대한 無知가 露出되고 있어 問題點으로 指摘될 수 있다.

표 4-13. 性病에 대한 知識 情報源

정 보 원	근로자 (N=1,010)	대학생 (N=1,099)
라디오·TV	15.0	9.9
신문·잡지·인쇄물	35.2	50.1
보건소, 병·의원	4.5	2.3
친구, 선·후배	33.1	26.7
학교·직장	10.7	9.5
기 타	1.5	1.5

표 4-14. AIDS에 대한 知識水準

내 용	근 로 자		대 학 생	
	인지율	(N)	인지율	(N)
AIDS의 성병여부에 대한 인지도	78.8	(1,038)	74.7	(1,100)
AIDS 치료가능성 여부	68.1	(1,033)	75.5	(1,100)
AIDS 감염가능성에 대한 지식				
감염자와 성교시 감염	96.1	(1,018)	99.0	(1,094)
태반을 통한 감염	85.3	(1,012)	83.7	(1,093)
주사기를 통한 감염	91.3	(1,012)	96.6	(1,093)
면도기를 통한 감염	63.7	(1,010)	74.9	(1,093)
수혈을 통한 감염	95.2	(1,013)	99.2	(1,093)
키스를 통한 감염	36.9	(1,010)	49.0	(1,092)
술잔에 의한 감염	42.8	(1,008)	56.1	(1,092)
공중목욕탕, 변소사용 감염	46.3	(1,009)	56.3	(1,092)
공기를 통한 감염	68.8	(1,007)	83.3	(1,091)

<주> N: 근로자, 대학생 각 문항에서 무응답을 제외한 응답자수임.

<표 4-15>를 보면 AIDS에 대해서는 大衆媒體를 통해 知識을 習得한 경우가 많아 대국민 弘報가 비교적 활발했던 것으로 볼 수 있다. 우리 나라에 AIDS 問題가 어느 정도 심각하다고 느끼느냐는 질문에 대해서는 勤勞者 集團이 보다 심각하다고 느끼고 있는 것으로 나타났다.

표 4-15. AIDS에 대한 知識 情報源

(단위: %)

정 보 원	근로자 (N=1,036)	대학생 (N=1,099)
신문·잡지	83.2	84.3
라디오·TV·비디오	89.9	84.6
보건소 홍보자료	46.7	33.5
친구, 선·후배	41.6	32.7
학교선생님	22.4	25.8
직 장	31.4	-
병·의원	25.1	8.7
가 족	10.1	6.9
기 타	1.2	1.0

大學生에 대해서는 자신이 AIDS에 感染될 可能性을 어느 정도라고 보는가에 대해 추가질문을 한 결과 거의 없음이 41.2%, 전혀 없음이 18.2%로 대부분 AIDS가 자신과는 거의 關聯이 없다고 느끼고 있는 것으로 나타났다 (표 4-16, 표 4-17 참조).

표 4-16. AIDS의 深刻性에 대한 態度

태 도	근로자	대학생
계	100.0	100.0
(N)	(1,036)	(1,099)
매우 심각함	16.4	6.6
심각함	54.9	53.3
심각치 않음	11.7	25.2
전혀 심각치 않음	2.5	0.6
모 름	14.5	14.3

표 4-17. 本人의 AIDS 感染可能性에 대한 態度(大學生)

태 도	대학생
계	100.0
(N)	(1,103)
매우 많음	2.8
약간 있음	27.2
거의 없음	41.2
전혀 없음	18.2
모 름	10.6

3. 性에 관한 知識 및 相談 要求度

全國의 시·도 青少年 相談室의 相談內容을 보면 1992년 총 상담건수 18,815건 가운데 性問題가 24%(4,541건)으로 가장 높아 性問題가 青少年 전반에 걸쳐 매우 비중이 높은 葛藤要因으로 나타나고 있다(문화체육부, 1993).[4] 근로여성을 대상으로 한 先行硏究 결과에서도 性問題에 대한 相談이나 프로그램의

4) 상담대상은 19-24세의 청소년임.

要求度가 매우 높은 것으로 나타나고 있다. 김 등(1991년)의 硏究 結果(김한경 외, 1991)에서는 勤勞女性의 92.1%가 性相談 등의 프로그램의 필요성을 느끼고 있으며 홍 등의 연구 결과(홍문식 외, 1984)에서도 51%가 異性 및 性問題 발생시 相談을 願하는 것으로 나타났다. 본 연구의 대상이 男子勤勞者 및 대학생이라는 점에서 이들과의 비교는 意味가 있을 것으로 보인다. 性에 관한 知識을 요구하는 對象者의 비율은 근로자가 66.8%, 대학생이 64.9%로 2/3 정도가 性에 대해 보다 알기를 원하고 있으며 勤勞者의 39.7%, 大學生의 33.8%가 性에 관하여 相談을 원하고 있는 것으로 나타나고 있어 靑少年期의 여성들뿐 아니라 남성들도 性敎育 프로그램에 대한 要求度는 높은 것으로 나타났다(표 4-18 참조).

표 4-18. 性에 대한 知識要求度 및 性問題 相談 希望與否

성지식 및 상담요구	근로자	대학생
성지식 요구도		
계	100.0	100.0
(N)	(994)	(1,087)
요 구	66.8	64.9
비요구	33.2	35.1
성상담 희망		
계	100.0	100.0
(N)	(1,002)	(1,090)
매 우 원 함	8.6	3.8
원 함	31.1	30.0
원하지 않음	60.3	66.2

응답자의 人口學的 特性別 性에 대한 知識 요구도는 <표 4-19>와 같다.

표 4-19. 應答者의 特性別 性知識 要求度

특 성	근 로 자		대 학 생	
	요구도	(N)	요구도	(N)
계	66.8	(994)	65.4	(1,087)
년령				
≤19	69.3	(75)	72.7	(209)
20-24	69.0	(297)	63.9	(657)
25-29	66.4	(521)	60.7	(219)
30+	60.6	(99)	-	(2)
	χ^2=2.6(N.S.)		χ^2=11.2(p=0.0104)	
교육수준*				
중학교이하 (1년)	68.2	(44)	70.1	(261)
고등학교이하(2년)	68.1	(766)	65.2	(282)
전문대이하 (3년)	69.0	(84)	65.6	(317)
대학교 졸업 (4년)	54.0	(100)	57.3	(227)
	χ^2=8.2(p=0.0412)		χ^2=8.9(p=0.0293)	
군복무				
군 필	65.1	(697)	58.2	(455)
군미필	70.6	(296)	69.7	(631)
	χ^2=2.5(N.S.)		χ^2=14.8(p=0.0001)	
장기 주거주지				
대도시	64.0	(422)	62.3	(702)
중소도시	67.5	(154)	68.2	(214)
읍·면	69.4	(418)	71.3	(171)
	χ^2=2.8(N.S.)		χ^2=6.3(p=0.0425)	

N.S.: Not significant

<주> * 교육수준의 ( )는 대학생의 학년임.

응답자가 원하는 性敎育 내용을 보면 性病과 AIDS가 우선적으로 꼽혔으며 미혼 대상자의 특성을 反影하는 異性交際가 그들의 당면 性에 관한 問題인 것으로 나타났다. 그 외의 사항에 대해서도 관심사가 많아 보다 包括的인 性敎育 프로그램이 필요한 것으로 나타나고 있다(표 4-20 참조).

표 4-20. 應答者가 원하는 性敎育 內容別 要求度

교 육 내 용	근로자 (N=989)	대학생 (N=1,085)
자위행위	13.2	13.5
성적충동	18.2	23.8
이성교제	24.7	31.2
피임방법	19.7	24.3
남녀생식기	21.0	13.1
성병/AIDS	31.6	25.2

第 3 節 性에 관한 態度

앞장의 선행연구에서 성에 대한 개인의 態度는 性行爲와 直接的으로 聯關되어 있으며 性에 대한 態度와 行爲는 社會 經濟的 계층에 따라 차이가 있는 것이 여러 연구에서 提示되고 있다. 본 연구에서는 性에 관한 態度에 관하여 우리사회에서 흔히 論難이 되고 있는 몇 가지 形態의 性行爲, 즉 婚前 性行爲에 대하여 남자측과 여자측에 대한 性行爲 許容度, 異性과의 婚前 性行爲에 대한 態度, 婚前 姙娠에 대한 態度, 同性戀愛에 대한 태도, 이성과의 同居에 대한 態度 등을 어느 정도 許容하는가 등의 性에 대한 개인의 規範을 조사하였다. 또한 여러 社會·人口學的 특성별로 性에 대한 態度를 비교 제시하고자 하였다.

婚前純潔에 대해서 근로자와 대학생의 態度에 차이가 나타나는데 근로자에 비해 대학생 집단이 婚前 純潔을 다소 더 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 특히 勤勞者 集團은 남성 자신들의 純潔意識이 낮은 반면, 여자측은 婚前 純潔을 반드시 지켜야 한다는 견해를 높이 표명하여 여성측에 대해서 純潔意識을 강하게 요구하는 態度를 가진 것으로 나타났다(표 4-21 참조).

1991년 出産力調査(김승권, 1992)에서는 未婚 男子의 21.9%가 반드시 지

켜야 한다, 50.8%가 가급적 지켜야 한다는 態度를 가졌으며, 여자측에 대해서는 40.4%가 반드시 지켜야 한다, 40.3%가 가급적 지켜야 한다는 態度를 가졌던 것으로 나타나 있어 본 조사결과가 婚前 純潔에 대한 중요성이 보다 퇴색된 것으로 받아들일 수 있다. 여자측에 대한 婚前 純潔은 근로자에서는 1991년 調査結果와 비슷한 態度를 보이고 있는 것에 비하여 대학생에서는 여성측이 婚前 純潔을 반드시 지켜야 한다기보다는 가급적 지켜야 한다는 意見이 높아 女性에 期待하는 純潔意識이 社會階層에 따라 차이가 있는 것으로 보인다. 즉 이러한 결과를 볼 때 社會階層이 높아지면서 여자에 대한 性 規範과 남자에 대한 性 規範의 차이를 크게 두지 않고 어느 정도는 平等한 意識을 가지고 있는 것으로 받아들여진다.

표 4-21. 婚前純潔에 대한 態度

태 도	근 로 자		대 학 생	
	남자	여자	남자	여자
계 (N)	100.0 (1,029)	100.0 (1,016)	100.0 (1,103)	100.0 (1,103)
반드시 지켜야 한다	13.1	42.5	15.5	28.7
가급적 지켜야 한다	47.7	39.7	42.2	41.8
지키지 않을수도 있다	27.5	12.7	36.0	25.2
지킬 필요가 없다	7.0	2.0	6.2	3.1
모르겠다	4.7	2.9	0.2	1.2

婚前 純潔에 대한 態度는 근로자에 있어서는 敎育水準, 군대경험 여부, 현재의 거처 등에 따라서는 有意한 차이를 보이지 않았으나 飮酒與否, 키스 경험여부, 異性 交際 經驗與否, 性行爲 경험여부에 따라 차이를 보였다. 즉 飮酒를 안하는 경우, 異性交際를 하지 않은 경우, 키스 경험이 없는 경우, 性交 經驗이 없는 경우 더 保守的인 傾向을 나타내는 것으로 나타났다. 여자측에 期待하는 혼전 순결에 대한 態度도 대상자의 特性에 따라 類似한 傾向을 나타내었다(표 4-22, 표 4-23 참조).

표 4-22. 勤勞者의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(남자측)

특 성	반드시 지켜야 함	가급적 지켜야 함	지키지 않을수도 있음	지킬 필요 없음	모르겠음	계 (N)
계	13.1	47.7	27.6	7.0	4.6	100.0(1,027)
연 령						
≤19	9.3	44.0	28.0	2.7	16.0	100.0 (75)
20-24	15.8	41.9	30.6	6.1	5.5	100.0 (310)
25+	12.3	50.9	26.0	7.9	2.8	100.0 (642)
			χ^2=39.3(p=.0001)			
교육수준						
중학이하	20.4	32.7	28.6	0.2	8.2	100.0 (49)
고등학교	13.4	47.8	26.7	7.1	4.9	100.0 (790)
전 문 대	10.3	48.3	29.9	8.0	3.4	100.0 (87)
대 학	9.7	53.4	31.1	3.9	1.9	100.0 (103)
			χ^2=12.9(p=.3711)			
군필여부						
군 필	12.0	49.4	28.2	7.2	3.3	100.0 (727)
군미필	15.9	43.9	25.6	6.6	8.0	100.0 (301)
			χ^2=14.4(p=.0059)			
장기거주지						
대 도 시	12.6	49.8	24.5	7.8	5.5	100.0 (436)
중소도시	14.4	48.8	25.0	8.1	3.8	100.0 (160)
농 촌	13.2	45.3	31.4	6.0	4.2	100.0 (433)
			χ^2=7.6(p=.4643)			
현재거처						
부 모	13.4	50.3	22.5	7.8	6.1	100.0 (396)
형제·친척	15.7	48.1	27.8	2.8	5.6	100.0 (108)
기숙사·하숙	12.2	44.9	31.2	7.2	4.6	100.0 (263)
자 취	12.6	46.6	31.3	7.3	2.3	100.0 (262)
			χ^2=16.3(p=.1743)			
부모와 별거경험						
있 다	12.5	45.1	32.3	6.7	3.5	100.0 (375)
없 다	13.3	49.3	24.8	7.2	5.4	100.0 (653)
			χ^2=7.7(p=.1012)			
음주여부						
마 심	11.7	48.4	29.1	7.2	3.6	100.0 (932)
안마심	27.1	40.6	12.5	5.2	14.6	100.0 (96)
			χ^2=48.2(p=.0000)			
현 이성교제여부						
교제함	11.4	47.2	30.3	8.2	3.0	100.0 (439)
안 함	14.3	48.0	25.6	6.1	6.0	100.0 (536)
			χ^2=10.0(p=.0391)			
키스경험 여부						
없 다	22.9	51.2	12.2	2.4	11.2	100.0 (205)
있 다	10.6	46.9	31.3	8.2	3.0	100.0 (821)
			χ^2=72.6(p=.0000)			
성교경험						
경 험	9.2	48.1	31.3	8.8	2.6	100.0 (805)
비경험	27.2	46.4	13.8	0.4	12.1	100.0 (224)
			χ^2=114.0(p=.0000)			

표 4-23. 大學生의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(남자측)

특 성	반드시 지켜야 함	가급적 지켜야 함	지키지 않을수도 있음	지킬 필요 없음	모르겠음	계 (N)
계	15.5	42.2	36.0	6.2	0.2	100.0(1,103)
연 령						
≤19	23.7	39.8	30.8	5.2	0.5	100.0 (211)
20-24	14.8	42.3	37.3	5.6	-	100.0 (664)
25+	10.1	43.9	36.8	8.8	0.4	100.0 (228)
			χ^2=22.8(p=.0291)			
학 년						
1학년	20.4	39.6	32.8	7.2	-	100.0 (265)
2학년	14.7	44.9	33.7	6.3	0.4	100.0 (285)
3학년	14.0	40.8	39.6	5.3	0.3	100.0 (321)
4학년	12.9	43.5	37.5	6.0	-	100.0 (232)
			χ^2=11.9(p=.4689)			
군필여부						
군 필	9.5	42.9	39.7	7.8	0.2	100.0 (464)
군미필	19.9	41.7	33.2	5.0	0.2	100.0 (638)
			χ^2=27.0(p=.0007)			
현재거처						
부 모	17.0	42.6	35.3	5.2	-	100.0 (578)
형제·친척	16.1	39.1	39.1	4.6	1.1	100.0 (87)
기숙사·하숙	13.6	42.3	36.2	8.0	-	100.0 (213)
자 취	13.3	42.2	26.4	7.6	0.4	100.0 (225)
			χ^2=12.3(p=.4147)			
부모와 벌거경험						
있 다	14.6	43.4	33.2	8.8	-	100.0 (274)
없 다	15.8	41.7	36.9	5.3	0.2	100.0 (829)
			χ^2=5.7(p=.2181)			
음주여부						
마 심	13.2	43.1	37.3	6.3	0.2	100.0(1,040)
안마심	54.8	25.8	14.5	4.8	-	100.0 (62)
			χ^2=79.7(p=.0000)			
이성교제여부						
교제함	13.1	44.4	36.3	6.2	-	100.0 (405)
안 함	17.0	40.9	35.8	6.2	0.1	100.0 (696)
			χ^2=27.9(p=.0000)			
키스경험 여부						
없 다	23.3	45.3	29.1	2.2	0.2	100.0 (506)
있 다	8.8	39.6	42.0	9.6	-	100.0 (593)
			χ^2=214.4(p=.0000)			
성교경험						
경 험	3.8	36.3	48.5	11.5	-	100.0 (400)
비경험	22.2	45.5	28.9	3.1	0.3	100.0 (703)
			χ^2=118.5(p=.0000)			

大學生에 있어서는 學年, 軍隊 經驗與否, 현재의 거처 등에 따라서는 有意한 차이를 보이지 않았으나 年齡, 飮酒與否, 키스 경험여부, 이성 교제 경험여부, 性行爲 경험여부에 따라 차이를 보였다. 즉 연령이 낮을수록, 飮酒를 안하는 경우, 異性交際를 하지 않은 경우, 키스 경험이 없는 경우, 性交 經驗이 없는 경우 더 保守的인 경향을 나타내는 것으로 나타났다. 여자측에 기대하는 婚前 純潔에 대한 태도도 對象者의 특성에 따라 類似한 傾向을 나타내었다(표 4-24, 표 4-25 참조).

異性과의 性行爲에 대해서는 性行爲 對象에 따라서도 근로자와 대학생의 態度에 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 대학생 집단은 평소 알고 있었던 여자와의 性行爲 및 結婚對象者와의 性行爲에 대해서 근로자 집단에 비하여 許容 程度가 낮았으며, 특히 淪落女性과의 性行爲에 대해서는 근로자 집단에 비하여 許容하지 않는 좀 더 保守的인 경향을 보였다(표 4-26 참조).

婚前 姙娠을 한 경우에 대한 態度도 근로자와 대학생간의 態度에 차이를 보이는데 근로자 집단에서는 대학생 집단에 비하여 반드시 낳아야 한다는 見解가 높은 반면 대학생 집단에서는 養育이 可能한 경우에 出産한다는 의견이 높아 性行爲의 結果에 대해서 보다 냉정한 입장을 취하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 대학생의 見解는 1991년 出産力調査를 分析한 연구결과(김승권, 1992)에서 양육가능시에 出産한다는데 대해서 지배적인 意見을 보인 女性들의 見解와 유사한 結果를 보이고 있다(표 4-27 참조).

AIDS로 인해 社會的으로 問題가 提起되기 시작한 同性戀愛(homo)와 최근 젊은 일부층에서 이루어지고 있는 男女 混宿에 대한 견해는 <표 4-28>에서 보는 바와 같이 매우 否定的이었으며 특히 동성간의 性關係에 대해서는 극히 否定的인 見解를 보였으며 특히 대학생이 근로자에 비하여 보다 否定的인 態度를 가진 것으로 나타났다.

표 4-24. 勤勞者의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(여자측)

특 성	반드시 지켜야 함	가급적 지켜야 함	지키지 않을수도 있음	지킬 필요 없음	모르겠음	계 (N)
계	42.6	39.5	12.9	2.0	3.0	100.0(1,014)
연 령						
≤19	37.3	38.7	14.7	1.3	8.0	100.0 (75)
20-24	40.8	40.5	14.1	1.0	3.6	100.0 (304)
25+	44.1	39.2	12.1	2.5	2.0	100.0 (635)
			χ^2=15.3(p=.2225)			
교육수준						
중학이하	43.8	25.0	22.9	4.2	4.2	100.0 (48)
고등학교	43.5	39.3	12.2	1.9	3.1	100.0 (779)
전문대	34.5	48.3	12.5	2.3	2.3	100.0 (87)
대 학	41.2	42.2	13.7	1.0	2.0	100.0 (102)
			χ^2=12.5(p=.4015)			
군필여부						
군 필	42.6	40.8	12.3	2.1	2.2	100.0 (721)
군미필	42.5	36.7	14.3	1.7	4.8	100.0 (294)
			χ^2=6.1(p=.1852)			
장기거주지						
대도시	44.2	38.1	12.9	1.4	3.5	100.0 (428)
중소도시	44.9	43.0	7.6	2.5	1.9	100.0 (158)
농 촌	40.0	40.0	14.9	2.3	2.8	100.0 (430)
			χ^2=8.9(p=.3481)			
현재거처						
부 모	43.8	38.7	11.3	2.3	3.8	100.0 (390)
형제·친척	39.3	40.2	15.0	-	5.6	100.0 (107)
기숙사·하숙	40.5	43.2	11.6	1.9	2.7	100.0 (259)
자 취	43.8	37.3	15.8	2.3	0.8	100.0 (260)
			χ^2=15.5(p=.2117)			
부모와 별거경험						
있 다	43.0	38.4	13.5	3.0	2.2	100.0 (370)
없 다	42.2	40.5	12.6	1.4	3.4	100.0 (645)
			χ^2=4.6(p=.3229)			
음주여부						
마 심	42.0	40.4	13.6	2.1	2.0	100.0 (920)
안마심	47.4	32.6	6.3	1.1	12.6	100.0 (95)
			χ^2=39.0(p=.0000)			
현 이성교제여부						
교제함	45.3	37.7	11.7	3.2	2.1	100.0 (435)
안 함	40.6	40.9	13.9	1.0	3.6	100.0 (577)
			χ^2=10.8(p=.0284)			
키스경험 여부						
없 다	47.5	34.3	9.1	0.5	8.6	100.0 (198)
있 다	41.3	41.0	13.7	2.3	1.6	100.0 (815)
			χ^2=39.3(p=.0000)			
성교경험						
경 험	40.8	41.6	14.1	2.3	1.3	100.0 (796)
비경험	48.6	32.7	8.6	0.9	9.1	100.0 (220)
			χ^2=47.2(p=.0000)			

표 4-25. 大學生의 特性別 婚前純潔에 대한 態度(여자측)

특 성	반드시 지켜야 함	가급적 지켜야 함	지키지 않을수도 있음	지킬 필요 없음	모르겠음	계 (N)
계	28.7	41.8	25.2	3.1	1.2	100.0(1,103)
연 령						
≤19	38.4	36.5	20.4	2.8	1.9	100.0 (211)
20-24	27.3	42.8	26.2	2.9	-	100.0 (664)
25+	24.1	43.9	26.8	3.9	1.4	100.0 (228)
			χ^2=17.3(p=.1383)			
학 년						
1학년	36.6	37.0	21.9	3.0	1.5	100.0 (265)
2학년	29.1	43.2	23.2	3.5	1.1	100.0 (285)
3학년	26.2	41.4	27.4	3.1	1.9	100.0 (321)
4학년	22.8	46.1	28.4	2.6	-	100.0 (232)
			χ^2=19.8(p=.0709)			
군필여부						
군 필	24.1	43.3	28.2	3.7	0.6	100.0 (464)
군미필	32.1	40.6	23.2	2.6	1.5	100.0 (616)
ROTC	31.8	45.5	13.6	4.5	4.5	100.0 (22)
			χ^2=15.1(p=.0569)			
현재거처						
부 모	30.4	42.6	23.7	2.1	1.2	100.0 (578)
형제·친척	27.6	36.8	28.7	3.4	3.4	100.0 (87)
기숙사·하숙	27.2	42.3	24.9	5.2	0.5	100.0 (213)
자 취	26.2	41.3	28.0	3.6	0.9	100.0 (225)
			χ^2=13.5(p=.3306)			
부모와 별거경험						
있 다	26.3	43.8	24.8	4.7	0.4	100.0 (274)
없 다	29.6	41.1	25.3	2.5	1.4	100.0 (829)
			χ^2=6.4(p=.1677)			
음주여부						
마 심	26.8	42.6	26.3	3.1	1.3	100.0(1,040)
안마심	61.3	27.4	8.1	3.2	-	100.0 (62)
			χ^2=37.2(p=.0000)			
이성교제여부						
교제함	26.7	45.4	24.0	2.5	1.5	100.0 (405)
안 함	30.0	39.8	25.9	3.4	0.9	100.0 (696)
			χ^2=47.4(p=.0000)			
키스경험 여부						
없 다	36.2	40.5	20.9	1.2	1.2	100.0 (506)
있 다	22.3	43.2	28.8	4.7	1.0	100.0 (593)
			χ^2=58.4(p=.0000)			
성교경험						
경 험	19.0	40.3	35.0	5.0	0.8	100.0 (400)
비경험	34.3	42.7	19.6	2.0	1.4	100.0 (703)
			χ^2=53.4(p=.0000)			

표 4-26. 性行爲 對象別 婚前 性行爲에 대한 態度

성 교 대 상	근로자	대학생
결혼상대자와의 성교		
계	100.0	100.0
(N)	(1,021)	(1,101)
해도 괜찮다	83.4	75.1
해서는 안된다	16.6	24.9[1]
윤락여성과의 성교		
계	100.0	100.0
(N)	(1,021)	(1,101)
해도 괜찮다	32.0	26.7
해서는 안된다	68.0[2]	73.3[1]
기타 이성과의 성교		
계	100.0	100.0
(N)	(1,017)	(1,100)
해도 괜찮다	45.5	42.7
해서는 안된다	54.5	57.3[1]

주: 1) 대학생의 경우 '하지 않는 것이 좋다'와 '해서는 안된다'가 포함됨.
2) 근로자의 경우 '자제하는 것이 좋다'와 '절대로 하지 않는 것이 좋다'가 포함됨.

표 4-27. 婚前姙娠의 結果에 대한 態度

	근로자	대학생	1991년 조사[1]	
			남성	여성
혼전임신에 대한 태도(객관적)				
반드시 출산	23.7	13.5	20.6	10.2
양육가능시 출산	55.9	74.5	67.8	70.7
출산불가	7.6	7.1	11.6	19.1
기 타	2.0	4.7	-	-
모르겠다	10.8	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(1,027)	(1,092)		
혼전임신에 대한 태도(본인의 경우)				
반드시 출산	48.7	16.2		
여자의사에게 맡김	31.8	69.7		
출산불가	14.5	10.2		
기 타	5.1	3.9		
계	100.0	100.0		
(N)	(1,023)	(1,088)		

1) 김승권, 1991 전국 출산력조사 특별분석, "한국 미혼남녀의 성행태", 한국보건사회연구원, 1992.

표 4-28. 同性戀愛 및 混宿에 대한 態度

태 도	근 로 자		대 학 생	
	동성연애	혼숙	동성연애	혼숙
계	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(1,027)	(1,027)	(1,102)	(1,099)
매우 찬성	1.2	3.6	0.4	1.5
대체로 찬성	0.8	8.3	0.4	8.6
그저 그러함	5.0	29.8	4.4	30.5
대체로 반대	12.4	26.2	14.1	34.1
절대로 반대	80.7	32.1	80.6	25.2

第 4 節 性行爲 經驗 實態

1. 異性交際 經驗

異性交際와 키스의 경험은 直接的인 性行爲는 아니지만 性經驗을 가질 수 있는 가능성을 부여한다는 점에서 性經驗의 前段階로 볼 수 있다.

근로자들의 84.4%가 異性交際 經驗이 있으며 현재 이성교제중인 경우도 42.7%로서 대학생의 이성교제 경험 75.0%, 현재 異性交際중 36.7% 보다 높은 것으로 나타났다. 키스경험도 勤勞者 集團에서 높았는데 대학생에 비하여 근로자의 平均 年齡이 높은 것도 經驗率을 높이는 주요 要因이 됐을 것으로 보이며, 일찍이 社會生活을 하면서 제1절의 經濟狀態에서 본 바와 같이 일정한 收入源을 가지고 經濟的으로 독립을 하는 사람이 많아 異性交際를 보다 활발히 하고 있기 때문인 것으로 보인다(표 4-29 참조).

2. 性行爲 經驗

본 연구에서는 사회인의 신분과 학생신분의 차이, 年齡構造의 차이, 社會經濟的 특성의 차이가 있는 工團의 男子勤勞者와 남자대학생 집단의 性行態

를 비교하였다. 이들 두 집단의 性行爲 經驗率은 근로자는 78.1%, 대학생은 36.3%로서 근로자와 대학생간에 큰 차이를 나타내었다. 1977년 전국의 대학생의 성에 관한 態度調査에서 남자대학생 1,445명의 性交經驗率 35.9% (대한가족계획협회, 1977)[5]와 類似한 水準을 나타내었다.

표 4-29. 異性交際 經驗實態

이성교제	근로자	대학생
이성교제경험		
계	100.0	100.0
(N)	(1,039)	(1,103)
있 다	84.4	75.0
없 다	15.6	25.0
첫이성교제연령		
계	100.0	100.0
(N)	(837)	(827)
≤14	1.6	6.3
15-16	9.0	15.8
17-18	26.0	25.6
19-20	33.1	38.2
21-22	16.5	10.6
23+	13.7	3.4
평균(S.D.)	19.6세(2.8)	18.3세(2.4)
현재 이성교제		
계	100.0	100.0
(N)	(1,039)	(1,103)
교제중	42.7	36.7
없 음	57.3	63.3
키스경험		
계	100.0	100.0
(N)	(1,039)	(1,103)
있 음	79.6	53.8
없 음	20.4	46.2

5) 1977년 전국 대학생의 성행위 경험률이며, 지역별로는 서울에 비하여 지방대학생의 성행위 경험률이 월등 높은 결과를 보임.

표 4-31 應答者의 性에 대한 知識과 性行爲 經驗率

지 식	근 로 자		대 학 생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
성에 대한 일반지식점수 (8문항)				
0-5점	60.0	(65)	0.0	(2)
6점	70.4	(81)	40.0	(50)
7점	77.4	(297)	26.4	(258)
8점	81.6	(537)	39.4	(784)
	χ^2=19.0(p=.0000)		χ^2=15.8(p=.0001)	
성병전염에 대한 지식점수 (5문항)				
0-1점	59.5	(111)	27.6	(98)
2-3점	79.3	(523)	34.3	(578)
4-5점	81.2	(383)	41.2	(422)
	χ^2=25.0(p=.0000)		χ^2=8.7(p=.05)	
성병예방에 대한 지식점수 (5문항)				
0-1점	63.0	(230)	63.0	(230)
2-3점	82.5	(451)	82.5	(451)
4-5점	82.9	(315)	82.9	(315)
	χ^2=39.7(p=.0000)		χ^2=2.0(N.S.)	
AIDS 전염에 대한 지식점수 (9문항)				
0-4점	69.2	(133)	69.2	(133)
5-7점	78.2	(574)	78.2	(574)
8-9점	81.4	(296)	81.4	(295)
	χ^2=8.1(p=.05)		χ^2=4.0(N.S.)	

표 4-32. 應答者의 性行爲에 대한 態度別 性行爲 經驗率

태 도	근로자		대학생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
계	78.1	(1,039)	36.3	(1,103)
혼전순결(남성)				
반드시 지켜야 함	54.8	(135)	8.8	(171)
가급적 지켜야 함	78.8	(491)	31.2	(465)
지키지 않을수도 있음	89.0	(283)	48.9	(397)
지킬필요 없음	98.6	(72)	67.6	(68)
모르겠음	43.8	(48)	-	-
	χ^2=114.1(p=.0000)		χ^2=118.5(p=.0000)	
혼전순결(여성)				
반드시 지켜야 함	75.2	(432)	24.0	(317)
가급적 지켜야 함	81.1	(403)	34.9	(461)
지키지 않을수도 있음	85.5	(131)	50.4	(278)
지킬필요 없음	90.0	(20)	58.8	(34)
모르겠음	33.3	(30)	-	-
	χ^2=47.3(p=.0000)		χ^2=53.4(p=.0000)	
혼전 이성과의 성행위				
해도 괜찮다	91.6	(464)	50.0	(470)
해서는 안됨	67.4	(555)	26.2	(630)
	χ^2=86.1(p=.0000)		χ^2=67.7(p=.0000)	
혼전 결혼상대자와의 성행위				
해도 괜찮다	83.6	(852)	41.5	(827)
해서는 안됨	52.7	(169)	20.8	(274)
	χ^2=77.9(p=.0000)		χ^2=39.1(p=.0000)	
윤락여성과의 성행위				
해도 괜찮다	92.0	(327)	58.5	(294)
자제하는 것이 좋음	77.0	(566)	33.9	(551)
해서는 안됨	50.8	(128)	16.0	(256)
	χ^2=94.7(p=.0000)		χ^2=109.5(p=.0000)	
혼전임신에 대한 태도				
반드시 낳아야 함	72.4	(243)	24.8	(149)
양육가능시 낳도록 함	83.6	(574)	38.6	(814)
절대로 낳아서는 안됨	80.8	(78)	38.5	(78)
기타(잘모름)	63.6	(132)	29.4	(51)
	χ^2=31.4(p=.0000)		χ^2=17.3(p=.0017)	
혼전임신에 대한 태도(본인의 경우)				
인공유산시킴(절대로 낳지않음)	91.2	(148)	42.3	(111)
결혼하여 아기 양육	74.5	(498)	23.9	(176)
여자의 의사에 맡김	77.8	(325)	30.9	(265)
양육가능시 낳도록 함	78.8	(52)	42.2	(493)
기 타	-	-	41.9	(43)
	χ^2=18.7(p=.0003)		χ^2=24.7(p=.0001)	

표 4-33 應答者의 異性交際와 性行爲 經驗率

이성교제 상태	근 로 자		대 학 생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
계	78.1	(1,035)	36.6	(1,093)
첫 이성교제시기(연령)				
≤15	89.4	(47)	33.3	(120)
16-17	87.8	(139)	37.3	(158)
18-19	85.0	(253)	44.2	(269)
20-21	90.2	(266)	56.4	(225)
22+	83.3	(168)	70.9	(55)
이성교제경험 없음	30.3	(162)	6.0	(266)
	χ^2=263.5(p=.0000)		χ^2=181.4(p=.0000)	
현재 이성교제 유무				
이성교제 없음	71.6	(591)	29.5	(696)
이성교제중	86.9	(444)	48.1	(405)
	χ^2=34.1(p=.0000)		χ^2=38.6(p=.0000)	

應答者의 첫 性行爲時 연령은 勤勞者에서는 평균 20.2세, 大學生에서는 20.6세로 두 집단간에 차이를 보이지 않았다. 첫 性行爲의 대상에서는 勤勞者에서는 친구, 애인이 가장 높아 40.7%를 차지하였고 그 다음이 淪落女性으로 33.7%였다. 대학생에서는 淪落女性이 가장 높아 42.8%, 그 다음이 친구, 애인으로 38.5%로서 두 집단 모두 친구, 애인과 淪落女性이 비슷한 水準으로 이들 後期 靑少年 집단의 性行爲 대상자가 되고 있는 것으로 나타났다(표 4-34 참조).

성행위시 飮酒與否 및 콘돔사용실태를 보면 <표 4-35>와 같다. 첫 性行爲를 할 당시 勤勞者들이 大學生보다 飮酒를 한 경우가 다소 높았고 근로자 및 대학생 集團에서 모두 性行爲 상대여성의 類型에 따라서 飮酒實態가 큰 차이를 나타내었다. 즉 淪落女性이나 술집 및 다방여자등과 性行爲를 한 경우에는 대부분 飮酒를 한 것으로 나타났다. 콘돔사용률은 전체적으로

勤勞者 15%, 大學生 22%로 낮으나 근로자에 비하여 볼 때 대학생들의 使用率이 높았다. 콘돔사용실태는 특히 性相對者의 類型에 따라 차이가 크게 나타났는데 淪落女性과의 性行爲에서는 性病感染危險이 따르기 때문에 비교적 콘돔 使用率이 높았다(근로자 24%, 대학생 36%). 工團勤勞者 집단에서는 結婚對象者와의 성행위시 콘돔을 사용하였거나 상대방 여성측에서 避妊을 한 경우가 높아 結婚 相對者와의 性行爲에 있어서는 일시적인 性行爲 相對와는 다르게 妊娠을 防止하기 위한 목적에서 콘돔이나 기타 避妊方法을 計劃的으로 實踐하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 樣相은 근로자 집단에 있어 婚前 結婚相對者와 보다 지속적인 性經驗을 가지기 때문에 취하는 行態일 수 있음을 暗示하는 結果가 아닌가 여겨진다.

표 4-34. 應答者의 첫 性行爲 經驗實態

	근로자	대학생
계	100.0	100.0
(N)	(811)	(400)
첫 성행위 시기(연령)		
≤15	2.0	0.5
16-17	8.6	3.7
18-19	26.8	20.3
20-21	34.8	47.3
22-23	16.1	21.2
24+	9.4	6.5
미상	2.3	0.5
평균	20.2세	20.6세
(S.D.)	(2.4)	(1.8)
성행위 대상		
결혼을 약속한 여자	8.3	7.5
친구, 애인	40.7	38.5
윤락여성(창녀), 콜걸	33.7	42.8
우연히 만난 여자	8.4	5.5
술집여자, 다방여자	6.4	3.8
기 타	1.8	1.2
미 상	0.7	0.7

표 4-35. 첫 性行爲 對象別 飮酒與否 및 避妊使用實態

음주 및 피임실태	계	결혼을 약속한 여자	친구 애인	우연히 만난 여자	술집여자 다방여자	윤락여성 (창녀, 콜걸)	기타
<근로자>							
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(805)	(67)	(330)	(68)	(52)	(273)	(15)
음주여부							
마셨음	63.4	47.8	54.5	69.1	84.6	74.7	33.3
안마심	32.1	44.8	40.6	30.9	9.6	21.6	60.0
미 상	4.6	7.5	4.8	-	5.8	3.6	6.7
			χ^2=122.8(p=.0000)				
피임사용여부							
사용않음	79.2	71.6	86.7	92.6	73.1	70.7	86.7
콘돔사용	14.9	17.9	9.1	4.4	15.4	23.8	6.7
먹는피임약복용	2.7	7.5	2.4	1.5	5.8	1.8	-
기타피임법	1.1	3.0	1.8	-	-	-	6.7
미 상	2.1	-	-	1.5	5.8	3.7	-
			χ^2=142.0(p=.0000)				
<대학생>							
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(397)	(30)	(154)	(22)	(15)	(171)	(5)
음주여부							
마셨음	60.8	20.0	44.2	63.6	80.0	83.0	20.0
안마심	38.5	80.0	55.2	36.4	13.3	17.0	80.0
미 상	.7	-	.6	-	6.7	-	-
			χ^2=228.7(p=.0000)				
피임사용여부							
사용않음	69.2	63.3	77.3	77.3	73.3	62.6	60.0
콘돔사용	22.0	3.3	11.0	22.7	26.7	35.7	-
먹는피임약복용	2.0	3.3	1.9	-	-	1.8	20.0
기타피임법	6.5	30.0	9.7	-	-	-	20.0
미 상	.2	-	-	-	-	-	-
			χ^2=220.9(p=.0000)				

3. 淪落女性과의 性行爲

勤勞者 1,039명중 649명(62.8%), 大學生 1,103명중 291명(26.4%)이 淪落女性과 性行爲 經驗을 한 것으로 나타나 성행위 경험자 중에서는 근로자의 80.0%, 대학생의 72.8%가 淪落女性과 性行爲를 經驗한 것으로 나타났다.

우리사회에서 未婚 男性의 性行爲 대상으로서 淪落女性이 큰 비중을 차지하고 있는 단면을 볼 수 있는데, 이들 淪落女性들과의 性經驗率을 淪落女性의 範疇에 따라 구분하여 보면 <표 4-36>과 같이 근로자 집단에서는 淪落女性이 가장 높고, 그 다음이 술집 여자, 유흥업소 여자였으며, 안마시술소 여자, 다방 여자, 이발소 여자와의 性經驗率도 상당한 水準에 이르는 것으로 나타났다. 대학생 집단에서는 賣春婦가 淪落女性의 대부분으로 여러 유형의 淪落女性 範疇에 속하는 相對者와의 性接觸은 근로자 집단에 비해서 낮은 것으로 나타났다.

표 4-36. 淪落女性 類型別 淪落女性과의 性行爲 經驗率

(단위: %)

윤락여성 유형	근로자 (N=1,031)	대학생 (N=1,100)
계	62.8[1)]	26.4[2)]
일반윤락여성(매춘부)	39.9	16.0
유흥업소 여자	20.1	3.9
술집여자	23.6	2.1
다방여자	7.8	.9
이발소여자	7.4	1.2
안마시술소여자	8.5	1.5
콜 걸	9.0	4.7

<주> 1) N=1,033명 기준
2) N=1,103명 기준

淪落女性과의 性行爲 經驗은 대상자의 특성에 따라 차이가 큰 것으로 나타났는데 연령에 따라 性經驗率은 比例的으로 增加하며 그 증가 상태가 전

체 性經驗率보다도 높아 연령이 높아질수록 淪落女性과의 性經驗 機會를 보다 많이 가졌음을 알 수 있다. 군대를 마친 경우 淪落女性과의 性經驗率이 未畢자에 비하여 현저히 높았으며, 현재의 거처가 부모집을 떠나 하숙이나 자취를 하는 경우 淪落女性과의 性經驗이 높은 것으로 나타났다. 全體 性經驗에서 나타난 양상과 마찬가지로 吸煙을 많이할수록, 飮酒量이 많을수록 淪落女性과의 性經驗이 유의하게 높았다(표 4-37 참조).

性行爲에 대한 태도별로는 婚前의 純潔, 婚前 異性과의 性行爲, 淪落女性과의 性行爲, 婚前 姙娠에 대한 태도 등에 따라 淪落女性과의 性經驗率에 차이를 보여 성행위에 대한 태도가 保守的인 사람에 비하여 보다 許容度가 높을수록 淪落女性과의 性經驗率이 유의하게 높게 나타나고 있다(표 4-38 참조).

淪落女性과의 性行爲는 성행위에 대한 대가를 현물로 보상하게 되므로 經濟的인 負擔能力이 性行爲를 追求하는데 영향을 미칠수 있다. 본 연구에서는 月收入과 月支出 용돈과 淪落女性과의 性經驗을 비교하였는데 근로자들은 月收入이 많을수록 淪落女性과의 性經驗率이 높았고 月支出 용돈이 많을수록 淪落女性과의 성경험이 높은 것으로 나타나고 있다. 月收入과 용돈의 支出은 연령의 증가와 勤勞經歷의 증가에 따라 많아지므로 연령 要因이 다소 揭載된 결과로 보인다. 대학생에서도 월 용돈 支出額이 많을수록 淪落女性과의 性經驗이 유의하게 높은 것으로 나타났다(표 4-39 참조).

조사대상자들이 淪落女性과 처음 性經驗을 가진 나이는 근로자가 평균 23.3세, 대학생이 평균 21.0세로 대학생에서 약간 낮은 年齡層에서 시작된 것으로 나타났다. 이러한 결과는 대학생의 경우 性經驗의 첫 對象者가 淪落女性인 사람의 비율이 높은 결과와도 부합되며 근로자 집단이 일찍 職場生活을 하면서 異性交際 經驗率이 높은 것과 관련이 있는 것으로 보인다.

표 4-37. 應答者의 一般特性別 淪落女性과의 性行爲 經驗率

특 성	근 로 자		대 학 생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
계	62.8	(1,033)	26.4	(1,103)
연 령				
≤19	21.1	(76)	3.8	(211)
20-24	54.2	(206)	24.2	(662)
25-29	70.5	(546)	52.9	(227)
30+	79.6	(103)	-	-
	χ^2=92.8(p=.0000)		χ^2=139.7(p=.0000)	
교육수준*				
중학교이하 (1년)	61.2	(49)	10.2	(265)
고등학교이하(2년)	61.3	(793)	19.4	(284)
전문대이하 (3년)	68.2	(88)	33.9	(319)
대학교 졸업 (4년)	70.9	(103)	42.2	(232)
	χ^2=4.8(N.S.)		χ^2=82.6(p=.0000)	
군복무				
군 필	69.6	(731)	46.0	(461)
군미필	46.5	(301)	11.9	(638)
	χ^2=47.8(p=.0000)		χ^2=158.9(p=.0000)	
거주장소				
부모집	61.7	(397)	25.6	(577)
형제·자매, 친척집	65.1	(109)	23.0	(87)
기숙사·하숙	52.1	(263)	23.6	(212)
자 취	74.2	(264)	31.3	(224)
	χ^2=28.2(p=.0000)		χ^2=4.3(N.S.)	
흡연정도				
안피움	51.9	(258)	16.3	(498)
가끔피움	55.2	(87)	21.6	(116)
10개피정도/1일	64.4	(306)	39.8	(244)
20개피이상/1일	74.7	(332)	35.1	(224)
	χ^2=35.6(p=.0000)		χ^2=59.9(p=.0090)	
1회 평균음주량				
음주안함	46.3	(95)	11.8	(93)
소주 1-2잔 정도	48.6	(146)	19.8	(182)
소주 반병 정도	60.7	(313)	26.0	(411)
소주 1병 정도	70.7	(331)	33.2	(322)
소주 2병 이상	73.4	(128)	30.7	(88)
	χ^2=39.0(p=.0000)		χ^2=22.9(p=.0001)	
부모와 별거경험				
있 다	65.7	(378)	33.5	(272)
없 다	61.3	(660)	23.8	(828)
	χ^2=1.8(N.S.)		χ^2=9.4(p=.0022)	

<주> * 교육수준의 ( )는 대학생의 학년임.

표 4-38. 婚前純潔 및 性行爲에 대한 態度別 淪落女性과의 性交經驗率

태 도	근로자		대학생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
계	62.8	(1,033)	36.3	(1,103)
혼전순결(남성)				
반드시 지켜야 함	39.3	(135)	5.8	(171)
가급적 지켜야 함	62.9	(491)	22.4	(464)
지키지 않을수도 있음	73.1	(279)	33.9	(395)
지킬필요 없음	91.5	(71)	58.8	(68)
모르겠음	31.3	(48)	-	-
	χ^2=90.5(p=.0000)		χ^2=89.6(p=.0000)	
혼전순결(여성)				
반드시 지켜야 함	59.4	(431)	18.6	(317)
가급적 지켜야 함	66.7	(402)	25.4	(460)
지키지 않을수도 있음	70.1	(127)	34.1	(276)
지킬필요 없음	85.0	(20)	50.0	(34)
모르겠음	20.0	(30)	-	-
	χ^2=35.4(p=.0000)		χ^2=28.2(p=.0000)	
혼전 이성과의 성행위				
해도 괜찮다	76.9	(459)	38.2	(469)
해서는 안됨	52.0	(554)	17.4	(628)
	χ^2=66.0(p=.0000)		χ^2=59.0(p=.0000)	
혼전 결혼상대자와의 성행위				
해도 괜찮다	68.0	(846)	29.9	(824)
해서는 안됨	40.2	(169)	15.3	(274)
	χ^2=45.5(p=.0000)		χ^2=21.7(p=.0000)	
윤락여성과의 성행위				
해도 괜찮다	83.1	(325)	51.5	(293)
자제하는 것이 좋음	60.0	(562)	22.8	(549)
해서는 안됨	28.1	(128)	4.7	(256)
	χ^2=125.7(p=.0000)		χ^2=161.8(p=.0000)	

표 4-39. 月平均 收入 및 용돈사용에 따른 淪落女性과의 性行爲 經驗率

월평균 수입 및 용돈	근 로 자		대 학 생	
	경험률	(N)	경험률	(N)
월평균 수입				
계	63.9	(965)	25.9	(1,031)
없 음	-	-	26.9	(558)
15만원 이하	-	-	24.4	(119)
15-50만원 이하	42.3	(104)	24.8	(294)
50-70만원 이하	56.0	(336)	26.5	(49)
70-90만원 이하	70.4	(307)	18.2	(11)
90-100만원 이하	74.2	(89)	-	-
100만원 이상	79.8	(129)	-	-
	χ^2=58.5(p=.0000)		χ^2=3.0(N.S.)	
월평균 용돈				
계	63.9	(977)	26.5	(1,088)
10만원 이하	52.1	(94)	18.5	(54)
10-20만원 이하	60.0	(433)	20.2	(377)
20-30만원 이하	65.2	(276)	28.4	(409)
30-40만원 이하	75.8	(99)	33.2	(184)
40-50만원 이하	81.0	(42)	40.0	(50)
50만원 이상	78.8	(33)	35.7	(14)
	χ^2=31.4(p=.0005)		χ^2=42.8(p=.0000)	

青少年의 性行爲는 동료집단(친구)의 影響力이 매우 크다는 것이 외국의 연구 결과(선행연구 참조) 提示되고 있는데, 본 연구에서 淪落女性과 첫 性經驗을 가졌을 때 누구와 같이 갔는가를 질문한 결과는 다음과 같다. 혼자서 결정하여 가는 경우는 勤勞者의 14.3%, 大學生의 20.0%로 그나머지는 친구나 아는 사람이 부추겨서 他意로 갔거나 자의반 타의반으로 經驗을 가진 것으로 나타났다. 동행자의 수를 보면 勤勞者들의 40.1%가 3명 이상이 같이 갔고, 46.2%가 1-2명과 같이 갔으며, 大學生들의 37.1%는 3명 이상과, 42.6%는 1-2명과 같이 갔던 것으로 나타났다. 가장 최근의 淪落女性과 性行爲에서도 첫 경험시에 비해서는 혼자 가는 것이 증가하고 있으나 대부분의 경우 1-2명 또는 2-3명과 동행한 것으로 나타났으며 동행자는 학교 친구나 선후배가 가장 많았고 勤勞者에서는 그 다음이 職場 同僚인 것으로 나타났다(표 4-40 참조).

표 4-40. 淪落女性과의 性行爲 實態

특 성	근로자		대학생	
	첫 성행위	최종 성행위	첫 성행위	최종 성행위
계	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(649)	(649)	(291)	(291)
경험시기 분포				
≤19	21.7		14.4	
20-24	67.0		80.8	
25-29	9.2		3.8	
시기 미상	2.0		1.0	
평균	23.3세		21.0세	
(S.D.)	(2.4)		(1.7)	
동 기				
혼자 결정해서(자의)	14.3	20.0		
친구·아는사람 권유(타의)	45.1	37.9		
자의반 타의반	39.0	40.4		
기 타	0.5	-		
미 상	1.1	1.7		
동반상태				
나 혼자	12.6	17.6	18.9	23.7
1-2명	46.4	41.0	42.6	47.1
3명 이상	40.1	39.1	37.1	26.8
기 타	-	0.3	-	-
미 상	0.9	2.0	1.4	2.4
동반자				
나 혼자갔다	12.6	17.6	18.9	23.7
학교동창, 선배	49.3	32.5	71.8	67.4
군대친구	14.2	9.1	7.2	6.5
직장동료	18.3	32.0	-	-
기 타	4.6	6.8	0.7	-
미 상	0.9	2.0	1.4	2.4
음주여부				
음 주 함	76.3	77.2	80.1	75.9
음주안함	19.7	16.6	18.9	22.7
미 상	4.0	6.2	1.0	1.4
콘돔사용여부				
사용했음	22.5	39.3	39.5	48.1
사용안함	73.5	55.5	59.5	50.5
미 상	4.0	5.2	1.0	1.4

淪落女性과 처음 性行爲시 飮酒行態와 피임실태를 보면 <표 4-40>과 같다. 근로자의 76.3%, 대학생의 80.1%가 淪落女性과의 性行爲시 飮酒를 했던 것으로 나타나 음주를 통해 衝動的인 性行爲가 促進되었을 수 있으며, 콘돔사용률이 근로자의 22.5%, 대학생의 39.5%로 대학생이 약간 높기는 하나 콘돔사용률이 낮았고 콘돔사용은 첫 경험시에 비하여 최근 경험시에는 勤勞者와 大學生 集團 모두 약간은 높아지고는 있으나 전체적으로 使用率이 낮아 性病感染에 무방비한 상태에서 性行爲가 아루어지는 경우가 많은 것으로 나타났다.

이와 같은 結果를 종합해 볼 때 淪落女性과의 性行爲는 동료 집단의 影響으로 衝動的으로 이루어지며 低調한 피임사용은 알콜에 의해 더욱 助長되고 있는 것으로 보인다.

4. 콘돔 使用實態

婚前 未婚 男性들의 性行爲는 앞에서 일반 性行爲經驗 및 淪落女性과의 성행위 경험에서 나타난 바와 같이 性行爲 對象者가 일정하지 않으며, 일시적인 경우가 많고, 특히 淪落女性과의 性行態는 동료집단의 영향에 의해서 衝動的으로 이루어지는 경우가 많은 것으로 나타나고 있다. 본 연구의 대상은 後期 靑少年 集團이라고 볼 수 있는데 세계보건기구 (WHO)는 靑少年의 당면한 性問題는 첫째, 靑少年의 性經驗時期가 빨라지고 있으며 둘째, 靑少年의 性病 增加趨勢와 원치 않는 姙娠 및 그에 따른 人工姙娠中絶의 증가 셋째, 靑少年層이 거의 피임을 사용하지 않는다는 점을 들고 있다 (WHO, 1986).

본 연구에서는 性行爲 對象과 시기별로 근로자와 대학생들의 콘돔사용양상을 구체적으로 본 결과는 다음과 같다.

<표 4-41>에서 보는 바와 같이 勤勞者에서 첫번째 性行爲時 콘돔사용률은 15.1%였고, 가장 최근의 性行爲時 콘돔사용률은 23.3%였다. 性病感染

당시의 콘돔사용률은 13.7%로서 콘돔을 사용하지 않은 경우 性病感染이 높았다고 볼 수 있다. 性行爲 相對女性의 유형별로 콘돔사용률을 보면 淪落女性에 속하는 性相對者와는 첫성행위에서 23.4%, 가장 최근 성행위에서 35.8%의 콘돔사용률을 보여 여자친구 範疇에 해당되는 女性과의 性行爲에서 보다는 防禦的인 性行爲를 하는 경향을 볼 수 있었다.

표 4-41. 勤勞者의 性行爲 對象 및 時期別 콘돔사용實態

	계	콘돔사용여부	
		사용	비사용[1]
첫번째 성행위시			
계	100.0(793)	15.1	84.9
약혼자, 여자친구, 애인	100.0(397)	10.6	89.4
윤락여성 범주[2]	100.0(312)	23.4	76.6
우연히 만난 여자	100.0 (67)	4.5	95.5
기 타	100.0 (17)	11.8	88.2
		χ^2=29.1(p=.0000)	
가장 최근 성행위시			
계	100.0(798)	23.3	76.7
약혼자, 여자친구, 애인	100.0(438)	16.7	83.3
윤락여성 범주[2]	100.0(285)	35.8	64.2
우연히 만난 여자	100.0 (55)	9.1	90.9
기 타	100.0 (20)	30.0	70.0
		χ^2=42.4(p=.0000)	
성병감염당시 성행위시[3]			
계	100.0(175)	13.7	86.3
약혼자, 여자친구, 애인	100.0 (20)	20.0	80.0
윤락여성 범주[2]	100.0(133)	12.8	87.2
우연히 만난 여자	100.0 (14)	14.3	85.7
기 타	100.0 (8)	12.5	87.5
		χ^2=.8(p=.8544)	

<주> 1) 성행위시 상대방 여성이 사용한 피임방법과 콘돔 이외의 피임방법은 콘돔 비사용자로 분류함.

2) 윤락여성 범주에는 성행위 대상이 된 윤락여성, 콜걸, 술집여자, 다방여자가 포함됨.

3) 성병감염자인 경우이며, 이 때 콘돔사용상태에 사용자 속에는 콘돔을 사용했으나 콘돔의 파열 및 빠짐 등으로 사용에 실패한 경우도 포함됨.

<표 4-42>과 같이 大學生에서는 勤勞者와 조사내용이 相異하여 조사된 내용을 기준으로 콘돔사용양상을 보면, 첫번째 性行爲시 콘돔사용률은 22.1%로서 勤勞者 集團에 비하여 콘돔사용률이 다소 높았다. 淪落女性과의 性行爲에서는 처음에는 39.9%, 최근에는 47.5%의 콘돔사용률을 보였다. 여자친구와의 性行爲에서는 처음에는 9.5%, 최근에는 25.6%의 콘돔사용률을 보였고, 우연히 만난 여자와의 性行爲에서는 처음에는 21.1%, 최근에는 23.3%의 콘돔사용률을 보였다.

표 4-42. 大學生의 性行爲 對象 및 時期別 콘돔사용實態

	계	콘돔사용여부	
		사용	비사용[1]
첫번째 성행위시			
계	100.0(399)	22.1	77.9
약혼자, 여자친구, 애인	100.0(184)	9.8	90.2
윤락여성 범주[2]	100.0(186)	34.9	65.1
우연히 만난 여자	100.0 (22)	22.7	77.3
기 타	100.0 (7)	.0	100.0
		χ^2=36.1(p=.0000)	
윤락여성과의			
첫 성행위시	100.0(288)	39.9	60.1
최근 성행위시	100.0(202)	47.5	52.5
여자친구와의			
첫 성행위시	100.0(263)	9.5	90.5
최근 성행위시	100.0(223)	25.6	74.4
우연히 만난여자와의			
첫 성행위시	100.0 (71)	21.1	78.8
최근 성행위시	100.0 (43)	23.3	76.7
성병감염당시 성행위시			
계	100.0 (30)	6.7	93.3
윤락여성범주[2]	100.0 (25)	4.0	96.0
기 타[4]	100.0 (5)	20.0	80.0
		χ^2=.1(p=.7434)	

<주> 1) 성행위시 상대방 여성이 사용한 피임방법과 콘돔 이외의 피임방법은 콘돔 비사용자로 분류함.
2) 윤락여성 범주에는 성행위 대상이 된 윤락여성, 콜걸, 술집여자, 다방여자가 포함됨.
3) 성병감염자중 콘돔사용 미상자 2명 제외
4) 윤락여성 범주 이외의 여자친구, 애인, 기타대상 전부 포함.

대학생에서도 性病感染當時의 콘돔사용률은 6.7%로 다른 상황에서 보다 使用率이 낮았다. 性行爲 相對女性의 유형별로 콘돔사용률을 보면 첫 성행위에서 淪落女性에 속하는 性相對者와는 34.9%, 여자친구범주에 속하는 女性과의 性行爲에서는 9.8%로 性相對女性에 따라 콘돔사용률에 차이를 보였다. 본 연구결과에서 콘돔사용이 과거보다 높아졌는지 性行爲經驗이 늘어나면서 콘돔사용이 높아지는 것인지는 구분이 되지 않으나 대체로 첫 성행위에서 보다 최근의 性行爲에서 콘돔사용이 높았고 性病感染當時에는 使用率이 낮았던 것으로 나타났다. 이와 같은 낮은 콘돔사용수준은 未婚男性들이 婚前 性行爲에서 性病感染과 相對女性의 姙娠 등의 危險에 露出되어 있는 가능성이 매우 높다는 점을 示唆하고 있어 큰 문제로 提起된다.

5. 婚前 同居實態

勤勞者 集團에서 실증적인 資料는 없지만 최근의 性에 대한 價値의 變化와 더불어 婚前의 性欲求를 充足시키고, 劣惡한 經濟狀態에서 農村地域이나 他地 出身들이 부모를 떠나 주거 및 생계의 부담을 지면서 經濟的인 부담을 縮小시키기 위한 手段으로서도 男女 同居가 增加해 가는 趨勢가 있는 것으로 알려져 있다.

본 연구에서의 勤勞者 集團에서는 11.3%가 과거에 異性과 同居를 經驗했으며 1.5%가 현재 동거중인 것으로 전체적으로 12.9%가 同居를 經驗한 것으로 나타났다. 大學生에서는 2.3%가 異性과 과거에 同居한 經驗이 있으며 0.4%가 現在 同居를 하고 있어 全體的으로 2.7%가 同居를 經驗한 것으로 나타났다. 이들이 일시적인 感情에서 同居를 한 것인지 아니면 結婚 相對者로서 同居를 하는 것인지는 구분하여 把握하지 않았으나 본 조사에서 사실상 婚姻關係에 있는 경우에는 조사대상에서 제외시키고 調査資料를 分析하였기 때문에 여기서 同居는 대부분 일시적인 同居로 看做할 수 있을

것이다. 근로자에서 平均 同居期間은 15.4개월이었으며, 大學生은 소수가 同居를 經驗했는데 平均 同居期間은 10.6개월로서 근로자에서 同居期間도 좀 더 긴 것으로 나타나고 있다(표 4-43 참조).

표 4-43. 應答者의 異性과 同居經驗 與否

특 성	근 로 자		대 학 생	
	동거경험률	(N)	동거경험률	(N)
동거경험 여부				
계	100.0	(1,039)	100.0	(1,103)
동거경험	11.3	(117)	2.3	(25)
현재 동거중	1.5	(16)	.4	(4)
경험 없음	87.0	(904)	97.2	(1,072)
무응답	.2	(2)	.2	(2)
동거기간				
계	100.0	(112)	100.0	(27)
5개월 미만	23.2	(26)	37.0	(10)
6-11개월	22.3	(25)	18.5	(5)
12-23개월	45.5	(51)	29.6	(8)
24개월 이상	25.5	(28)	14.8	(4)
평균(S.D.)	15.4(14.1)		10.6(10.3)	

對象者의 특성별로는 <표 4-44>와 같이 勤勞者와 大學生에서 모두 연령이 높을수록 즉 結婚 適齡期에 도달해 있을수록 同居經驗者 비율이 높았으며, 敎育水準에서는 대학교를 제외한 나머지 경우에 同居經驗率이 높았다. 그외 부모집을 떠나 자취를 하는 경우, 부모를 떨어져서 산 경험이 있는 경우, 부모가 死亡 또는 離婚한 경우, 吸煙者에서 同居 경험률이 높았다.

표 4-44. 應答者의 特性別 同居經驗實態

특 성	근로자		대학생	
	동거경험률	(N)	동거경험률	(N)
연 령				
계	12.9	(1,035)	2.6	(1,101)
≤19	10.5	(76)	.9	(211)
20-24	12.3	(309)	2.0	(662)
25-29	12.8	(546)	6.1	(228)
30+	16.3	(104)	-	-
	χ^2=1.5(p=.6625)		χ^2=14.4(p=.0007)	
교육수준*				
계	12.8	(1,037)	2.6	(1,101)
중학교이하 (1년)	12.2	(49)	.4	(265)
고등학교 (2년)	13.0	(797)	2.5	(284)
전문학교 (3년)	14.8	(88)	7.8	(320)
대 학 교 (4년)	9.7	(103)	4.7	(232)
	χ^2=1.2(p=.7425)		χ^2=23.3(p=.0000)	
현재 거처				
계	12.8	(1,037)	2.6	(1,101)
부모집	12.3	(398)	2.4	(576)
형제·자매, 친척집	9.2	(109)	3.4	(87)
기숙사·하숙	11.7	(266)	.9	(213)
자 취	16.3	(264)	4.4	(225)
	χ^2=4.5(p=.2078)		χ^2=5.6(p=.1339)	
부모와 별거경험(중고교 재학시)				
계	12.8	(1,036)	2.6	(1,101)
있 다	18.0	(377)	3.3	(274)
없 다	9.9	(659)	2.4	(827)
	χ^2=13.6(p=.0002)		χ^2=.3(p=.5766)	
부모의 생존 및 결혼상태				
계	12.9	(1,030)	2.6	(1,101)
부모 생존	11.4	(398)	2.3	(979)
부모사망, 이혼[1]	16.6	(109)	4.9	(122)
	χ^2=4.7(p=.0298)		χ^2=1.9(p=.1704)	
흡연실태				
계	13.6	(987)	2.6	(1,101)
흡 연 함	15.6	(398)	4.0	(602)
흡연안함	7.4	(258)	1.0	(499)
	χ^2=10.5(p=.0012)		χ^2=8.3(p=.0039)	
음주실태				
계	12.8	(1,036)	2.6	(1,100)
음 주 함	13.5	(939)	4.1	(1,038)
음주안함	6.2	(97)	1.6	(62)
	χ^2=3.6(p=.0577)		χ^2=.4(p=.5132)	

(주> * 교육수준의 ( )는 대학생의 학년임.
1) 부모중 한쪽이 사망하였거나 이혼 또는 별거 포함

6. 相對 女性의 婚前 姙娠 經驗

婚前의 性行爲는 대부분 理性的이고 計劃的으로 이루어지는 것이 아니라 衝動에 의해 感情的, 無計劃的으로 이루어지기 쉽다. 따라서 피임방법이 많이 開發되어 있고 피임도구의 구입이 비교적 용이하며, 避妊知識이 많이 普及되어 있음에도 불구하고 미혼 男女의 性關係에서는 원치 않는 姙娠의 가능성이 높다. 특히 婚前 性經驗은 크게 問題 삼지 않아 性에 대해 상당히 寬大한 서구에서도 婚前 姙娠은 비난의 대상이 되고 있는 실정이다. 우리사회에서는 婚前 姙娠에 대해서는 未婚母의 발생과 未婚女性의 人工流産 問題 등이 社會問題化 되고 있으면서 몇몇 연구에서 여성을 연구대상으로 한 연구가 진행되었을 뿐 未婚 男性을 대상으로 한 연구는 전무하였던 현실에서 본 資料는 實態를 정확히 把握하여 根本的인 對策을 講究하는데 활용될 수 있을 것이다.

본 연구결과 조사대상 未婚 男子들이 性行爲 상대여성을 姙娠시킨 經驗을 <표 4-45>에서 보면 근로자들은 16.3%가 경험이 있었고 대학생 집단에서도 4.0%의 경험이 있는 것으로 나타났다. 이는 性行爲 經驗者 중에서는 근로자의 20.8%, 대학생의 11.0%에 이른다. 1991년 全國 出産力調査에서 여성을 대상으로 조사한 결과(김승권, 1992) 미혼 여성의 3.4%가 姙娠經驗이 있다는 결과와는 대단히 큰 차이를 나타내고 있다. 이것은 윤락여성을 제외한 一般女性의 혼전 性行爲經驗率이 일반 미혼 남성보다 일반적으로 낮고(조정숙, 1981)[6] 앞 장에서 근로자 및 대학생의 주요 性相對者가 淪落女性임을 감안할 때 미혼여성의 性經驗 및 姙娠이 일부 여성에 치우쳐 있음에 비하여 未婚男性에서는 性相對 女性이 보다 普遍化되어 있기 때문에 위와 같이 높은 결과를 나타낸 것으로 볼 수 있다.

結婚前 姙娠의 결과가 대부분 人工姙娠中絶로 귀결되며 일부는 未婚母

6) 1981년 조사에서 고등학생의 성경험율은 남학생 27.7%, 여학생 14.5%였음.

발생을 초래한다는 점에서 위의 결과는 未婚 당사자의 社會的 問題와 健康상의 문제 이외에도 심각한 社會問題를 惹起시키고 있음을 나타내고 있다. 靑少年 및 婚前 靑壯年 집단에 대한 지속적이고 包括的인 성교육, 피임교육의 필요성이 매우 높다는 점을 示唆하는 결과라 하겠다.

표 4-45. 應答者의 性行爲 相對女性의 姙娠經驗實態

구 분	근로자		대학생	
	임신경험률	(N)	임신경험률	(N)
임신여부				
계	100.0	(1,039)	100.0	(1,103)
있었음	16.3	(169)	4.0	(44)
없었음	83.5	(868)	95.8	(1,057)
무응답	.2	(2)	.2	(2)
임신회수[1]				
계	100.0	(160)	100.0	(43)
1회	60.0	(96)	58.1	(25)
2회	22.5	(36)	25.6	(11)
3회	10.0	(16)	16.3	(7)
4회 이상	7.5	(12)	-	-
출산경험[2]				
계	100.0	(1,039)	100.0	(1,100)
있 음	2.1	(22)	.5	(5)
없 음	97.9	(1,017)	99.5	(3)

<주> 1) 성행위 상대여성이 임신한 적이 있는 대상에 한함
2) 대학생의 경우 무응답 3명 제외

본 연구에서 조사대상자의 性行爲 상대 여성이 出産한 경험은 근로자에서 22명(2.1%), 대학생에서 5명(0.5%)으로 나타나 근로자 집단에서는 姙娠經驗者의 13%, 대학생 집단에서는 姙娠 經驗者의 11%가 상대 여성의 출산을 경험하고 있으며 상당수준의 未婚母의 발생을 惹起하고 있음을 엿볼 수 있다. 이는 우리나라에서 발생되어지고 있는 入養 대상아동의 대부분이 未婚母에게서 태어나고 있는 결과(정기원·김만지, 1993)[7] 와도 부합되는 것으

로 未婚 男性들의 무절제한 性行爲가 커다란 社會問題들을 야기시키고 있는 것으로 나타났다. 전체 대상자중 상대여성이 出産을 經驗하였다고 하는 대상자수가 극히 일부이고 특히 대학생에서는 소수이기 때문에 특성별 분석을 하는 것은 무리일 수도 있으나 이러한 연구가 전무한 상태에서 傾向을 보는 것이 意味가 있을 것으로 여겨진다.

勤勞者에서 性行爲 상대 여성의 姙娠을 초래한 경험은 <표 4-46>과 같이 근로자들의 연령이 높을수록 비례적으로 높았고, 勤勞 男性의 敎育水準이 낮을수록 높았으며 현재의 거처가 자취인 경우 높게 나타났다. 또한 中高校 在學時節 부모와 떨어져서 산 경험이 있는 경우에 높게 나타났으며 양쪽 부모가 생존한 경우에 비하여 偏父, 偏母 膝下이거나 부모가 離婚이나 別居를 한 경우에 높게 나타났다. 또한 吸煙者 및 飮酒者에서 경험률이 높아 吸煙 및 飮酒가 일반 性經驗에 관여하고 있는 정도 이상으로 영향을 미치는 것으로 나타났다. 對象者의 特性別 性行爲 상대 여성의 出産率도 연령이 높을수록 높았으며, 자취를 하는 경우, 吸煙을 하는 경우에 높았다. 전문학교를 제외하면 敎育水準이 높을수록 상대 여성의 出産率은 낮았는데 전문학교 학력을 가진 勤勞者 集團에서 상대 여성의 出産率이 두드러지게 높았던 것으로 나타나고 있다.

대학생에서는 性行爲 상대 여성이 姙娠을 초래한 경험은 숫자가 극히 적기는 한데 특성별로 경향을 보면 <표 4-47>과 같다. 근로자와 마찬가지로 연령과 학년이 높을수록 비례적으로 높았고, 현재의 거처가 부모집인 경우에 비하여 형제나 친척집에 있는 경우 높게 나타났다. 또한 中高校 在學時節 부모와 떨어져서 산 경험이 있는 경우에 높게 나타났다. 또한 吸煙者 및 飮酒者에서 經驗率이 높아 吸煙 및 飮酒가 일반 性經驗에 관여하고 있는 정도 이상으로 영향을 미치는 것으로 나타났다.

---

7) 1992년 입양아 3,235명중 84%가 미혼모 출생아임.

표 4-46. 勤勞者의 特性別 性行爲 相對女性의 姙娠 및 出産經驗實態

특 성	임신실태		출산실태	
	임신경험률	(N)	출산경험률	(N)
연 령				
계	16.3	(1,035)	2.1	(1,037)
≤19	6.6	(76)	2.6	(76)
20-24	12.3	(309)	1.0	(309)
25-29	17.9	(546)	2.2	(546)
30+	26.9	(104)	4.8	(104)
	χ^2=18.6(p=.0003)		χ^2=5.7(p=.1266)	
교육수준				
계	16.3	(1,037)	2.1	(1,039)
중학이하	16.4	(49)	4.1	(49)
고등학교	19.3	(797)	1.5	(799)
전문학교	12.6	(88)	6.8	(88)
대 학 교	7.7	(103)	1.9	(103)
	χ^2=1.6(p=.6548)		χ^2=11.8(p=.0082)	
현재 거처				
계	16.3	(1,037)	2.1	(1,039)
부모집	17.8	(398)	3.3	(399)
형제·친척집	11.9	(109)	.0	(109)
기숙사·하숙	12.4	(266)	.8	(266)
자 취	19.7	(264)	2.6	(265)
	χ^2=7.4(p=.0599)		χ^2=7.6(p=.0549)	
부모와 별거경험(중고교 재학시)				
계	16.3	(1,036)	2.1	(1,038)
있 다	19.9	(377)	2.1	(378)
없 다	14.3	(659)	2.1	(660)
	χ^2=5.2(p=.0231)		χ^2=0.0(p=1.0)	
부모의 생존 및 결혼상태				
계	16.4	(1,030)	2.1	(1,032)
부모 생존	14.4	(729)	2.2	(730)
부모사망, 이혼[1]	21.3	(301)	2.0	(302)
	χ^2=6.8(p=.0090)		χ^2=0.0(p=1.0)	
흡연실태				
계	16.9	(987)	2.2	(989)
흡 연 함	19.8	(729)	2.9	(731)
흡연안함	8.9	(258)	.4	(258)
	χ^2=15.2(p=.0001)		χ^2=4.3(p=.0374)	
음주실태				
계	16.3	(1,036)	2.1	(1,035)
음 주 함	17.0	(939)	2.2	(941)
음주안함	9.3	(97)	1.0	(97)
	χ^2=3.3(p=.0680)		χ^2=.2(p=.6807))	
동거경험				
계	16.3	(1,037)	2.1	(1,037)
동거 경험	54.9	(133)	12.0	(133)
동거 비경험	10.6	(904)	.7	(904)
	χ^2=163.3(p=.0000)		χ^2=66.8(p=.0000)	

<주> 1) 부모중 한쪽이 사망하였거나 이혼 또는 별거 포함.

표 4-47. 大學生의 特性別 性行爲 相對女性의 姙娠 및 出産經驗實態

특 성	임신실태		출산실태	
	임신경험률	(N)	출산경험률	(N)
연 령				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
≤19	-	(211)	-	(211)
20-24	3.5	(662)	.5	(661)
25-29	9.2	(228)	.9	(228)
	χ^2=25.4(p=.0000)		χ^2=1.9(p=.3938)	
교육수준				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
중학이하	.4	(265)	-	(265)
고등학교	2.5	(284)	.7	(284)
전문학교	7.8	(320)	.9	(319)
대 학 교	4.7	(232)	-	(232)
	χ^2=23.2(p=.0000)		χ^2=4.3(p=.2284)	
현재 거처				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
부모집	4.2	(576)	.7	(576)
형제·친척집	6.9	(87)	1.1	(87)
기숙사·하숙	.9	(213)	-	(213)
자 취	5.3	(225)	-	(224)
	χ^2=8.1(p=.0423)		χ^2=3.6(p=.3010)	
부모와 별거경험(중고교 재학시)				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
있 다	6.2	(274)	.7	(274)
없 다	3.3	(827)	.4	(826)
	χ^2=3.9(p=.0483)		χ^2=.1(p=.7919)	
부모의 생존 및 결혼상태				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
부모 생존	3.9	(979)	.3	(978)
부모사망, 이혼[1]	4.9	(122)	1.6	(122)
	χ^2=.1(p=.7595)		χ^2=1.8(p=.1772)	
흡연실태				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
흡 연 함	5.3	(602)	.5	(602)
흡연안함	2.4	(499)	.4	(498)
	χ^2=5.3(p=.0214)		χ^2=0.0(p=1.0)	
음주실태				
계	4.0	(1,100)	.5	(1,099)
음 주 함	4.1	(1,038)	.5	(1,037)
음주안함	1.6	(62)	-	(62)
	χ^2=3.3(p=.0680)		χ^2=0.0(p=1.0)	
동거경험				
계	4.0	(1,101)	.5	(1,100)
동거 경험	41.4	(29)	13.8	(29)
동거 비경험	3.0	(1,072)	.1	(1,071)
	χ^2=98.7(p=.0000)		χ^2=88.8(p=.0000)	

<주> 1) 부모중 한쪽이 사망하였거나 이혼 또는 별거 포함

본 연구에서 가장 괄목할만한 사실은 同居經驗者에서 相對女性의 姙娠率과 出産率이 매우 높았다는 것이다. 勤勞者 集團의 동거경험자에서 性行爲 相對 女性의 姙娠比率이 54.9%로서 同居 非經驗者에 비해 5배 이상 높았으며 出産比率이 12.0%로서 17배 높게 나타나고 있었다. 대학생 집단의 동거경험자에서는 性行爲 상대 여성의 姙娠比率이 41.4%로서 同居 非經驗者에 비해 14배 가량 높았으며 出産比率은 13.8%로서 비경험자의 0.1%와 비교할 수 없을 정도로 높게 나타났다(표 4-46 및 표 4-47 참조).

상기의 결과를 종합해 볼 때 우리나라에서 社會經濟的으로 대학생보다 낮은 계층에 속해 있는 勤勞者 集團이 性行爲 經驗率도 높지만 性行爲로 기인된 姙娠率과 出産率이 높으며 근로자 집단내에서도 교육수준이 낮을수록, 편부모 슬하 및 부모의 결혼상태가 離婚이나 別居를 하여 부모의 統制와 支援을 적게 받을 가능성이 있을수록, 吸煙과 飮酒를 하는 경우일수록 性行爲時 임신을 防止하기 위한 조치를 덜 취하고 있으며 性에 대한 無知가 出産에까지 이르게 하는 것으로 나타나고 있다.

第 5 節 性病感染 經驗實態

앞장에서 본 바와 같이 우리사회 男性들의 結婚前 性行態는 혼전 성행위 경험이 보편화되어 있고 性行爲의 대상에서 淪落女性이 큰 비중을 차지하고 있음을 볼 때 性病感染의 위험이 상당히 내재되어 있다고 볼 수 있다. 실제로 공단지역에서는 事業體에서 직원의 신체검사에 性病檢査를 포함하고 있는 점을 볼 때 특히 未婚의 勤勞男性들에서 높은 性病旣往歷을 예측할 수 있다.

性病은 接觸性 傳染病으로서 감염자의 生殖保健상의 위해를 일으킬 뿐 아니라 특히 梅毒은 胎兒感染을 초래할 수 있기 때문에 社會倫理, 道德的 問題를 야기하는 社會惡으로서 豫防方法이 분명하고 용이한 편인데도 불구하고 적극적인 관리를 소홀히 하고 있는 傳染病이다. 性病의 발생은 성문

화의 세계적인 開放化 趨勢에 따라 AIDS가 널리 알려지기 전까지 어느 나라에서나 증가하고 있으며, 우리나라도 國際的 交流가 증가함에 따라 외국인 感染源이 위협을 주고 있고, 性文化의 開放化로 性接觸이 용이해 지고 있어 增加 趨勢에 있을 것으로 보이는데 性病의 특성상 특수집단이나 性病指定機關 治療者를 대상으로 한 조사이외에는 없기 때문에 性病有病率 수준이 파악되어 있지 않다. 더우기 의약분업의 부재로 인한 항생제의 誤濫用은 耐性菌의 출현과 증가를 포함하여 性病發生 및 傳播與件을 더욱 조장하고 있다(임종권 외, 1990).

본 조사연구에서는 설문서를 통하여 본인이 性病에 感染된 經驗에 관한 사항을 본인의 판단에 따라 기재하도록 하였기 때문에 臨床的인 診斷을 통해서 확인한 결과는 아니어서 진단을 받은 경우가 아닐때는 性病이라는 판정과 性病種類의 판정에서 오류를 범할 수 있다. 또한 症候에 대한 불확실한 자기진단으로 실제보다 과다 보고하였을 가능성보다는 응답을 기피하거나 不顯性感染으로 인하여 다소 과소 보고했을 가능성이 있을 것으로 推測된다.

1. 性病感染 實態

조사대상자의 性病感染 旣往歷을 보면 근로자에서는 전체 조사대상 1,039명중 178명(17.1%)이 性病에 感染된 기왕력을 갖고 있는 것으로 나타났다. 性行爲經驗者 811명 중에서는 21.9%에 이르는 높은 感染歷을 나타내고 있다. 대학생들은 성병 감염자의 수가 적어 性病感染에 관한 行態를 把握하는데 다소 무리가 있기는 한데 전체 조사대상 1,103명중 33명(3.0%)이 性病에 感染된 旣往歷을 갖고 있으며 性行爲經驗者 400명 중에서는 8.3%가 성병에 감염된 기왕력이 있는 것으로 밝혀지고 있다. 性病에 感染된 회수를 보면 근로자에서 2회 이상 감염된 경우는 感染經驗者중 37.1%, 대학생에서는 15.2%인 것으로 나타나서 性病에 걸린 사람은 다시 성병에 걸릴 危險이 있는 性行態를 가지는 경향이 있을 것으로 추측된다.

본 조사에서는 기억상의 誤差를 줄이기 위하여 가장 최근에 걸린 性病(성병감염이 1회인 경우도 포함)에 대한 내용을 조사하였는데 가장 최근에 感染된 시기를 조사자의 감염 당시 연령으로 환산하여 보면 근로자는 평균 23.7세, 대학생은 22.0세였고, 性病의 種類는 근로자에서는 淋疾이 50.0%로 가장 많았고 그 다음이 非淋菌性 尿道炎으로 23.0%를 차지하였다. 대학생에서는 性病感染者가 33명이어서 性病樣相을 파악하는데는 무리가 있었다. 非淋菌性 尿道炎이 가장 많아 12명(36.4%)이었고, 그 다음이 淋疾로 11명(33.3%)이었다. 不顯性 感染率이 높고 感染의 症候가 복잡하여 치료에 어려움이 있는 梅毒의 感染者도 근로자와 대학생에서 각각 14명(7.9%), 2명(6.1%)이 있는 것으로 나타나고 있다.

性病에 걸릴 당시의 性行爲를 할 때 飮酒를 하였다는 사람이 근로자에서 82.0%, 대학생에서 78.8%였다. 이는 첫 性行爲時의 飮酒者 比率(표 4-48 참조)에 비하여 性病 感染 당시의 음주자 비율이 높게 나타나고 있어 음주가 衝動的인 위험이 내재된 性行爲를 유발할 가능성을 높인다는 선행연구 결과와 부합된 결과를 보이고 있다.

性病에 걸릴 당시의 콘돔사용실태를 보면 勤勞者에서 84.8%, 대학생에서 87.9%가 콘돔을 사용하지 않았으며 근로자에서는 사용중 不適切하게 사용한 경우도 7.3%가 되는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 婚前 性接觸이 性病感染이나 상대여성의 姙娠 및 婚前 出産 가능성에 대해 무방비한 상태에서 이루어지고 있는 경우가 많으며 이로 인해 파생되는 社會的, 倫理的 문제와 이들 세대의 生殖保健 측면의 위협이 매우 높을 수 있음을 시사하고 있다(표 4-48 참조).

性病에 걸릴 당시의 感染源으로 생각되는 상대여성은 근로자에서는 淪落女性 및 콜걸이 46.1%에 이르며 다방 및 술집여자라는 경우가 26.4%의 높은 비중을 차지하고 있다. 친구, 애인과의 性接觸에서 性病이 傳染되었다고 한 경우도 10.7%에 달하여 이들이 주요 性接觸 대상으로서 빈도가 높을 것이라는 점을 감안하더라도 특수 淪落女性의 범주에 속하지 않는 근로남

성들과 성접촉이 있는 일반여성에서도 性病의 有病率이 꽤 높을 것으로 추측된다. 한편 대학생에서는 性病感染源의 대부분이 淪落女性 및 콜걸로 69.7%였고, 친구 및 애인과의 性行爲로 감염되었다는 보고는 1명에 지나지 않아 대학생의 性接觸 상대가 되고 있는 일반 여성들의 性病 有病率은 문제가 되지 않는다고 볼 수 있다.

표 4-48. 性病感染 經驗實態 및 感染時 飮酒 및 콘돔 使用實態

내 용	근 로 자		대 학 생	
	%	N	%	N
계	100.0	178	100.0	33
성병감염횟수				
1회	62.9	112	84.8	28
2회이상	37.1	66	15.2	5
마지막 감염시기				
≤18	7.3	13	12.1	4
20-24	46.6	83	66.7	22
25+	35.4	63	12.1	4
미상	10.7	19	9.2	3
평 균	23.7세		22.0세	
성병종류				
임 질	50.0	89	33.3	11
매 독	7.9	14	6.1	2
비임균성요도염	23.0	41	36.4	12
기 타	5.6	10	6.1	2
미 상	13.5	24	18.2	6
현재감염상태				
과거걸림	83.7	149	100.0	33
현재걸림	9.6	17	-	-
미 상	6.7	12	-	-
감염시 음주여부				
마 셨 음	82.0	146	78.8	26
안마셨음	16.9	30	18.2	6
미 상	1.1	2	3.0	1
콘돔사용여부				
사용안함	84.8	151	87.9	29
바르게 사용	6.7	12	6.1	2
사용중 빠짐	5.1	9	-	-
사용중 터짐	2.2	4	-	-
미 상	1.1	2	6.1	2

표 4-49. 性病感染源 및 治療實態

내 용	근로자		대학생	
	%	N	%	N
계	100.0	178	100.0	33
성병감염원				
결혼약속녀	0.6	1	-	-
친구, 애인	10.7	19	3.0	1
윤락여성, 콜걸	46.1	82	69.7	23
우연히 만난여자	7.9	14	6.1	2
다방, 술집여자	26.4	47	3.0	1
이발소, 안마실여자	2.2	4	3.0	1
기 타	4.5	8	3.0	1
미 상	1.7	3	12.1	4
성병감염시 첫치료장소				
약 국	48.9	87	33.3	11
병의원	32.0	57	33.3	11
보건소	9.6	17	15.2	5
기 타	8.4	15	18.2	6
미 상	1.1	2	-	-
성병완치전 성교유무				
있 다	21.9	39	9.1	3
없 다	77.0	137	90.9	30
미 상	1.1	2	-	-

性病感染者가 찾은 첫 치료원은 근로자에서는 藥局이 48.9%, 病醫院 및 保健所가 41.6%였으며, 대학생에서는 病醫院 및 保健所가 48.5%, 약국이 33.3%로 성병에 걸린 사람 중 많은 사람이 일차적으로 자가 진단에 의해 약국에서 抗生劑를 복용하는 것으로 보여 性病을 적절히 치료받지 않고 위험한 自家治療를 하고 있는 것으로 보였고 대학생보다는 근로자 집단에서 더욱 이러한 경향이 높은 것으로 나타났다. 이러한 治療實態는 耐性菌의 出現과 완치를 어렵게 하는 요인으로 작용하고 있을 가능성을 시사하고 있으며, 이들 젊은이들 개개인의 生殖保健과 健康上의 위해를 초래할 뿐 아니라 나아가서 慢性 傳染病으로서 社會全體에 波及效果를 초래할 수 있는 위험을 가진다. 또한 자가치료와 진료의 기피는 性病患者의 규모를 파악하기 어렵게 만드는 요인이 되고 있다. 性病에 걸린 상태에서 性接觸을 가졌다

는 사람도 근로자에서 39명(21.9%), 대학생에서 3명(9.1%)으로서 性病傳播의 여지가 많았을 것으로 보여 특히 근로자 집단을 위한 性病管理와 性病의 豫防을 위한 社會的인 프로그램과 서비스 開發이 필요한 것으로 보인다(표 4-49 참조).

<표 4-50>에서 性病感染 당시의 성행위 상대자인 感染源별로 구분하여 보면 性病에 걸린 사람들은 애인, 친구와의 性行爲에서나 淪落女性의 범주에 속하는 여성 및 우연히 만난 여성 등 性病感染의 우려가 높은 대상과의 性行爲에서도 콘돔사용에 차이가 없었던 것으로 나타나고 있다.

표 4-50. 性病感染源別 性行爲 當時 콘돔사용 및 飮酒實態

	계1)	애인·친구	윤락여성	우연히 만난 여성
<근로자>				
계	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(170)	(20)	(133)	(17)
콘돔사용여부				
사 용	6.5	5.0	6.8	5.9
비사용	93.5	95.0	93.2	94.1
		χ^2=.3(P=.1159)		
음주여부				
마셨음	84.1	65.0	89.5	64.7
안마심	15.9	35.0	10.5	35.3
		χ^2=15.8(P=.0012)		
<대학생>				
계	100.0	100.0	100.0	100.0
(N)	(28)	(1)	(25)	(2)
콘돔사용여부				
사 용	3.6	-	4.0	-
비사용	96.4	100.0	96.0	100.0
		χ^2=.1(P=.9397)		
음주여부				
마셨음	85.7	100.0	84.0	100.0
안마심	14.3	-	16.0	-
		χ^2=.5(P=.7558)		

<주> 1) 성병감염원 미상 제외: 근로자 8명, 대학생 5명

性病感染 당시의 飮酒與否를 보면 근로자의 경우 淪落女性과 性交시 음주율이 89.5%로 제일 높은데 반해 대학생에서는 84%로 다른 성상대자에 비하여 낮은 편이다.

<표 4-51>에서 飮酒與否별 性病感染者의 콘돔 사용실태를 보면 근로자에서는 음주자의 콘돔사용률은 11%, 비음주자의 콘돔사용률은 30%로 나타나 性行爲時 飮酒를 한 경우에는 性病을 防禦할 수 있는 콘돔사용을 소홀히 하는 것으로 보여진다. 그러나 이 자료가 性病에 이미 感染된 경우이므로 일반화시키는 데는 제한이 있다.

표 4-51. 性病感染 當時의 飮酒狀態別 콘돔사용實態

음주여부	계(N)[1]	콘돔사용여부	
		사 용	비사용
<근로자>			
계	100.0(176)	14.2	85.8
음 주 함	100.0(146)	11.0	89.0
음주안함	100.0 (30)	30.0	70.0
		χ^2=5.9(p=0.149)	
<대학생>			
계[1]	100.0 (31)	6.5	93.5
음 주 함	100.0 (26)	7.7	92.3
음주안함	100.0 (5)	-	100.0
		χ^2=.0(p=1.0)	

<주> 1) 성병감염 경험자 중 성병감염 당시 음주상태가 미상인 2명 제외

<표 4-52>는 性病의 感染經驗이 상당히 높은 근로자 집단에서 性行爲相對者의 유형에 따라서 性病感染에 차이가 있는가를 파악하기 위하여 조사된 변수중에서 첫번째 性行爲 대상자와 가장 최근의 性行爲의 유형에 따라 性病感染率에 차이가 있는가를 본 결과로서 근로자의 性行爲 대상 전체를 보여주지는 못하지만 두 경우에서 모두 淪落女性·콜걸, 술집여자·다방여자, 우연히 만난 여자와 성행위를 경험한 집단에서 性病感染이 뚜렷하게 높은 것을 알 수 있다.

표 4-52. 性行爲 對象者別 勤勞者의 性病感染 經驗率

	첫 성행위시 (n=811)		마지막 성행위시 (n=811)	
계	178/811	21.9%	178/811	21.9%
결혼을 약속한 여자	11/66	16.7	19/148	12.8
친구, 애인	57/327	17.4	64/284	22.5
윤락여성, 콜걸	50/245	31.3	29/178	16.3
술집여자, 다방여자	17/47	36.2	25/71	35.2
우연히 만난 여자	21/68	30.9	14/55	25.5
이발소, 안마시술소여자	0/8	-	6/3	19.4
기 타	10/50	20.0	9/44	20.5
	χ^2=16.9(p=.05)		χ^2=20.0(p=.01)	

<주> 성교대상 미상 12건은 제외됨.

<표 4-53>은 勤勞者 集團에 대하여 가장 최근의 性行爲를 언제 하였는가를 性接觸 頻度를 일부 반영하는 간접적인 變數(proxy variable)로 보고 性病感染率의 차이를 살펴 본 결과로서 최근 1주 이내에 性行爲를 접촉한 집단에서 性病感染 經驗率이 높은 것으로 나타났다.

표 4-53. 最近의 性行爲 時期別 勤勞者의 性病感染 經驗率

	성병감염 경험률 (%)	
계	178/811	21.9
1주일 이전	52/175	29.7
1개월 이전	50/208	24.0
두달이상 경과	32/220	14.5
기억하지 못함	29/186	15.6
	χ^2=18.1(p=.001)	

<주> 무응답 15건 제외됨.

위의 결과들은 性病 感染源으로서 淪落女性이 높은 비중을 차지하는 것으로 나타나고 있는데 조사대상자가 淪落女性의 유형별로 접촉한 경험과 性病 感染率과의 관계를 <표 4-54>에서 보면 淪落女性보다는 그 이외의 술집여자, 다방여자, 이발소 여자, 유흥업소 여자 등 非可視的으로 淪落行爲를 하는 여성들과의 性行爲經驗이 있는 그룹에서 性病感染率이 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 淪落女性에 대해서는 보건소에서 정기적으로 檢診과 追求管理가 이루어지고 있고, 淪落女性들의 性病有病率이 낮아지고 있다는 연구결과(강정원 외, 1988) 등을 고려할 때, 性病管理가 미치지 못하고 있는 非可視的인 淪落女性들이 성병의 감염원으로서 危險集團이 되고 있는 것이라고 볼 수 있어 이들 집단에 대한 性病 檢査와 追求管理의 필요성을 提示하고 있다고 하겠다.

표 4-54. 淪落女性 類型別 淪落女性과의 性行爲 經驗者의 性病感染率

윤락여성 유형	성병감염경험률(N)	χ^2
<근로자>		
계	25.9 (649)	
일반윤락여성(매춘부)	26.0 (411)	97.9****
유흥업소 여자	28.5 (207)	99.1****
술집여자	31.7 (243)	106.3****
다방여자	36.3 (80)	104.4****
이발소여자	38.2 (76)	106.6****
안마시술소여자	29.5 (88)	98.7****
콜 걸	21.5 (93)	99.5****
<대학생>		
계	10.8 (288)	
일반윤락여성(매춘부)	11.9 (176)	0.0
유흥업소 여자	18.5 (43)	1.6
술집여자	30.4 (23)	6.7**
다방여자	20.0 (10)	0.1
이발소여자	30.5 (13)	6.9**
안마시술소여자	17.6 (17)	0.1
콜 걸	11.5 (52)	0.0

Chi-Square significance level: ** P<.01 ****P<.0001

2. 社會·人口學的 特性別 性病感染 樣相

조사대상자의 社會·人口學的 特性別 性病感染의 양상을 보면 <표 4-55> 및 <표 4-56>과 같다. 성접촉 경험률이 연령에 따라 높아지면서 性病感染率도 연령의 증가에 따라 비례적으로 높아져서 19세 이하 근로자의 性病感染率은 6.6%에서 30세 이상 근로자의 性病 感染率은 30.8%로 높아지고 있으며 性行爲 경험자중에서도 연령이 높아감에 따라 그 증가폭이 性經驗率의 증가폭을 상회하는 것을 볼 때 연령이 높아가면서 결혼적령기에 가까워질수록 性接觸 頻度가 높고 그로 인한 性病感染率이 높아지는 것으로 보인다. 대학생에서도 연령이 높은 집단에서 性病感染率이 높은 것으로 나타났다.

勤勞者 集團에서는 특히 교육수준이 낮을수록 性病感染率이 높았으며 대학생에서는 학년의 증가에 따라 性病感染率이 증가하고 있다. 군대경력에 따라 특히 대학생에서는 군대를 마친 경우 性病感染이 높게 나타났다. 현재 거주지가 부모를 떠나 하숙 및 자취를 하는 경우 性病感染率이 높았으며 飮酒을 많이 하고 飮酒時 취하는 정도가 심할수록 性病感染 經驗이 높은 것으로 나타났다.

다음으로 <표 4-57> 및 <표 4-58>에서 性에 관한 知識, 態度 및 行態의 차이에 따른 性病感染 經驗率을 보면 성병에 대한 지식정도와 성병감염과의 관계에서 知識이 높을수록 感染經驗率도 높은 것으로 나타나고 있어 성병감염을 통하여 결과적으로 知識이 習得되었을 가능성을 示唆하는 결과라고 볼 수 있다.

性에 대한 態度에 따라서도 性病感染率에 차이를 보이는데 근로자의 경우 婚前純潔을 반드시 지켜야 한다는 사람은 9.6%의 感染率을 보인 반면 지킬 필요가 없다고 한 사람들은 34.7%의 높은 感染率을 보였다. 婚前 알고 있는 異性과의 性行爲, 결혼 상대자와의 성행위, 淪落女性과의 性行爲를 허용하는 집단에서 일관성있게 높은 性病 感染率을 나타내고 있고, 대학생

에서도 근로자와 비슷한 양상을 나타내고 있어 性에 대한 許容度가 性行態樣相, 특히 性病感染에 방어 또는 무방비로 노출되는데 있어서 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

性病感染이 성접촉에 대한 노출빈도와 접촉대상자와 높은 관련이 있을 것으로 보여 첫 性經驗年齡, 淪落女性과의 性行爲 經驗, 윤락여성과의 첫 성행위 연령 변수와 비교하여 본 결과, 특히 淪落女性과의 性行爲 經驗을 가진 집단에서 경험이 없는 집단에 비해 근로자 및 대학생에서 공히 10배 이상의 높은 性病 感染을 나타내었으며 전체 性行爲와 淪落女性과의 성행위 연령이 빠른 집단에서 性病 感染率이 높은 것으로 나타났다.

표 4-55. 勤勞者의 諸特性別 性病感染 經驗率

특 성	전체조사대상		성경험대상	
	%	(N)	%	(N)
계	17.1	(1,039)	21.9	(811)
년령군				
≤19	6.6	(76)	19.2	(26)
20-24	12.9	(307)	17.9	(223)
25-29	18.5	(547)	21.7	(466)
30+	30.8	(104)	33.7	(95)
	χ^2=24.1(p=.0000)		χ^2=9.8(p=.005)	
마지막 감염시기				
중졸이하	30.6	(49)	38.5	(39)
고등학교	17.1	(799)	22.1	(619)
전 문 대	12.5	(88)	16.2	(68)
대 학	14.6	(103)	17.6	(85)
	χ^2=8.1(p=.005)		χ^2=8.4(p=.005)	
군필여부				
군 필	18.9	(735)	22.3	(622)
군미필	12.9	(303)	20.7	(188)
	χ^2=5.1(p=.05)		χ^2=0.2(N.S.)	
현재거주장소				
부모, 친척, 형제집 및 기숙사	15.5	(748)	20.8	(557)
하숙, 자취	21.3	(291)	24.4	(254)
	χ^2=5.0(p=.05)		χ^2=1.1(N.S.)	
부모와 별거경험				
없 다	14.2	(660)	18.6	(505)
있 다	22.2	(378)	27.5	(305)
	χ^2=10.8(p=.001)		χ^2=8.8(p=.005)	
1회 평균음주량				
음주 안함	5.2	(97)	8.9	(56)
소주 1-2잔 정도	15.8	(146)	23.5	(98)
소주 반병 정도	14.7	(313)	19.0	(242)
소주 한병 정도	21.1	(332)	24.6	(284)
소주 2병 이상	20.0	(130)	23.0	(113)
	χ^2=15.9(p=.001)		χ^2=8.2(N.S.)	
음주시 취하는 정도				
음주 안함	5.2	(97)	8.9	(56)
취하지 않음	11.4	(123)	18.4	(76)
약간 취함	15.9	(327)	33.5	(265)
적당히 취함	19.3	(415)	23.0	(348)
심하게 취함	35.8	(53)	41.3	(46)
	χ^2=27.8(p=.0000)		χ^2=17.4(p=.001)	

N.S.: Not significant

표 4-56. 大學生의 諸特性別 性病感染 經驗率

특 성	전체조사대상		성경험대상	
	%	(N)	%	(N)
계	3.0	(1,103)	8.3	(400)
년령군				
≤19	-	(211)	-	(13)
20-24	2.4	(664)	6.7	(240)
25-29	7.1	(226)	11.0	(145)
30+	50.0	(2)	50.0	(2)
	χ^2=35.5(p=.0000)		χ^2=8.0(p=.0449)	
교육수준				
1학년	0.4	(265)	2.6	(39)
2학년	1.4	(285)	5.2	(77)
3학년	5.0	(321)	10.5	(152)
4학년	5.2	(232)	9.1	(132)
	χ^2=16.9(p=.0001)		χ^2=3.7(N.S.)	
군필여부				
군 필	5.6	(464)	9.7	(269)
군미필	1.1	(638)	5.3	(131)
	χ^2=19.7(p=.0001)		χ^2=2.7(N.S.)	
현재거주장소				
부모, 친척, 형제집 및 기숙사	2.6	(878)	7.7	(269)
하숙, 자취	4.4	(225)	9.9	(101)
	χ^2=3.5(N.S.)		χ^2=1.4(N.S.)	
부모와 별거경험				
없 다	2.7	(829)	7.8	(282)
있 다	4.0	(274)	9.3	(118)
	χ^2=.88(N.S.)		χ^2=.09(N.S.)	
1회 평균음주량				
음주 안함	1.1	(93)	5.6	(18)
소주 1-2잔 정도	1.6	(184)	5.7	(53)
소주 반병 정도	3.4	(411)	9.4	(149)
소주 한병 정도	3.1	(323)	7.0	(142)
소주 2병 이상	5.7	(88)	13.5	(37)
	χ^2=4.7(N.S.)		χ^2=2.5(N.S.)	

N.S.: Not significant

표 4-57. 勤勞者의 知識, 態度 및 性行爲 經驗과 性病感染 經驗率

특 성	전체조사대상		성경험대상	
	%	(N)	%	(N)
성병감염예방에 대한 지식점수(5점)				
0-1점	12.6	(230)	20.0	(145)
2-3점	15.7	(451)	19.1	(372)
4-5점	21.6	(315)	26.1	(261)
	χ^2=8.4(p=.05)		χ^2=4.7(N.S.)	
혼전순결에 대한 태도(남자측)				
반드시 지켜야 함	9.6	(135)	17.6	(74)
가급적 지켜야 함	14.1	(491)	17.8	(387)
지키지 않을 수 있음	23.3	(283)	26.2	(252)
지킬필요 없음	34.7	(72)	35.2	(71)
모르겠음	8.3	(48)	19.0	(21)
	χ^2=34.4(p=.0001)		χ^2=14.9(p=.01)	
혼전 이성과의 성행위에 대한 태도				
해도 괜찮다	25.4	(464)	27.8	(425)
안된다	10.6	(555)	15.8	(374)
	χ^2=38.6(p=.0001)		χ^2=16.6(p=.0001)	
혼전 결혼상대자와의 성행위에 대한 태도				
해도 괜찮다	19.2	(852)	23.0	(712)
안된다	7.7	(169)	14.6	(89)
	χ^2=13.1(p=.001)		χ^2=3.2(N.S.)	
윤락여성과의 성행위에 대한 태도				
성욕구 해소에 필요함	29.1	(327)	31.6	(301)
자제하는 것이 좋음	12.7	(566)	16.5	(436)
절대로 하지 않는 것이 좋음	7.8	(128)	15.4	(65)
	χ^2=47.8(p=.0001)		χ^2=25.3(p=.0001)	
첫 성행위 경험 연령				
19세 이전			26.6	(301)
19세 이후			19.1	(487)
			χ^2=6.1(p=.05)	
윤락여성과의 성행위 경험				
있 다			25.9	(649)
없 다			2.1	(384)
			χ^2=97.4(p=.0001)	
윤락여성과의 첫성행위시 연령			37.1	(140)
19세 이전			22.7	(494)
19세 이후				
			χ^2=12.0(p=.01)	

N.S.: Not significant

표 4-58. 大學生의 知識, 態度 및 性行爲 經驗과 性病感染 經驗率

특 성	전체조사대상		성경험대상	
	%	(N)	%	(N)
성병감염예방에 대한 지식점수(5점)				
0-1점	2.5	(161)	7.8	(51)
2-3점	2.3	(398)	6.0	(151)
4-5점	3.8	(532)	10.3	(194)
	χ^2=.48(N.S.)		χ^2=.34(N.S.)	
혼전순결에 대한 태도(남자측)				
반드시 지켜야 함	1.2	(171)	13.3	(15)
가급적 지켜야 함	1.3	(465)	4.2	(145)
지키지 않을 수 있음	4.5	(397)	9.3	(194)
지킬필요 없음	10.3	(68)	15.2	(46)
모르겠음	-	-	-	-
	χ^2=22.3(p=.0001)		χ^2=6.9(N.S.)	
혼전 이성과의 성행위에 대한 태도				
해도 괜찮다	4.3	(470)	8.5	(235)
안된다	2.1	(630)	7.9	(165)
	χ^2=3.7(p=.537)		χ^2=.00(N.S.)	
혼전 결혼상대자와의 성행위에 대한 태도				
해도 괜찮다	3.4	(827)	8.2	(343)
안된다	1.8	(274)	8.8	(57)
	χ^2=1.2(N.S.)		χ^2=.00(N.S.)	
윤락여성과의 성행위에 대한 태도				
성욕구 해소에 필요함	6.8	(294)	11.6	(172)
자제하는 것이 좋음	2.2	(551)	6.4	(187)
절대로 하지 않는 것이 좋음	0.4	(256)	2.4	(41)
	χ^2=21.8(p=.0000)		χ^2=5.2(N.S.)	
첫 성행위 경험 연령				
19세 이전			14.3	(98)
19세 이후			6.3	(300)
			χ^2=5.1(p=.0234)	
윤락여성과의 성행위 경험				
있 다			10.8	(288)
없 다			1.8	(109)
			χ^2=10.5(p=.0052)	
윤락여성과의 첫성행위시 연령			16.7	(42)
19세 이전			9.8	(246)
19세 이후				
			χ^2=10.5(p=.005)	

N.S.: Not significant

第 5 章 性行態에 影響을 미치는 要因 分析

본 연구에서는 性病과 性行態의 심각성을 診斷하였고 관련된 性行態의 대상을 人口學的, 社會學的, 心理學的, 그리고 술·담배 등의 변수를 통하여 종합적으로 분석하였다. 性行爲 대상은 크게 여자친구, 우연히 만난 여자, 淪落女性, 그리고 이들을 종합하여 전체 性行爲 상대자 등 네 가지로 나누었다. 각각의 상대자에 대하여 제2장에 제시한 理論的인 모델을 근거로 하여 二變量과 多變量 로지스틱 회귀분석이 이루어졌다. 또한 이러한 분석들은 근로자와 대학생을 對象으로 反復 시행되었다.

第 1 節 性經驗에 대한 二變量 로지스틱 回歸分析

1. 一般(全體) 性經驗

가. 人口·社會學的 特性과 性經驗

1) 勤勞者

<표 5-1>에서는 一般 性行態와 獨立變數間의 相關關係를 로지스틱 회귀분석을 통하여 보여주고 있다. 二變量 로지스틱 回歸分析의 結果는 카이제곱분석과 크게 다르지 않았는데, 우선 나이가 한 살 증가함에 따라 性經驗을 할 가능성이 1.26배나 높아지는 것으로 나타났으며 軍隊經驗 역시 性經驗 가능성을 3.35배나 增加시키는 役割을 하는 중요한 變數였다. 收入이 높은 경우에 낮은 경우보다 性經驗이 증가할 수 있는 것으로 分析되었다. 조기에 술을 배우고 데이트를 시작하는 것이 性經驗을 줄일 수 있는 것으로 나타났는데 그 效果는 각각 .77배와 .31배였다.

표 5-1. 一般(全體) 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.23	1.26	.000
교 육			
중졸이하	.00	1.00	
고졸	-.03	.97	.944
전문대졸이상	.15	1.16	.705
군경험			
미필	.00	1.00	
군필	1.21	3.35	.000
거주행태			
부모	.00	1.00	
부모이외	.18	1.19	.252
직업만족도	.14	1.15	.220
수 입			
70만원이하	.00	1.00	
70만원이상	1.00	2.71	.000
담 배			
못피운다	.00	1.00	
피운다	1.12	3.08	.000
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	
19살미만	-.26	.77	.085
술소비량			
한병증가/일	1.75	5.78	.000
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된 다	.00	1.00	
안된다	-1.40	.25	.000
매춘부			
된 다	.00	1.00	
절 제	-.97	.38	.000
안된다	-2.15	.12	.000
여자친구			
된 다	.00	1.00	
안된다	-1.48	.23	.000
우연히만난여자			
된 다	.00	1.00	
안된다	-1.50	.22	.000
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	
19살 미만	-1.18	.31	.000
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	
있 다	.98	2.66	.000

2) 大學生

<표 5-2>에서 보듯이 나이 한 살 증가는 性經驗을 할 가능성을 1.6배 증가시키고 있다. 또한 학년이 올라감에 따라, 즉 3.4학년의 경우 1.2학년보다 4.07배나 性經驗을 할 可能性이 높아지는 것으로 보인다. 勤勞者의 경우와 마찬가지로 조기에 飮酒나 데이트를 시작한 경우 性經驗이 줄어들 수 있다고 분석되었다. 마지막으로 宗敎를 가진 學生들이 .74배 정도 性經驗을 덜할 수 있다고 나타나 宗敎가 性行態에도 영향을 미칠 수 있음을 보여주었다.

나. 心理社會的 變數와 性經驗

1) 勤勞者

데이트 상대가 있을 때는 性經驗이 2.66배 정도 높아질 수 있다고 나타났으며, 반대로 性에 대한 節制가 중요하다고 생각하는 勤勞者들은 性經驗이 줄어들 수 있다고 분석되었다(표 5-1 참조).

2) 大學生

感覺的 性向이 높은 대학생의 경우 낮은 大學生들에 비해 2.26배 일반적인 性經驗을 할 可能性이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 부모와의 對話가 부족하다는 사실이 性經驗을 약 1.4배 增加시킬 수 있으며, 부모의 지나친 期待感 역시 性經驗을 갖게 하는데 寄與할 수 있는 것으로 분석되었다. 동료들의 성에 대한 影響力을 받을 경우 거의 6배나 性經驗이 늘어날 수 있는 것으로 나타났고, 性에 대한 節制가 중요하다고 認識하는 대학생들의 性經驗이 .19배나 낮을 가능성이 있는 것으로 分析되었다.

술에 대한 期待感 역시 중요해서 期待感이 큰 대학생들은 작은 학생들보다 3.53배나 성경험을 할 가능성이 높아지는 것으로 나타났다. 專攻에 대한 滿足은 性經驗을 억제할 可能性이 높은 것으로 나타났다(표 5-2 참조).

표 5-2. 一般(全體) 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果 (大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.47	1.60	.000
학 년			
1, 2학년	.00	1.00	.000
3, 4학년	1.40	4.07	
군경험			
미필	.00	1.00	.000
군필	1.67	5.31	
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.016
≥3	.34	1.40	
부모의 지나친 기대감			
그렇다	.00	1.00	.000
아니다	-.29	.75	
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.000
20만원이상	.67	1.95	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	1.10	3.01	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.010
19살미만	-.32	.72	
술소비량			
한병증가/일	.52	1.68	.032
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.000
>13	1.26	3.53	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	1.75	5.78	

표 5-2. (계속)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
≤18	.00	1.00	.000
>18	-1.64	.19	
여자친구, 우연히만난여자			
≤12	.00	1.00	.000
>12	-1.56	.21	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-1.23	.29	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.000
있 다	.80	2.23	
학업성적			
나쁘다	.00	1.00	.583
좋 다	-.07	.93	
전공만족도			
불만족	.00	1.00	.030
만 족	-.27	.76	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.000
>8	.82	2.26	
종 교			
없 다	.00	1.00	.019
있 다	-.30	.74	
종교성			
≤7	.00	1.00	.000
>7	-.63	.53	

다. 술·담배와 性經驗

1) 勤勞者

담배는 性經驗을 3배정도 증가시킬 수 있는 것으로 나타났고, 하루 소주 한 병을 더 마시게 될 경우 5.78배나 性經驗의 可能性이 늘어나는 것으로 분석되었다(표 5-1 참조).

2) 大學生

담배는 3.01배 정도 性經驗을 높일 수 있고, 하루 소주 한 병 飮酒量이 늘어나면 性經驗 可能性은 1.68배 增加할 수 있는 것으로 나타났다(표 5-2 참조).

2. 淪落女性과의 性經驗

가. 人口·社會學的 特性과 性經驗

1) 勤勞者

나이가 한 살 늘어남에 따라 淪落女性과의 性經驗은 1.09배 증가할 수 있는 것으로 분석되었으며, 軍隊服務經驗은 淪落女性과의 접촉가능성을 2배로 늘리는 것으로 나타났다. 收入이 높은 勤勞者가 윤락여성과의 성교 가능성이 높으며, 조기에 데이트나 술을 시작하면 淪落女性과의 성교 가능성이 적어지는 것으로 분석되었다(표 5-3 참조).

2) 大學生

나이가 한 살 늘어남에 따라 淪落女性과의 接觸 可能性이 1.62배 증가할 수 있고, 학년이 올라가면, 즉 3.4학년이 되면 1.2학년에 비해 淪落女性과의 접촉 가능성이 3.42배 증가한다. 軍服務經驗은 未經驗者 보다 6.27배나 淪

落女性과의 性經驗 가능성을 높여주는 것으로 나타났다. 조기에 술을 마시고 데이트를 시작하는 것은 윤락여성과의 性經驗 가능성을 각각 .65배, .32배 줄이는 것으로 분석되었다. 宗敎는 淪落女性과의 性經驗을 節制하도록 도와주는데, 宗敎가 있는 대학생들은 .73배 정도 淪落女性과 接觸할 가능성이 줄어드는 것으로 나타났다(표 5-4 참조).

나. 心理社會的 變數와 性經驗

1) 勤勞者

데이트 할 상대가 있으면, 淪落女性과의 성접촉 가능성이 .75배나 데이트 상대가 없는 그룹에 비해 減少하며, 淪落女性과의 성경험을 반대하는 態度는 淪落女性과의 접촉을 줄일 수 있는 가능성을 보여 주었다(표 5-3 참조).

2) 大學生

感覺追求性向이 높으면 윤락여성과의 性接觸 가능성이 2.47배 늘어나고, 부모와 相互作用이 없을 때 1.43배 정도 接觸이 증가할 可能性을 보여 주었다. 반대로 부모의 지나친 期待도 性經驗 가능성을 증가시킬 수 있는 것으로 나타났다. 同僚의 영향은 가장 커서 性經驗에 대한 동료의 영향이 있을 경우 6.66배나 淪落女性과 性經驗을 가질 가능성이 높아지는 것으로 분석되었다. 性에 대해 節制를 주장하는 대학생들의 淪落女性 接觸 가능성은 .15배 정도 낮아지는 것으로 보인다.

술의 影響力은 여전히 중요하였고, 술에 대한 期待感이 높으면 淪落女性과의 性經驗 가능성을 2.89배 증가시키는 것으로 나타났다. 專攻에 대한 만족은 淪落女性과의 性接觸을 減少시킬 가능성이 있는 것으로 나타났다(표 5-4 참조).

표 5-3. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果(勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.09	1.09	.000
교 육			
중졸이하	.00	1.00	
고 졸	.29	1.33	.422
전문대졸이상	.48	1.62	.194
군경험			
미 필	.00	1.00	.000
군 필	.67	2.00	
거주행태			
부 모	.00	1.00	.353
부모이외	.13	1.14	
직업만족도	.11	1.12	.265
수 입			
70만원이하	.00	1.00	.000
70만원이상	.53	1.69	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.267
피운다	.15	1.17	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.039
19살미만	-.28	.76	
술소비량			
한병증가/일	.25	1.29	.274
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된 다	.00	1.00	.006
안된다	-.38	.68	
매춘부			
된 다	.00	1.00	.003
절 제	-.43	.65	.000
안된다	-1.17	.31	
애인, 여자친구			
된 다	.00	1.00	.027
안된다	-.43	.65	
우연히만난여자			
된 다	.00	1.00	.094
안된다	-.23	.80	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-.46	.63	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.040
있 다	.28	.75	

표 5-4. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 회귀분석 結果 (大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.48	1.62	.000
학 년			
1, 2학년	.00	1.00	.000
3, 4학년	1.23	3.42	
군경험			
미 필	.00	1.00	.000
군 필	1.84	6.27	
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.018
≥13	.36	1.43	
부모의 지나친 기대감			
그렇다	.00	1.00	.011
아니다	-.35	.70	
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.000
20만원이상	.57	1.77	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	1.05	2.86	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.002
19살미만	-.43	.65	
술소비량			
한병증가/일	.54	1.71	.035
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.000
>13	1.06	2.89	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	1.90	6.66	

표 5-4. (계속)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
≤18	.00	1.00	.000
>18	-2.02	.13	
매춘부			
≤6	.00	1.00	.000
>6	-1.87	.15	
여자친구, 우연히만난여자			
≤12	.00	1.00	.000
>12	-1.54	.22	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-1.15	.32	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.051
있 다	.27	.32	
학업성적			
나쁘다	.00	1.00	.902
좋 다	-.02	.98	
전공만족도			
불만족	.00	1.00	.007
만 족	-.37	.69	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.000
>8	.91	2.47	
종 교			
없 다	.00	1.00	.030
있 다	-.31	.73	
종교성			
≤7	.00	1.00	.010
>7	-.47	.62	

다. 술·담배와 性經驗

1) 勤勞者

담배는 性關係에서 중요하게 나타나지 않았으며, 술의 섭취는 淪落女性과의 접촉 가능성을 增加시키는 것으로 분석되었다(표 5-3 참조).

2) 大學生

大學生들의 경우 담배를 피우는 것은 淪落女性과의 性接觸 가능성을 2.86배 정도 增加시켰으며, 하루 소주 한 병을 더 마시는 것은 淪落女性과의 性經驗 가능성을 1.71배 높이는 것으로 보인다(표 5-4 참조).

3. 女子親舊와의 性經驗

가. 人口·社會學的 特性과 性經驗

1) 勤勞者

나이가 한 살 증가함에 따라 또 軍隊를 필했을 때, 女子親舊와의 性經驗 可能性은 각각 1.06배, 1.48배 증가하는 것으로 분석되었다. 收入의 많고 적음은 여자친구와의 性經驗 가능성에 중요한 影響을 미치지 않았으며, 조기에 술을 배우고 데이트를 시작하는 것은 .93배, .72배 정도 여자친구와의 性經驗 可能性을 줄여 주었는데 그 效果는 淪落女性과의 性接觸에 비해 작게 나타났다(표 5-5 참조).

2) 大學生

나이가 한 살 늘어나면 女子親舊와의 性接觸 가능성도 1.51배 증가하는 것으로 나타났다. 學年이 올라가면 (3.4학년이 되면) 또 軍隊를 畢하게 되면 여자친구와의 성접촉 가능성이 각각 4.44배, 4.08배 늘어나는 것으로 분석되었다. 역시 조기에 술과 데이트를 시작하는 것은 .88배, .32배 여자친

구와의 性接觸 가능성을 낮추어 주었고, 종교를 갖는 것은 .71배 性經驗 가능성을 줄여 주었다(표 5-6 참조).

나. 心理社會的 變數와 性經驗

1) 勤勞者

데이트 할 상대가 있으면 性經驗의 가능성이 2.19배 늘어났고, 性經驗에 대해 반대하는 態度는 .45배 經驗을 줄일 가능성이 있는 것으로 분석되었다(표 5-5 참조).

2) 大學生

感覺的인 性向이 높을 경우 여자친구와의 性 經驗 가능성이 2.06배 증가하였고, 부모와의 相互作用은 중요하지 않은 것으로 나타났다. 동료 집단의 영향을 받을 경우 4.29배 정도 女子親舊와의 性經驗이 증가할 가능성이 있으며, 專攻의 滿足度는 중요하지 않은 變數로 분석되었다(표 5-6 참조).

다. 술·담배와 性經驗

1) 勤勞者

담배는 여자친구와의 性經驗 可能性을 1.81배 정도 증가 시키는 것으로 나타났고, 술 (소주)를 하루 한 병 더 마실 때 1.35배 정도 性交 可能性을 上昇시키는 것으로 분석되었다(표 5-5 참조).

2) 大學生

담배를 피우는 것은 여자친구와의 性經驗 可能性을 2.81배 增加시키는것으로 나타났고, 하루 소주를 한 병 더 마시면 性經驗 가능성을 1.68배 정도 上昇시키는 것으로 분석되었다(표 5-6 참조).

표 5-5. 女子친구와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 回歸分析 結果(勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.06	1.06	.002
교 육			
중졸이하	.00	1.00	
고졸	-.09	.91	.762
전문대졸이상	-.30	.74	.366
군경험			
미필	.00	1.00	
군필	.39	1.48	.006
거주행태			
부모	.00	1.00	
부모이외	.21	1.23	.112
직업만족도	-.06	.95	.566
수 입			
70만원이하	.00	1.00	
70만원이상	.19	1.21	.137
담 배			
못피운다	.00	1.00	
피운다	.59	1.81	.000
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	
19살미만	-.07	.93	.564
술소비량			
한병증가/일	.30	1.35	.183
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된다	.00	1.00	
안된다	-.20	.82	.142
매춘부			
된다	.00	1.00	
절제	-.07	.93	.599
안된다	-.47	.63	.034
애인, 여자친구			
된다	.00	1.00	
안된다	-.80	.45	.000
우연히만난여자			
된다	.00	1.00	
안된다	-.62	.54	.000
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	
19살 미만	-.33	.72	.011
현재 데이트 유무			
없다	.00	1.00	
있다	.79	2.19	.000

표 5-6. 女子친구와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 回歸分析 結果

(大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.41	1.51	.000
학 년			
1, 2학년	.00	1.00	.000
3, 4학년	1.49	4.44	
군경험			
미필	.00	1.00	.000
군필	1.40	4.08	
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.042
≥13	.13	1.13	
부모의 지나친 기대감			
그렇다	.00	1.00	.224
아니다	-.18	.84	
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.000
20만원이상	.58	1.78	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	1.03	2.81	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.407
19살미만	-.12	.88	
술소비량			
한병증가/일	.52	1.68	.053
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.000
>13	.94	2.55	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	1.46	4.29	

표 5-6. (계속)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
≤18	.00	1.00	.000
>18	-1.32	.27	
매춘부			
≤6	.00	1.00	.000
>6	-.63	.53	
여자친구, 우연히만난여자			
≤12	.00	1.00	.000
>12	-1.59	.20	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-1.15	.32	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.051
있 다	.27	1.32	
학업성적			
나쁘다	.00	1.00	.686
좋 다	.06	1.06	
전공만족도			
불만족	.00	1.00	.273
만 족	-.16	.85	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.000
>8	.72	2.06	
종 교			
없 다	.00	1.00	.024
있 다	-.34	.71	
종교성			
≤7	.00	1.00	.000
>7	-.78	.46	

4. 우연히 만난 女子와의 性經驗

가. 人口·社會學的 特性과 性經驗

1) 勤勞者

나이가 한 살 增加함에 따라 우연히 만난 女子(알지 못하는 異性과 일시적으로 만나는 경우)와의 性經驗 가능성이 1.06배 增加하는 것으로 나타났고, 軍服務 여부는 우연히 만난 여자와의 性接觸에 영향을 미치지 않는 것으로 分析되었다. 收入이 높은 근로자들은 收入이 낮은 그룹에 비해 1.23배 성경험 可能性이 增加하는 것으로 보이며, 조기에 데이트를 시작하고 술을 배우는 것은 重要하지 않은 것으로 나타났다(표 5-7 참조).

2) 大學生

나이가 한 살 增加할 때마다 1.27배 정도 우연히 만난 여자와 性關係를 가질 可能性이 늘어나는 것으로 나타났고, 학년이 올라갈 때 또 軍隊를 畢하였을 경우에 각각 2.74배, 1.6배 우연히 만난 女子와 性關係를 가질 가능성이 증가하는 것으로 分析되었다. 早期에 술을 배우거나 데이트를 하는 것은 중요하지 않은 變數로 나타났다. 宗敎의 영향력은 중요하지 않은 것으로 分析되었다(표 5-8 참조).

나. 心理社會的 變數와 性經驗

1) 勤勞者

데이트 상대가 있을때 1.49배 우연히 만난 女子와 性關係를 가질 可能性이 증가하며, 우연히 만난 여자와 성관계를 節制해야 한다고 믿는 경우 .68배 性經驗 가능성이 줄어 들었다(표 5-7 참조).

표 5-7. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 回歸分析 結果(勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.06	1.06	.081
교 육			
중졸이하	.00	1.00	.271
고졸	-.55	.58	.866
전문대졸이상	-.09	.92	
군경험			
미필	.00	1.00	.870
군필	.04	1.04	
거주행태			
부모	.00	1.00	.460
부모이외	.18	1.20	
직업만족도	.17	1.19	.316
수 입			
70만원이하	.00	1.00	.375
70만원이상	.21	1.23	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.254
피운다	.28	1.33	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.180
19살미만	.31	1.37	
술소비량			
한병증가/일	.81	2.24	.012
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된다	.00	1.00	.000
안된다	-.80	.45	
매춘부			
된다	.00	1.00	.298
절제	-.25	.78	.052
안된다	-.96	.38	
여자친구			
된다	.00	1.00	.110
안된다	.61	.54	
우연히만난여자			
된다	.00	1.00	.093
안된다	-.39	.68	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.368
19살 미만	-.21	.81	
현재 데이트 유무			
없다	.00	1.00	.086
있다	.40	1.49	

2) 大學生

感覺的 性向이 높은 경우 3.43배나 우연히 만난 여자와 性關係를 가질 가능성이 增加하였고, 父母와의 相互 作用의 영향력은 중요하지 않았다. 하지만 동료들의 影響力은 중요하여, 동료들로 부터 성경험의 壓力을 받는 경우 6.59배나 우연히 만난 여자와 性關係를 가질 可能性이 커지는 것으로 분석되었다. 술에 대한 期待感이 큰 大學生들은 2.52배나 우연히 만난 여자와 성경험을 가질 可能性을 높여 주었다. 專攻에 대한 높은 滿足度와 우수한 學業成績은 우연히 만난 여자와 성경험을 할 可能性을 각각 .63배, .50배 낮출 수 있는 것으로 分析되었다(표 5-8 참조).

다. 술·담배와 性經驗

1) 勤勞者

담배는 중요한 變數로 작용하지 않았고, 하루에 소주를 한 병 더 攝取할 때마다 2.24배 정도 우연히 만난 女子와 성경험을 할 可能性이 上昇하는 것으로 나타났다(표 5-7 참조).

2) 大學生

담배는 역시 우연히 만난 女子와 性關係를 가질 가능성을 3.18배 增加시키는 것으로 나타났고, 하루에 소주를 한 병 더 마실 때마다 1.99배 우연히 만난 여자와 性關係를 가질 可能性이 늘어나는 것으로 分析되었다(표 5-8 참조).

표 5-8. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 이변량 로지스틱 回歸分析 結果(大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.24	1.27	.000
학 년			
1, 2학년	.00	1.00	.000
3, 4학년	1.01	2.74	
군경험			
미필	.00	1.00	.059
군필	.47	1.60	
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.530
≥13	-.18	.83	
부모의 지나친 기대감			
그렇다	.00	1.00	.764
아니다	-.07	.93	
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.001
20만원이상	.82	2.27	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	1.16	3.18	
음주시작연령			
19살이상	.00	1.00	.139
19살미만	.37	1.44	
술소비량			
한병증가/일	.69	1.99	.092
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.000
>13	.92	2.52	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	1.89	6.59	

표 5-8 (계속)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
≤18	.00	1.00	.000
>18	-2.35	.10	
매춘부			
≤6	.00	1.00	.000
>6	-2.35	.10	
여자친구, 우연히만난여자			
≤12	.00	1.00	.000
>12	-1.94	.14	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.164
19살 미만	-.34	.71	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.004
있 다	.72	2.05	
학업성적			
나쁘다	.00	1.00	.011
좋 다	-.69	.50	
전공만족도			
불만족	.00	1.00	.062
만 족	-.47	.63	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.000
>8	1.23	3.43	
종 교			
없 다	.00	1.00	.442
있 다	-.20	.82	
종교성			
≤7	.00	1.00	.261
>7	-.38	.68	

第 2 節 性經驗에 대한 多變量 로지스틱 回歸分析

獨立變數와 從屬變數間의 相關關係를 이변량 로지스틱 分析을 통하여 살펴본 후에, 좀 더 상세하게 상관관계를 밝히기 위해 多變量 로지스틱 分析을 시도하였다. 多變量 로지스틱 分析의 이해를 돕기 위해 만들어진 表에서는 이변량 로지스틱 分析에서는 중요했지만 다변량 분석에서는 有意度가 없어진 變數들을 표에서 생략하고 간단히 설명하였으며, 각각의 多變量 分析모델은 다 有意度가 있는 모델링이므로 따로 P-value를 명시하지 않았다.

1. 一般(全體) 性經驗

가. 勤勞者

<표 5-9>는 一般(全體) 性經驗에 대한 多變量 로지스틱 分析의 結果를 보여주고 있다. 나이가 한 살 증가함에 따라 性經驗을 할 가능성이 1.23배 증가하는 것으로 나타났고, 軍隊經驗이나 收入 등은 영향이 없는 것으로 분석되었다. 早期에 데이트를 시작한 사람들은 .33배 정도 늦게 데이트를 시작한 勤勞者들보다 성경험을 할 可能性이 낮아지는 것으로 나타났다.

데이트 할 상대자가 있을 때에는 1.69배 정도 性經驗 가능성을 높이는 것으로 분석되었고, 婚前 성관계에 대해 否定的인 태도를 가지고 있는 경우 .41배 정도 性經驗 可能性을 낮추는 것으로 보인다.

하루에 소주 한 병을 더 섭취하게 되면 性經驗의 可能性이 2.16배나 높아지며, 담배를 피우면 2.05배 성관계를 가질 가능성이 增加하는 것으로 보인다.

나. 大學生

大學生들의 일반(전체) 성경험에 대한 多變量 로지스틱 結果는 <表 5-10>에 정리되어 있다. 나이가 한 살 增加함에 따라 1.48배 性經驗 가능

성이 높아지는 것으로 나타났고, 용돈이 많아질 때 1.45배 정도 可能性이 증가하는 것으로 分析되었다.

學年이나 軍隊經驗 등은 중요하지 않았으며, 술을 마시는 年齡도 중요하지 않은 것으로 나타났다. 하지만, 데이트 시작나이는 여전히 중요해서 早期에 데이트를 시작한 대학생들은 .46배 性經驗 가능성이 낮은 것으로 分析되었다. 宗敎의 영향은 중요하지 않은 것으로 나타났다.

感覺的 성향이 높은 大學生은 1.65배 정도 성경험 可能性이 높은 것으로 보이며, 부모와의 相互作用 역시 중요해서 부모와의 대화와 사랑이 부족한 경우 1.42배 성경험 可能性이 증가하는 것으로 나타났다. 父母의 지나친 기대는 性經驗에 중요한 영향을 주지 않았으나, 同僚의 성에 대한 影響力을 많이 받는 경우 혹은 데이트 相對가 있는 경우 각각 2.16배, 2.09배 성경험 가능성을 增加시키는 것으로 나타났다.

學業成績이나 직업의 滿足度는 다변량 로지스틱 分析에서는 중요하지 않은 것으로 보이며, 술의 期待感이 높으면 1.97배 정도로 성경험을 할 가능성을 증가시키는 것으로 나타났다. 性에 대한 態度와 感覺的 性向은 相關關係가 높은 것으로 나타나 둘 중 한 변수를 선택하게 되었는데, 性에 대한 態度와 성경험과의 相關關係는 先行硏究에서 많이 다루었으므로 生物學的인 要素까지 포함한다고 알려진 感覺的 性向을 선택하게 되었다.

담배를 피우는 것은 2.14배 성경험을 增加시키는 것으로 分析되었다. 술의 섭취는 性行態에 중요한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났지만, 술과 感覺的인 性向사이에는 相互作用(interaction)이 있는 것으로 나타났다. 다시 말해, 감각적 성향이 높은 사람은 술을 마실 경우 1.40배 性經驗을 할 가능성이 높아지는 것으로 分析되었지만, 性向이 낮은 사람이 술을 마실 경우에는 별 영향력이 없는 것으로 나타났다. 追加的인 相互作用의 가능성을 보았지만 술과 감각적 性向以外에는 相互作用이 발견되지 않았다.

표 5-9. 一般(全體) 性經驗에 關聯된 多變量 로지스틱 回歸分析 結果 (勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.20	1.23	.000
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	.72	2.05	
술소비량			
한병증가/일	.77	2.16	.063
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된 다	.00	1.00	.000
안된다	-.89	.41	
윤락여성			
된 다	.00	1.00	.178
절 제	-.33	.72	.000
안된다	-1.19	.31	
여자친구			
된 다	.00	1.00	.000
안된다	-.98	.38	
우연히만난여자			
된 다	.00	1.00	.000
안된다	-.98	.38	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-1.10	.33	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.009
있 다	.53	1.69	

-2 Log Likelihood=332.264; 자유도=10(p=.0001)

표 5-10. 일반(전체) 성경험에 관련된 다변량 로지스틱 회귀분석 결과 (대학생)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.39	1.48	.000
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.056
≥13	.35	1.42	
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.029
20만원이상	.37	1.45	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	.76	2.14	
술소비량			
한병증가/일	-.76	.47	.160
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.000
>13	.68	1.97	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	.77	2.16	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.018
>8	.50	1.65	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	.77	.46	
현재 데이트 유무			
없다	.00	1.00	.000
있다	.74	2.09	
감각적 성향(> 9)			
술소비량	1.10	2.99	.100

-2 Log Likelihood=453.587; 자유도=11(p=.0001)

2. 淪落女性과의 性經驗

가. 勤勞者

나이가 한 살 증가하면 淪落女性과의 性經驗 可能性은 1.04배 늘어나는 것으로 나타났으며, 軍隊를 마쳤을 경우 1.41배 윤락여성과의 성경험이 增加할 가능성이 있는 것으로 分析되었다(표 5-11 참조). 收入이 높은 勤勞者는 낮은 근로자에 비해 1.37배 성경험이 增加하는 것으로 나타났다. 早期에 데이트를 하는 것은 淪落女性과의 성경험 가능성을 감소(.70배)시키는 것으로 분석되었지만, 早期에 술을 마시는 것은 影響이 없는 것으로 분석되었다.

데이트 상대가 있다는 사실이 淪落女性과의 性經驗 可能性을 .60배 줄일 수 있는 것으로 나타났고, 윤락여성과의 성관계에 대해 否定的인 태도는 .70배 .37배로 성경험 가능성을 減少시킬 수 있다고 나타났다.

윤락여성과의 성경험에 있어 담배는 중요하지 않은 것으로 나타났고, 술의 影響力도 重要하지 않았다.

나. 大學生

表 5-12에 보면, 나이가 한 살 증가할 때 淪落女性과의 性經驗은 1.51배 높아지는 것으로 나타났고, 學年이나 軍隊經驗은 영향력이 없는 것으로 나타났다. 술을 시작한 年齡 역시 중요하지 않았고, 早期에 데이트를 시작하는 것은 淪落女性과의 性經驗 가능성을 減少시킬 수 있는 것으로 分析되었다. 용돈이나 宗敎의 有無 역시 중요하지 않은 것으로 나타났다.

感覺的 성향은 1.71배 부모와의 相互作用 혹은 보살핌이 缺乏되었을 때는 1.42배 윤락여성과 성경험을 가질 可能性을 높여주는 것으로 分析되었다. 同僚들의 影響을 크게 받을 때 성경험의 가능성은 2.59배 增加하는 것으로 보이며, 데이트 상대가 있다는 사실은 별 影響이 없는 것으로 나타났다.

學業成績이나 專攻의 만족여부는 중요하지 않았고, 술에 대한 期待感은 1.78배 淪落女性과의 성경험 가능성을 증가시키는 것으로 나타났다.

담배는 1.89배 윤락여성과의 性經驗 가능성을 높이는 것으로 나타났고, 술은 感覺的 性向과 相互作用(interaction)이 있는 것으로 나타났다. 즉, 감각적 성향이 높은 大學生이 술을 마셨을 경우 1.84배 정도 淪落女性과의 성경험 可能性이 增加하지만, 感覺的 性向이 낮은 사람이 술을 마셨을 경우에는 성경험에 대한 影響力이 없는 것으로 分析되었다.

表 5-11. 淪落女性과의 性經驗에 관련된 다변량 로지스틱 回歸分析 結果 (勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.04	1.04	.088
군경험			
미필	.00	1.00	.064
군필	.34	1.41	
수 입			
70만원이하	.00	1.00	.042
70만원이상	.32	1.37	
성상대별 성행위에 대한 태도			
전체 성상대자			
된다	.00	1.00	.049
안된다	.32	.75	
윤락여성			
된다	.00	1.00	.019
절제	-.35	.70	.000
안된다	-.99	.37	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.014
19살 미만	-.36	.70	
현재 데이트 유무			
없다	.00	1.00	.000
있다	-.52	.60	

-2 Log Likelihood=69.730; 자유도=8(p=.0001)

표 5-12. 윤락여성과의 성경험과 관련된 다변량 로지스틱 회귀분석 결과 (대학생)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.41	1.51	.000
부모의 양육			
<13	.00	1.00	.062
≥13	.35	1.42	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	.64	1.89	
술소비량			
한병증가/일	-.89	.41	.150
술의 심리적 영향			
≤13	.00	1.00	.001
>13	.58	1.78	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	.95	2.59	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.018
>8	.54	1.71	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.000
19살 미만	-.70	.50	
감각적 성향(>9)			
* 술소비량	1.50	4.48	.042

-2 Log Likelihood=374.756; 자유도=9(p=.0001)

3. 女子親舊와의 性經驗

가. 勤勞者

나이가 한 살 增加함에 따라 여자친구와의 性關係를 가질 가능성이 1.03배 增加하는 것으로 나왔으며, 軍隊經驗이나 收入은 영향력이 없는 것으로 분석되었다. 일찍 데이트를 시작하는 것은 .79배나 성관계의 可能性을 줄이는 것으로 나타났으나, 早期에 술을 마시는 것은 여자친구와의 性關係에 있어서는 影響力이 없었다.

表 5-13 女子親舊와의 性經驗에 관련된 多變量 로지스틱 回歸分析 結果 (勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.03	1.03	.081
담 배			
못피운다	.00	1.00	.002
피운다	.44	1.56	
성상대별 성행위에 대한 태도			
여자친구			
된 다	.00	1.00	.004
안된다	-.58	.56	
우연히만난여자			
된 다	.00	1.00	.002
안된다	-.43	.65	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.080
19살 미만	-.24	.79	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.000
있 다	.63	1.88	

-2 Log Likelihood=82.656; 자유도=6(p=.0001)

데이트 相對者가 있을 때는 여자친구와의 性關係를 가질 可能性이 약 1.88배나 증가하지만, 여자친구와의 婚前 성관계에 대해 否定的인 態度를 가지고 있을 경우 性關係 可能性을 .56배 낮추는 것으로 分析되었다.

담배를 피우는 것은 여자친구와의 성경험 可能性을 1.56배 增加시키는 것으로 나왔으나, 술은 影響力이 별로 없는 것으로 나타났다(表 5-13 참조).

나. 大學生

表 5-14에는 大學生들의 여자친구와의 성관계 分析이 나와있다. 나이가 한 살 增加할 때 1.36배 정도 여자친구와의 性經驗 가능성이 증가하는 것으로 나타났다. 한편 용돈의 다·소는 중요한 影響을 주지 못했다. 軍隊經驗은 중요하지 않은 것으로 나타났고, 學年이 올라감에 따라(3.4학년) 1.93배 정도 女子親舊와 성경험을 할 可能性이 증가하였다. 술을 早期에 시작하는 것은 중요하지 않았지만 조기에 데이트를 시작하는 것은 .75배 정도 여자친구와의 性經驗 가능성을 낮추었다. 宗敎의 影響力은 상대적으로 중요하지 않은 것으로 나타났다.

感覺的인 성향은 여전히 중요해서 여자친구와의 性關係 가능성을 1.79배 정도 높이는 것으로 나타났고, 父母와의 相互作用이나 부모의 지나친 기대감은 중요하지 않은 것으로 나타났다. 同僚들의 영향은 1.74배 데이트 相對者가 있는 경우 2.25배 여자친구와의 性關係의 可能性을 증가시키는 것으로 分析되었다. 學業成績이나 專攻의 만족여부는 중요한 變數가 아닌 것으로 나타났다. 담배는 여자친구와의 성경험 가능성을 2.12배 높이는 것으로 나타났으나, 술의 영향력은 중요하지 않은 것으로 나타났다.

表 5-14. 女子親舊와의 性經驗에 關聯된 多變量 로지스틱 回歸分析 結果 (大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.31	1.36	.000
학 년			
1, 2학년	.00	1.00	.002
3, 4학년	.66	1.93	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.000
피운다	.75	2.12	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.003
>6	.55	1.74	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.002
>8	.58	1.79	
데이트 시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.106
19살 미만	-.29	.75	
현재 데이트 유무			
없 다	.00	1.00	.000
있 다	.81	2.25	

-2 Log Likelihood=251.080; 자유도=7(p=.0001)

4. 우연히 만난 女子와의 性經驗

가. 勤勞者

나이가 한 살 增加함에 따라 우연히 만난 女子와의 性經驗 가능성이 1.08배 정도 增加하지만, 收入이나 軍隊經驗 등은 중요하지 않은 것으로 나타났다. 조기에 飮酒를 시작했을 경우 1.59배 정도 우연히 만난 女子와의 성경험 가능성이 높아지며, 早期에 데이트를 시작하는 것은 별 影響力이 없었다.

데이트 相對者가 있다는 것은 주요한 影響을 주지 못했고, 우연히 만난 여자와의 성관계에 대해 否定的인 態度를 갖는 것은 성경험의 가능성을 .57배 減少시켰다.

담배는 별 영향이 없었지만, 하루에 소주 한 병을 더 마시는 경우 우연히 만난 女子와의 性經驗 可能性이 2.07배 정도 증가하는 것으로 分析되었다(表 5-15 참조).

表 5-15. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 多變量 로지스틱 回歸分析 結果(勤勞者)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나이(한살증가)	.07	1.08	.021
술소비량			
한병증가/일	.73	2.07	.026
태 도(여자친구)			
된다	.00	1.00	.149
안된다	-.56	.57	
음주시작나이			
19살 이상	.00	1.00	.055
19살 미만	.47	1.59	

-2 Log Likelihood=14.837; 자유도=4(p=.0051)

나. 大學生

나이가 한 살 더 먹어감에 따라 1.18배, 용돈을 많이 받는 경우 1.76배 우연히 만난 女子와의 性經驗 가능성이 增加하는 것으로 나타났다(表 5-16 참조). 學年이나 軍隊服務의 影響力은 중요하지 않았으며, 술을 早期에 시작한 것, 데이트를 조기에 시작한 것, 宗教有無 등도 중요하지 않은 것으로 分析되었다.

表 5-16. 우연히 만난 女子와의 性經驗에 관련된 多變量 로지스틱 回歸分析 結果(大學生)

변 수	β	Odds Ratio	p-value
나 이			
한살증가	.17	1.18	.008
수 입			
20만원이하	.00	1.00	.034
20만원이상	.56	1.76	
담 배			
못피운다	.00	1.00	.129
피운다	.45	1.56	
친구의 영향			
≤6	.00	1.00	.000
>6	1.33	3.77	
감각적 성향			
≤8	.00	1.00	.003
>8	.89	2.44	
현재 데이트 유무			
없다	.00	1.00	.064
있다	.49	1.63	
학업성적			
나쁘다	.00	1.00	.008
좋다	-.78	.46	

-2 Log Likelihood=90.561; 자유도=7(p=.0001)

感覺的 性向은 2.44배 우연히 만난 여자와의 性經驗 가능성을 增加시키는 것으로 나타났고, 父母와의 相互作用이나 부모의 지나친 期待感 等은 영향력이 없었다. 同僚들의 성경험에 대한 影響力이 클 때 우연히 만난 여자와의 性經驗 가능성이 3.77배나 增加하며, 데이트 상대가 있을 때는 1.63배 높아지는 것으로 分析되었다. 學業成績이 優秀할 경우 성경험 가능성이 .46배 減少하는 것으로 나왔고, 專攻의 滿足與否는 중요하지 않은 것으로 분석되었다.

담배는 우연히 만난 여자와의 性經驗 가능성을 1.56배 정도 增加시키는 것으로 나타났으나, 술은 影響力이 없는 것으로 分析되었다.

第 6 章 要約 및 結論

이 장은 다음과 같이 크게 세 부분으로 나뉘어진다. 첫번째 부분은 結果의 要約이며, 두번째는 이 결과가 제1장에서 제시한 硏究 質問에 어떤 대답을 해주는가에 대한 것이며, 마지막 부분은 本 硏究結果를 바탕으로 性病과 性行態의 豫防을 위한 政策提案이다.

第 1 節 要 約

本 硏究는 未婚男性 특히 勤勞階層과 이에 對照되는 집단인 大學生의 性病有病率을 파악하고, 이와 관련된 성행태의 樣相을 정확히 파악하여 未婚男子들의 性敎育과 生殖保健에 관한 적절한 사회적 서비스 및 성병감염을 防止할 수 있는 적절한 措置를 강구하기 위한 자료를 産出하기 위하여 시도되었다.

本 硏究에서 근로자 집단은 서울시 구로공단의 9개 업체와 서울 주변 부천시의 총 11개 業體에서 조사된 未婚男性 勤勞者 1,039명의 자료가 분석되었으며, 조사대상 大學生의 標本選定은 서울시내 대학에 대하여 3단계의 系統抽出方法으로 4개 대학을 선정하여 1학년에서 4학년까지 총 1,103명의 資料를 分析하였다. 주요 연구결과는 다음과 같다.

1. 應答者의 一般 特性

가. 勤勞者의 平均 年齡은 25.3세였고, 大學生의 평균 연령은 22.1세로 근로자 집단이 대학생 집단에 비해 年齡이 높은 사람이 많았다.

나. 勤勞者의 敎育水準은 76.9%가 고등학교이며, 전문대 이상은 18.4%, 중학교 이하는 4.7%에 지나지 않았다.

다. 兵役을 마친 勤勞者는 70.8%였으며, 大學生은 42.1%가 병역을 마친 것으로 나타났다.

라. 應答者들의 最長居住地는 근로자의 경우 大都市와 邑·面 地域이 각각 42.5%, 42.1%로 비슷했으나, 대학생에 있어서는 대도시가 64.5%인데 비해 읍·면 지역은 16%에 불과했다. 현재 居處로는 근로자에서 父母兄弟집(본가)이 38.4%, 자취가 25.5%, 기숙사가 23.1%였으며, 大學生에 있어서도 부모형제집(본가)이 제일 많아 52.4%, 자취 21.6%, 하숙이 11.2%로써 근로자에서는 부모를 떠나 자취 및 기숙사 居住者가 많은 것으로 나타났다.

마. 吸煙率은 勤勞者는 73.9%, 대학생은 54.7%였다. 飮酒率은 근로자가 90.7%, 대학생이 94.4%로 대학생이 약간 높았다. 그러나 飮酒頻度에 있어서는 1주일에 3-4회 음주자가 근로자에서 30.8%인데 비해 대학생은 9.5%에 불과했으며, 平均飮酒量도 근로자가 많은 것으로 나타났다.

2. 性에 관한 知識

가. 家族計劃, 性病 등을 포함한 性敎育 이수처로는 근로자에서 학교가 60.2%로 가장 높았고, 다음은 모임, 職場의 순서로 나타났다. 個別相談을 받았다는 비율은 5.8%에 불과했다. 대학생에 있어서도 學校가 가장 높아 66.8%, 그 다음이 모임, 기타의 順으로 나타났으며, 個別相談은 근로자와 마찬가지로 5.2%에 지나지 않았다. 근로자의 24.5%, 대학생의 19.1%는 性敎育을 전혀 받지 않은 것으로 나타났다. 이와 같이 학교를 통해 性敎育을 받은 경우가 많기는 하나 성교육을 가정에서 받았을 때와 個別相談을 받았을 때 敎育效果가 높은 반면, 학교를 통한 敎育은 별 도움이 안되는 것으로 나타났다.

나. 避妊方法에 대한 근로자 및 대학생의 知識程度는 콘돔, 정관수술 등 남성용 피임방법에 대한 知識이 높았으며, 여성용 피임방법 중에서

는 먹는피임약에 대한 지식수준이 높으며, 大學生들의 知識水準이 좀 더 높은 편이었다. 피임방법에 대한 지식 情報源으로는 주간지나 월간잡지, 책자 등 大衆媒體를 통한 知識習得이 많았다.

다. 性에 대한 一般的 知識은 근로자, 대학생 모두 높은 편이었다. 그러나 性病感染 및 豫防에 대한 지식수준은 낮아 잘못 알고 있는 경우가 상당수에 이르고 있다. 性病豫防方法 중 콘돔에 대해서는 비교적 認知率이 높으나, 豫防效果가 없는 방법이 효과가 있다고 잘못 알고 있는 사람이 많았다. 性病에 대한 知識源은 신문, 잡지 등의 印刷媒體가 가장 많았다.

라. AIDS에 대한 認知率은 높은 편이나, 感染經路에 대해서 몇 가지를 제외하고 정확히 알고 있는 비율은 勤勞者, 大學生 모두 낮은 수준이었다.

마. 性에 관한 知識要求度는 근로자가 66.8%, 대학생이 64.9%로 2/3 정도가 성에 대해 보다 알기를 원하고 있었으며, 근로자의 39.7%, 대학생의 33.8%가 性에 관하여 相談을 원하고 있어 未婚男性을 위한 性敎育 프로그램에 대한 要求度가 높은 것으로 나타났다. 응답자들이 원하는 성교육 내용으로는 勤勞者의 경우 性病 및 AIDS가 31.6%로 제일 많았고, 그 다음은 異性交際(24.7%), 男女生殖器(21%), 避妊方法(19.7%), 性的衝動(18.2%) 順이었다. 대학생에서는 이성교제가 제일 많아 31.2%, 그 다음이 성병 및 AIDS(25.2%), 피임방법(24.3%), 성적충동(23.8%) 순이었다.

3. 性에 대한 態度

가. 男子의 婚前 純潔에 대해서 근로자에 비해 대학생 집단이 혼전 순결을 약간 더 중요하게 여기는 것으로 나타났다. 특히 勤勞者에서 여자측은 婚前 순결을 반드시 지켜야 한다는 見解가 아주 높아(42.5%) 여성측에 대해서 純潔意識을 강하게 要求하는 태도를 가진 반면, 大

學生에 있어서는 28.7%로 여자의 순결에 대하여 상당히 許容的인 態度를 가지고 있다.

나. 大學生 집단은 근로자 集團에 비하여 아는 여자, 결혼상대자와의 婚前 性行爲, 淪落女性과의 성행위에 대해 許容하지 않는 見解가 높았다.

다. 婚前 姙娠에 대한 태도는 勤勞者와 대학생간의 態度에 차이를 보이는데, 근로자 집단에서는 반드시 낳아야 한다는 見解가 높은 반면, 大學生 집단에서는 養育이 가능한 경우에 出産한다는 견해가 높았다.

4. 性行爲 經驗實態

가. 一般(全體) 性經驗

① 勤勞者들의 84.4%가 異性交際 경험이 있었으며, 현재 이성교제중인 경우도 42.7%로서 이성교제 경험 75%, 現在 交際中 36.7%인 대학생에 비하여 이성교제가 활발한 것으로 나타났다.

② 性行爲(性交) 經驗率은 근로자에서 78.1%, 대학생은 36.3%로서 근로자와 대학생간에 큰 差異를 나타내었다. 性行爲 경험률은 年齡에 따라 比例的으로 증가하며, 軍隊를 마친 대상자가 未畢者에 비하여 성행위 經驗率이 높았다. 자취를 하는 대상에서 성행위 경험률이 다소 높았고, 吸煙을 많이 할수록, 飮酒量이 많을수록 성경험률이 有意하게 높은 것으로 나타났다.

③ 性에 대한 知識과 性病傳染 및 性病豫防에 대한 지식이 높은 집단에서 성행위 經驗率이 높은 것으로 나타났다. 婚前의 純潔, 혼전 異性과의 性行爲, 淪落女性과 性行爲, 婚前姙娠에 대한 태도 등에서 성행위에 대한 태도가 保守的인 사람에 비하여 보다 許容的인 집단에서 성행위 經驗率이 有意하게 높았다.

④ 첫 성교를 할 당시 근로자들이 飮酒를 한 경우는 대학생보다 다소 많았고, 콘돔사용률은 大學生들에 비하여 낮은 것으로 나타났다.

나. 淪落女性과의 性經驗

① 勤勞者 1,039명중 649명(62.8%), 大學生 1,103명중 291명(26.4%)이 윤락여성과 性行爲 經驗을 한 것으로 나타났다. 이는 성행위 경험자 중에서는 勤勞者의 80%, 大學生의 72.8%가 윤락여성과 性行爲를 경험한 것으로 나타났다. 淪落女性 대상(類型)별 성행위 경험률은 근로자의 경우 賣春婦가 가장 높고(39.9%), 그 다음이 술집여자(23.6%), 遊興業所 女子(20.1%)였으며, 안마시술소 여자, 다방 종업원, 이발소 종업원과의 성경험률도 상당한 水準에 이르는 것으로 나타났다. 대학생 집단에서는 一般 淪落女性이 대부분(16%)을 차지하고 있으나, 接觸水準은 근로자 집단에 비하여 낮았다.

② 윤락여성과 첫 性經驗을 갖게 된 動機는 근로자의 경우 친구나 아는 사람이 부추겨서 他意로 갔다는 사람이 45.1%로 많았고, 自意반 타의 반이 39.0%, 그리고 스스로 결정한 경우는 14.3%에 불과하였고, 同行者로는 근로자의 49.3%, 대학생의 71.8%가 친구 및 先後輩와 동행한 것으로 나타나 윤락여성과의 性行爲가 동료 친구의 影響을 크게 받는 것으로 把握되었다.

다. 콘돔 使用實態

콘돔 使用水準은 근로자와 대학생이 모두 낮은 水準으로 첫 性經驗時에는 각각 15.1%, 22.1%이었다. 勤勞者에서 가장 최근의 성행위시 사용률은 23.3%로 콘돔사용률이 처음 性行爲에 비하여는 약간 높으며, 大學生에서도 성행위 對象者別로 콘돔사용률을 볼 때 첫 性行爲時보다는 최근 성행위시 콘돔사용이 增加한 것으로 나타났다. 콘돔사용수준은 性行爲 상대자에 따라 差別化되어 있는 것으로 나타났다.

라. 婚前 同居實態

應答者들의 異性과 同居經驗은 근로자의 경우 11.3%가 과거에 동거를 경험했으며, 1.5%가 현재 동거중인 것으로 全體的으로 12.8%가 동거를 經驗

했다. 대학생에서는 2.3%가 同居한 경험이 있으며, 0.4%가 현재 동거를 하고 있어 전체적으로 2.6%가 동거를 경험한 것으로 나타났다. 同居經驗率은 年齡이 높을수록 높았고, 부모를 떠나 자취를 하는 경우, 父母가 死亡 및 離婚을 한 경우 높아 부모와 관련된 社會的인 環境에 따라 영향을 받는 것으로 보인다.

마. 相對女性의 婚前 姙娠經驗實態

調査對象 미혼남성들이 성행위 相對女性을 姙娠시킨 경험을 보면 근로자들은 16.3%가 경험이 있었고, 大學生 집단에서도 4.0%가 經驗이 있는 것으로 나타났다. 이는 성행위 경험자 중에서는 근로자가 20.8%, 대학생은 11.0%에 이른다. 이들 임신이 出産으로 終結된 경우는 근로자에서 13.0%, 대학생에서는 11.4%였다. 姙娠 및 出産經驗率은 부모와 떨어져서 산 경험, 吸煙者, 飮酒者, 敎育水準이 낮은 계층에서 높았고, 특히 동거경험자 중에서는 비경험자에 비해 姙娠比率이 5배 이상, 出産比率이 17배 정도 높은 것으로 나타났다.

5. 性病感染 經驗實態

가. 성병감염 旣往歷을 보면 근로자에서는 전체 조사대상 1,039명중 178명(17.1%)이 性病感染 경험자로 나타났고, 性交經驗者 811명 중에서는 21.9%에 이르는 높은 감염경험률을 나타내고 있다. 대학생에 있어서는 조사대상 1,103명중 33명(3.0%)이 性病에 감염된 旣往歷을 갖고 있으며, 性交經驗者 400명 중에서는 8.3%가 성병감염 경험이 있는 것으로 밝혀졌다.

나. 성병감염자가 찾은 첫 治療處는 근로자의 경우 藥局이 48.9%, 병의원 및 保健所가 41.6%였으며, 大學生에서는 병의원 및 보건소가 48.6%, 약국이 33.3%로 약국이용이 높아 性病感染時 적절한 專門的

인 치료를 받지 못하고 위험한 自家治療를 하고 있는 것으로 나타나고 있다.

다. 性病感染源은 근로자의 경우 윤락여성 및 콜걸이 46.1%, 술집 및 다방종업원이 26.4%를 차지하고 있고, 친구, 애인의 경우도 10.7%에 이르고 있다. 大學生에서는 淪落女性 및 콜걸이 69.7%, 친구, 애인은 3%였다.

라. 性病에 걸릴 당시의 콘돔사용 實態를 보면 근로자에서 84.8%, 大學生에서는 87.9%가 콘돔을 사용하지 않았다. 성병감염 당시 대부분 飮酒를 하였고 특히 음주를 한 집단에서 콘돔사용률이 낮은 것으로 나타났다.

6. 性行爲에 影響을 미치는 要因 (로지스틱 回歸分析結果)

가. 一般(全體) 性行爲 대상과의 性經驗

勤勞者에서는 나이가 많을수록, 데이트할 相對가 있는 경우, 술과 담배를 하는 경우 性經驗을 가질 確率이 높은 반면, 早期에 데이트를 시작한 경우, 純潔意識이 강한 경우에는 性經驗의 가능성을 줄이는 것으로 나타났다. 大學生에서는 나이가 많을수록, 용돈이 많을수록 부모의 統制와 관여가 적을수록, 친구의 성에 대한 誘惑이 많을수록 性經驗의 가능성이 높아지는 것으로 나타났으며, 應答者가 感覺的인 성향이 높고 담배를 피우는 경우 性經驗이 增加되는 것으로 보여진다.

나. 淪落女性과의 性經驗

勤勞者에서는 나이가 많을수록, 또 收入이 높은 경우에 性經驗의 가능성이 높아지며, 軍隊經驗이 매우 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 大學生에서는 나이가 많아질수록 윤락여성과의 性經驗을 가질 可能性이 높아지는 것으로 나타났으나, 일반적인 성행태의 分析에서와 같이 용돈이 중요한

요소는 아니었다. 父母와의 대화와 사랑, 부모의 통제 缺乏은 윤락여성과의 性經驗 가능성을 增加시켰으며, 친구들의 影響力 역시 상당히 중요한 것으로 나타났다. 본인의 感覺的인 性向과 吸煙은 윤락여성과의 性經驗을 할 가능성을 높이는 것으로 나타났다. 특히 술의 경우 感覺的 성향과의 相互作用이 있었는데, 감각적 성향이 높고 飮酒를 할 경우 약 두 배 가까이 性經驗을 할 가능성이 높아지는 것으로 나타났다.

다. 여자친구와의 性經驗

勤勞者에서는 年齡이 높을수록 여자 친구와의 性經驗이 높아지는 것으로 나타났으며, 軍隊經驗이나 수입의 影響力은 중요하지 않은 것으로 나타났다. 데이트할 상대가 있으면 성경험을 할 可能性이 증가하고 이와는 반대로 早期에 데이트를 시작하는 것은 性經驗을 줄이는 역할을 하는 것으로 보인다. 여자친구와의 結婚前 성행위에 대하여 否定的인 태도는 성행위를 줄이는 것으로 나타났다. 吸煙도 중요한 影響力을 갖는 것으로 나타났다. 대학생에서는 나이가 많을수록 學年이 높아질수록 여자 친구와 性經驗을 할 可能性이 높아지며, 感覺的 性向과 담배는 여자 친구와의 성경험 가능성을 높여 주었고, 早期에 데이트를 시작하는 것은 그러한 可能性을 낮추는 것으로 보인다.

라. 우연히 만난 女子와의 性經驗

勤勞者에서는 나이가 들수록 우연히 만난 여자와의 性行態는 증가할 가능성이 높아지며, 軍服務 경험은 별 상관 관계를 보이지 않았다. 飮酒와 早期에 술을 마시기 시작한 것은 우연히 만난 여자와의 性經驗을 가질 가능성을 증가시키는 것으로 나타났다. 結婚前 성관계에 대해 否定的인 경우 性經驗을 줄이는 경향이 많은 것으로 나타났다. 全般的으로 우연히 만난 女子와의 성행태는 淪落女性보다는 여자 친구와의 성행태 說明變數들과 類似하였다. 대학생에서는 역시 나이가 성경험을 增加시켰으며, 다른 성행태와는 달리 용돈이 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다. 다른 性行態에

서와 마찬가지로 본인의 感覺的 性向과 친구의 影響, 데이트 상대가 있는 것이 우연히 만난 여자와의 性經驗을 높이는 데 중요한 役割을 하는 것으로 나타났다. 學業成就度가 높은 경우에는 우연히 만난 女子와 性接觸이 줄어드는 경향을 보여주었다.

第 2 節 論 議

硏究結果에 의미를 부여하는 것은 다음 장의 政策代案과 직접 연관되어 있는 매우 重要한 부분이라고 할 수 있어 다음과 같이 分析된 결과에 대하여 논의를 展開하고자 한다.

1. 性敎育 現況 및 敎育의 效果

未婚勤勞男性과 대학생들의 性敎育 이수상태를 파악하는 것은 성교육이 성에 대한 知識 및 성행태에 영향을 미칠 수 있으며, 앞으로 이들 대상에 대한 性敎育 方向設定과 적절한 성교육 프로그램을 開發하는데 중요한 자료가 될 수 있다.

應答者들이 家族計劃 및 性病 등을 포함한 性敎育을 받은 곳은 학교, 모임, 직장 등으로 勤勞者, 大學生 모두 학교에서 性敎育을 받은 경험이 많았다. 그러나 성교육의 效果는 가정에서 교육을 받았을 때와 個別相談을 받았을 때 높았고, 學校敎育은 별 효과를 거두지 못하고 있는 것으로 보여 個別的인 교육이 效果가 높은 것으로 나타났다. 이는 1991년 연구(김한경 외, 1991)에서 학교 性敎育은 그 필요성에 대한 학교측(교사)의 認識不足과 敎育內容 자체에 결함이 있어 초·중·고등학교를 거치는 동안에 必需的으로 갖추어야 하는 性知識 수준을 전달하는데 貧弱하고, 企業體 역시 경영자측의 認識不足으로 인해 근로자를 위한 성교육 프로그램이 없거나 有名無實한 企業體가 많다는 結果와도 부합되고 있다.

그러나 成長過程에서 성교육을 받을 수 있는 普遍的인 기회는 學校敎育이라는 점에서 학교에서의 효율적인 性敎育이 필요하며, 또한 일찍이 학교를 마치고 靑少年期를 직장에서 보내는 勤勞者를 위해서는 職場에서의 性敎育 强化가 절실하게 요구되고 있다고 볼 수 있다.

2. 性에 대한 知識

性에 대한 일반 常識的인 知識水準은 근로자, 대학생 모두 높은 편이나, 性病 및 AIDS 感染經路 및 豫防에 대해서는 잘못 알고 있는 경우가 상당수에 이르고 있어 이에 대한 敎育과 弘報가 강화되어야 할 것으로 보인다.

근로자와 대학생들이 性(避妊方法, 性病, AIDS)에 대한 知識을 습득하는 주요 媒體가 잡지, 책자, 라디오, TV, 친구 등으로 나타나고 있으며, 職場이나 學校, 保健醫療人, 부모 등에 대해서는 반응이 낮게 나타나고 있어 성에 대한 지식을 직장이나 學校敎育을 통해서 습득한다기보다는 大衆媒體와 親舊와의 대화에 의하여 습득하고 있었는데 친구들로부터 얻는 知識이 정확하다고 보기는 어려우며, 또한 많은 잡지가 衝動的이고 短篇的이며 오도된 性敎育 내용을 다루고 있어 올바른 情報源으로서의 역할을 기대하기는 어렵다는데 問題가 있다고 하겠다.

性에 대한 知識要求度는 비교적 높아 勤勞者와 大學生의 2/3 정도가 성에 대해 보다 알기를 원하고 있으며, 근로자와 대학생의 1/3 정도가 성에 관하여 相談을 원하고 있는 것으로 나타나고 있다.

근로자가 원하는 性敎育 內容은 성병과 AIDS가 優先的으로 꼽혔으며, 大學生들은 異性交際였던 것은 그들의 성행위 대상으로 볼 때 勤勞者는 주로 淪落女性이며, 대학생은 여자친구·애인이며, 또한 性經驗率의 큰 차이로 인해 그들의 당면 性問題가 차이가 있기 때문으로 보인다.

특히 勤勞者에서는 그들이 性的衝動이나 욕구를 解消하기 위한 대상으로 윤락여성 등 성병감염의 危險性이 많은 여성과의 性接觸이 용이하게 이루

어질 수 있다는 점과 최근 AIDS 문제가 深刻한 社會問題로 대두되고 있다는 점에서 靑少年 및 未婚 靑壯年에 대한 性敎育의 强化는 시급한 당면과제로 볼 수 있다.

3. 性에 대한 態度

婚前純潔에 대해 근로자와 대학생의 態度에 차이가 나타나 여성에게 기대하는 純潔意識이 社會階層에 따라 차이가 있는 것으로 보인다. 즉 사회계층이 높아지면서 여자에 대한 性規範과 남자에 대한 성규범의 차이를 크게 두지 않고 平等한 意識을 갖고 있는 것으로 볼 수 있다.

大學生 집단은 여자친구와의 性行爲에 대해서 勤勞者 집단에 비하여 許容程度가 낮았으며, 특히 윤락여성과의 性行爲에 대해서는 근로자 집단에 비해 좀 더 保守的인 경향을 보이고 있는데, 이는 학생이라는 現 身分과 年齡的으로 結婚適齡期에 미달되어 있고, 또한 부모의 관여가 보다 크기 때문이 아닌가 思料된다.

AIDS로 인해 사회적으로 문제가 제기되기 시작한 同性戀愛와 男女混宿에 대한 見解는 근로자, 대학생 모두 否定的인 태도를 갖고 있어 이들의 대다수는 그러한 행위를 許容하지 않고 있는 것으로 받아들일 수 있다.

4. 性行爲 經驗實態

성행위를 經驗한 비율은 근로자가 78.1%, 대학생은 36.3%로 대학생보다 근로자의 性交經驗者가 월등하게 많다. 이는 근로자와 대학생간에 年齡構造의 차이, 社會人의 身分과 學生身分의 차이, 社會經濟的 特性의 차이, 그리고 성에 대한 觀念의 차이 즉 근로자가 대학생보다 性觀念이 희박한 데서 緣由하는 것으로 풀이된다.

勤勞者, 大學生 모두 年齡增加에 따라 성경험률은 比例的으로 증가하고

있는데, 이는 結婚適齡期에 이른 미혼자에서 당연한 現象이라고 볼 수 있으며, 軍隊를 마친 경우 자취를 하는 대상에서 性經驗率이 높게 나타나고 있는 것은 친구들의 影響과 부모의 統制가 제대로 미치지 못하고 있는데 관련되는 것으로 풀이된다. 또한 흡연을 많이할수록, 飮酒量이 많을수록 性經驗率이 높게 나타나고 있어 술과 담배가 性衝動을 유발하는 것이거나, 술 담배 자체를 즐기는 사람들이 성적으로 보다 許容的이기 때문에 나타난 결과로 사료된다.

性病傳染 및 性病豫防에 대한 지식이 높은 집단에서 성경험률이 높은 것으로 나타나고 있는데, 이것은 우리의 社會文化的 배경에서 성에 대한 지식이 매우 非公開的으로 얻어져서 대부분 잡지 등 大衆媒體를 통하여 不確實한 성지식을 습득하고 있기 때문에 올바른 性知識은 성경험을 가진 후에야 知識을 얻는 것이 아닌가 여겨진다. 현대 社會心理學의 이론에서도 知識의 習得은 行動과 竝行하여 얻어지는 것으로 파악되고 있다.

미혼남성들의 성행위시 콘돔사용은 성병 및 AIDS 豫防과 姙娠防止를 위하여 必需的이라고 할 수 있다. 응답자들의 성행위시 콘돔사용률은 근로자 15%, 대학생이 22%에 불과했다. 그러나 性相對者의 類型에 따라 차이가 크게 나타났는데 성병 및 AIDS 感染의 危險을 의식한 탓인지 淪落女性과의 성행위시에는 콘돔사용률이 약간 높아 근로자에서 24%, 대학생에서는 36%에 이르고 있다. 미혼남성들은 性行爲對象으로서 윤락여성이 큰 비중을 차지하고 있다는 현실을 勘案할 때 이들을 성병이나 AIDS 감염의 위험으로부터 保護하기 위하여는 콘돔사용에 대한 積極的인 弘報敎育이 보다 심도있게 다루어져야 하며, 또한 윤락여성에 대한 性病 및 AIDS 관리가 보다 內實化되어야 함을 示唆하는 결과라 하겠다.

婚前의 性行爲는 대부분 理性的이고 計劃的으로 이루어지는 것이 아니라 衝動에 의해 瞬間的이고 無計劃的으로 이루어지기 쉽다. 따라서 避妊方法이 많이 개발되어 있고, 피임도구의 購入이 용이한데도 불구하고 미혼남녀의 性關係에서는 원치 않는 姙娠의 可能性이 높다.

本 硏究結果 성행위 경험자 중에서 상대여성에게 姙娠시킨 經驗은 근로자에서 20.8%, 대학생은 11.0%였으며, 이는 姙娠經驗者 중에서 근로자의 경우 13%, 대학생 집단에서는 11.0%가 出産을 경험하고 있어 結婚前 임신의 결과가 대부분 人工姙娠中絶로 처리되고, 일부는 未婚母 발생을 招來하고 있는 것을 나타내고 있다. 이러한 결과는 未婚女性 당사자의 개인적인 문제와 健康上의 문제 이외에도 심각한 社會問題를 야기시키는 요인이 될 것으로 보인다.

5. 性病感染 經驗實態

本 硏究結果 미혼 남성들의 성행태는 婚前 性行爲 경험이 普遍化되어 있고 성행위 대상에서 性病感染 위험집단이라고 할 수 있는 淪落女性이 큰 비중을 차지하고 있음을 감안할 때 성병감염의 危險이 상당히 內在되어 있다고 볼 수 있으며, 근로자 집단과 대학생 집단의 性行爲 대상에서 여자친구와 윤락여성이 同一한 比重을 보인 결과를 볼 때 婚前 男性들이 윤락여성으로부터 얻은 性病을 여자친구에게 전파시킬 수 있는 可能性도 배제할 수 없다.

이번 조사결과 未婚 남성근로자는 1,103명중 성병감염 경험자는 178명(17.1%)이었고, 性交經驗者 811명 중에서는 21.9%에 이르는 높은 感染歷을 나타내고 있다.

또한 2회 이상 성병에 感染된 比率도 근로자에서 37.1%로 대학생에 비하여 월등하게 높았다. 이와 같은 현상은 미혼 남성근로자들의 年齡이 비교적 많아 性的欲求가 강하며, 經濟的으로 自立狀態에 있어 性行爲에 대한 어떤 제재나 간섭을 받지 않고 자유롭게 행동할 수 있는 環境과 聯關된 것으로 보인다.

性病感染者가 찾은 첫 치료처로는 근로자의 경우 藥局이 48.9%, 대학생에서는 약국이 33.3%로 성병감염자중 많은 사람이 一次的으로 醫師의 처방

이나 치료없이 賣藥에 의한 自家治療를 하고 있는 것으로 나타나고 있어, 이러한 治療實態는 내성균의 출현과 완치를 어렵게 하는 要因으로 성병치료에 큰 問題點으로 지적될 수 있다.

이와같은 사실은 미혼남성들에 대한 性敎育에 있어서 성병예방과 치료 그리고 성병전파에 관한 사항이 반드시 具體的으로 포함되어 실시될 필요가 있음을 나타내고 있다.

性病管理에서 제일 중요한 것은 感染源의 파악과 이에 대한 적절한 조치라고 할 수 있을 것이다. 성병감염 당시의 감염원으로 생각되는 相對女性은 윤락여성 및 콜걸이 주류를 이루고 있어 1990년 임 등의 조사결과와 비슷하였다.

政府에서는 성병감염 高危險集團의 성병관리를 위해 관할 保健所에서는 이들을 登錄시켜 集中管理를 하도록 하고 있는데, 정부의 성병 管理體系上에 문제가 있는 점을 아울러 지적할 수 있다.

성병 및 AIDS의 직접적인 豫防方法은 콘돔이라고 볼 수 있는데, 성병감염 당시의 콘돔사용률을 보면 勤勞者에서 84.8%, 大學生에서 87.9%가 콘돔을 사용하지 않았으며, 근로자에서는 부적절하게 사용한 경우도 7.3%가 되는 것으로 나타났다. 이와같은 결과는 婚前 性接觸이 성병감염이나 상대여성의 姙娠 가능성에 대해 無防備한 상태에서 이루어지고 있는 경우가 많으며, 이로 인해 파생된 社會的, 倫理的 문제와 이들의 性病 및 AIDS 차원에서 生殖保健側面의 위협이 매우 높을 수 있음을 시사하고 있다.

6. 性行爲에 影響을 미치는 要因

가. 硏究結果 특기할만한 부분은 술과 성경험과의 관계이다. 二變量 로지스틱 分析에서 술은 전체 성경험을 높이는 것으로 나타났지만, 多變量 分析에서는 술과 感覺的 性向과의 相互作用(interaction)이 중

요하게 나타나서 이러한 상호관계를 고려한 分析이 시도되었다. 感覺的 性向이 높은 사람이 술을 마셨을 경우 1.4배 정도 성경험의 가능성이 높아지는 것으로 분석되었고, 그러한 性向이 낮은 사람의 경우에는 술의 섭취가 별 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이는 술의 섭취가 感覺的 성향이 높은 사람의 경우 중요한 觸媒 역할을 하는 것으로 볼 수 있다. 다른 한편으로는 술의 섭취는 술이 성관계에 대한 期待 心理를 유발시켜 性關係를 가질 가능성을 높이는 것으로 보인다.

나. 勤勞者에서 윤락여성과의 성경험은 軍隊 經驗이 영향을 미치는 것으로 나타났는데 이는 일반 여성과의 性關係를 가질 수 있는 기회가 줄어들어 軍隊 周邊의 윤락여성과 성관계를 가질 可能性이 있는 것으로 볼 수 있고, 다른 한편으로는 군대내에서 同僚의 壓力에 의하여 윤락여성을 찾는 기회가 提供되기 때문인 것으로도 여겨진다. 데이트 상대가 있을 경우 윤락여성과의 性經驗 가능성이 줄어드는 것으로 나타나 일반 여성과 윤락여성간의 성에 있어서 代替 可能性을 제시하는 것으로 볼 수 있다.

勤勞者에서 담배와 술이 윤락여성과의 성행태에 있어서는 중요하지 않게 나타난 것은 근로자들 사이에 淪落女性과의 性經驗이 一般化되어 있어 向精神性 물질인 술이나 담배의 도움이 필요하지 않는 것으로 볼 수 있다.

다. 大學生의 경우에는 데이트 상대가 있느냐 여부가 윤락여성과의 性經驗에 주는 影響力이 미약하였는데, 이는 대학생의 경우 윤락여성이 일반 여성을 대체하는 役割을 수행하지 못하는 것으로 解析할 수 있다. 다시 말해서, 대학생의 경우 일반적으로 여자 친구나 애인과의 性經驗을 지향하고 있기 때문에, 淪落女性과의 性經驗與否에 상관없이 機會가 주어진다면 일반여성과의 성경험을 가지는 것으로 추측해 볼 수 있다. 이러한 추측에 대한 間接的인 證據로는 근로자의 경우

와는 달리 대학생에서는 윤락여성과의 성경험시 술의 효과(藥物的 效果)와 술에 대한 期待感(心理的 效果)이 중요한 역할을 하는 것을 들 수 있다.

라. 年齡이 높을수록 여자 친구와의 性經驗이 높아지는 것으로 나타났으며, 근로자에서는 軍隊經驗이나 收入의 영향력은 중요하지 않은 것으로 나타났다. 이는 군대경험이 윤락여성과의 性行爲에 중요한 影響을 주고 있는 앞의 結果와 비교할 때 有意할 점이라고 볼 수 있다. 이러한 결과는 軍服務 동안 윤락여성과의 성경험은 가질 수 있어도 여자친구와의 성경험을 하는 機會는 별로 주어지지 않기 때문에 나타난 결과로 해석할 수 있다. 大學生에서는 여자친구와의 성관계에서 술의 影響力이 중요하지 않았는데 이는 근로자들의 경우 윤락여성과의 性經驗에 술의 도움이 필요 없었던 것처럼 대학생들은 여자친구와의 性行爲를 술이 없어도 할 수 있는 보다 普遍的인 성행태라고 해석되어진다.

마. 勤勞者들의 성경험과 성병경험률이 대학생보다 높은 것은 근로자들의 成長過程에서 성경험에 대한 敎育과 統制가 잘 이루어지고 있지 않다고 볼 수 있으며, 性經驗이 주로 성병을 쉽게 感染시킬 수 있는 위험집단과 이루어지고 있다는 데에 有意해야 할 것이다.

바. 젊은이들의 性欲求에 영향을 줄 수 있는 變數는 여러가지가 있겠으나 크게 본인의 타고난 性向과 事物과 狀況에 대한 認識能力, 成長過程에서 받는 여러가지 社會的 影響力 등을 들 수 있다. 근로자들의 타고난 성향이 더 自由奔放한가에 대해서는 언급이 어려우나, 근로자들의 경우 性經驗에 대하여 부모의 影響力이 중요하지 않은 것으로 나타나 부모와의 對話와 사랑 등 부모와의 相互作用이 성경험에 影響을 주었던 대학생들의 경우와 對照를 보이고 있다. 이러한 결과는 부모들 스스로가 성에 대한 規範이나 知識의 不足으로 인하여 確固한 指針을 가지고 있지 않거나 經濟 事情 등 여러가지 環境

的인 여건으로 인하여 子息들과 對話할 시간이 많지 않았던 것이 주요 이유가 될 수 있을 것이다. 前者의 경우에는 性敎育의 대상에 자녀들 뿐만 아니라 父母도 包含이 되어야 할 것이며, 부모의 영향력은 性敎育은 물론 친구의 選擇과 學業에도 영향을 주게 되므로 자녀의 成長過程 전반에 걸쳐 올바른 지도와 적절한 관여가 이루어질 수 있도록 자녀 養育에 대한 敎育이 필요할 것으로 본다. 後者의 경우에는 國家나 地方自治 단체의 저소득층에 대한 福祉政策이 강화되어 부모와의 만남의 시간을 좀 더 意味있게 가질 수 있도록 지원프로그램이 제공되어야 할 것으로 본다.

적절한 性敎育이 없이 成長한 근로 靑少年들이 군복무 시절에 동료나 고참으로부터 윤락여성과 성관계를 갖는 것을 無分別하게 배우거나 혹은 군복무와는 상관없이 동료들과 어울리면서 集團的으로 淪落女性들을 찾아갈 가능성이 있음을 연구의 결과로부터 유추해 볼 수 있다.

아. 대학생들에게 있어서도 父母의 性經驗에 대한 影響力은 윤락여성과의 성경험에 국한되고 있어 淪落女性이 아닌 여성과의 婚前 性經驗에 대해서는 무관심하거나 許容하는 態度를 보이고 있다고 볼 수 있는데, 이는 혼전 성경험이 가져올 수 있는 姙娠 등 여러가지 副作用을 낳을 소지를 갖는다고 볼 수 있다. 특히 우리나라의 경우 高等學校 시절까지는 부모의 監督과 指導가 철저하지만 대학에 들어간 후에는 거의 모든 것을 自律에 맡기는 경향이 있으므로 학업에 관심이 없는 집단은 硏究結果에서 언급하였듯이 우연히 만난 여자들과 성관계를 갖는 등 亂雜한 性行態를 가질 可能性이 있는 반면, 學窓生活에 적응해 나가는 그룹은 學年이 올라갈수록 여자친구를 사귀고 성관계를 갖는 것을 先輩와 同僚를 통하여 습득하게 되는 것으로 보인다.

第 3 節 政策建議

본 절에서는 미혼남성의 健全한 성행태를 誘導하기 위한 社會的인 介入方案 내지 支援對策에 관하여 1차적인 예방을 위한 性敎育次元과 성병의 感染豫防을 위한 早期 診斷 및 성병의 적절한 치료차원으로 나누어 政策推進方向을 제시하고자 한다.

1. 婚前 性行態 改善策

가. 性敎育의 强化

1) 學校 및 職場에서의 體系的인 性敎育 實施

지금까지의 학교 및 직장에서 실시되고 있는 성교육은 극히 短篇的이고 一時的이면서도 학교교육의 일부분으로 定立되지 못하고 있는 것으로 평가되고 있다. 그러나 근로자와 대학생들의 성지식 習得媒體가 대부분 대중매체나 친구로서 不正確한 성지식 습득으로 인하여 파생되는 副作用을 배제할 수 없다는 점을 감안할 때 직장이나 학교에서의 基本的인 性敎育의 필요성은 높다고 볼 수 있다. 성에 관련된 지식을 근로자와 대학생들의 絶對多數가 요구하고 있고 性相談에 대한 요구도도 상당수준에 이르고 있음을 볼 때 청소년, 미혼 청·장년들에게 올바른 性知識을 습득시키기 위하여 학교 및 직장에서의 體系的이고 具體的인 성교육이 保健敎育次元에서 실시될 수 있도록 性敎育 도입을 제도화되어야 하겠다. 즉 一定規模 이상의 미혼 근로자를 雇傭하는 모든 事業體와 중·고등학교, 대학에서는 일정시간의 정기적 성교육을 보건교육프로그램에 포함시켜 이행을 義務化시키고, 중앙관련 기관에서는 專門的인 교육프로그램 및 敎育資料와 敎育技術의 개발보급, 일선 기업체 및 학교의 敎育擔當者에 대한 訓練을 담당하도록 성교육 체제를 整備해야 한다.

專門的인 교육프로그램 및 교육자료의 개발보급과 교육담당자에 대한 교육훈련은 그동안 청소년의 성교육프로그램 및 敎育資料의 開發과 청소년 性敎育, 성상담 전문가를 육성하고 있는 大韓家族計劃協會에 위임하여 운영토록 하고 학교교육은 협회가 교육부 및 관련연구기관과의 유기적인 협력체제를 가지고 靑少年 性敎育 프로그램을 개발, 지원하도록 해야 할 것이다.

2) 學校에서의 性敎育 實施를 위한 養護敎師 活用方案

學校保健法에 의하면 초·중·고등학교에 양호교사를 배치하여 학생의 건강관리를 담당하도록 명시되어 있다. 또한 이들 양호교사의 職務 중에는 교사의 保健敎育에 관한 協助와 필요시의 보건교육을 擔當하도록 되어 있으나, 이들은 성 및 보건교육을 위해 專門的으로 養成되지 않았기 때문에 보건교육을 실시하는 데는 限界가 있는 것이다.

그러므로 이들 養護敎師에게 일정기간 동안 성 및 보건교육에 관한 硏修敎育을 시킨 후 학교에서의 보건교육을 담당하도록 하는 방안이 고려될 수 있을 것이다.

3) 軍部隊에서 服務中인 士兵들에 대한 性敎育의 實施

性的欲求가 强한 시기에 행동의 制約을 받으면서 생활하고 있는 군인들은 그들의 성적욕구 解消對象이 주로 주변의 윤락여성이라고 볼 수 있어 성병 및 AIDS 감염위험에 露出되어 있는 상태라고 할 수 있다. 본 조사결과에서 윤락여성과의 性交經驗率이 군복무를 마친 자가 軍未畢者에 비해 월등하게 높고 성병감염 경험률도 역시 높게 나타나 이를 證明해 주고 있다. 따라서 지금까지 放置되어온 군인들의 성교육에 대하여 再考가 있어야 하겠다. 군인들에 대한 성 및 성병예방 敎育方法으로는 이들이 성병과 AIDS에 대해서 손쉽게 지식을 습득할 수 있는 冊子를 만들어 보급하는 방안과 성교육 專門要員을 투입하여 敎育시키는 방안이 고려될 수 있을 것이다.

4) 婚前 靑壯年에 대한 持續的인 性敎育과 避妊敎育의 實施

본 연구에서 미혼남성들의 性經驗 대상은 매우 多樣한 편이며, 성교시 避妊使用을 제대로 하지 않는 점을 볼 때 이들이 性病 및 AIDS 感染에 露出되어 있을 뿐 아니라 임신의 可能性이 높다고 할 수 있다. 結婚前 임신은 그 대부분이 人工姙娠中絶로 처리되고 있으며, 일부는 出産으로 인한 미혼모 발생을 초래한다는 점에서 개인의 生殖保健上의 문제 이외에도 심각한 社會問題를 야기시키는 주요인이 되고 있다. 따라서 靑少年 및 婚前 靑壯年 남성들에게 콘돔사용에 관한 弘報와 啓蒙이 보다 적극적으로 실시되어야 하며, 이들 집단의 성행위에 영향을 미치는 價値體系의 전환을 위한 다각적인 社會敎育機會를 통한 性敎育의 强化가 요청된다.

5) 民間機關을 활용한 성교육의 효율화와 성교육 방법상의 技術的인 接近 필요

본 연구결과에서 나타난 바와 같이 性的慾望의 절제는 부모의 역할이 큰 것으로 볼 수 있다. 문제는 부모가 敎育을 할 能力을 가지고 있지 않거나 혹은 자녀들과의 만남이 쉽지 않을 경우 발생하는데 實質的으로 性倫理에 대해서는 保健當局의 관여는 제한될 수 밖에 없으므로 民間團體나 宗敎機關 등 사회교육을 맡을 수 있는 단체가 性的인 倫理를 확립하는데 관여하도록 하여야 할 것으로 본다. 즉 윤리적인 측면은 民間團體 등의 활용과 社會敎育機會를 통하여 성윤리를 강화하며, 實質的이고 醫學的인 면은 보건전문가가 맡도록 되어야 할 것이다. 性倫理 측면에 있어 民間團體나 종교기관이 중요한 것은 根本的으로 疾病感染의 위협만으로는 성행태를 절제시키는데 限界가 있고 청소년의 社會文化속에 정착되어야 하기 때문이다. 성교육을 하면 婚前 성행위가 양적으로 증가하는 효과를 나타낼 수도 있으며 性慾이 왕성한 十代로서 성교육을 받지 못한 階層에서는 姙娠과 性病의 발생률이 늘어나는 결과를 초래한다는 外國의 報告는 성교육에 있어서 倫理的인 면이 강조되어야 하는 當爲性이 되고 있다.

父母의 성교육이 청소년 自身들의 성교육과 병행하여 실시되어야 하는데, 이는 兩者에 대한 교육이 성교육의 효과를 極大化할 수 있을 것으로 여겨지기 때문이다. 부모의 性敎育은 자녀와의 對話와 統制, 친구의 選擇, 성행태 등에 영향을 주게 될 것이며 이러한 影響力을 받을 경우 자녀들이 成長하면서 보다 안전하고 健全한 性行爲를 실천할 가능성이 높아지며, 또 다른 친구들에게 성에 대한 節制를 하도록 影響을 줄 수 있게 될 것이다.

性敎育은 매스컴을 통해서도 실시될 수 있는데 이는 많은 사람들에게 문제의 深刻性과 도움을 줄 수 있는 相談電話(hot line) 등을 쉽게 알려줄 수 있기 때문이다. 하지만 다른 여러가지 행태에 있어서도 直接的인 만남과 대화의 影響力이 매우 크기 때문에 앞에서 言及한 직접적인 만남을 통한 個別的인 성교육과 병행이 될 때 보다 큰 成果를 낼 수 있을 것으로 보인다. 또한 性敎育은 매우 민감한 사안이므로 效果的인 성교육 對人技術을 開發 보급시키기 위해서는 心理學者, 青少年 專門家의 共同參與하에 세심한 교육내용과 전달방법이 講究되어야 할 것이다.

나. 青少年의 飮酒를 抑制하기 위한 社會的 規制

술은 연구결과에서 나타난대로 性行態에 있어서 상당히 중요한 影響을 미치고 있다. 아무리 부모로부터 性敎育이 잘 되어 있고, 또 친구들의 대부분이 節制力이 있다고 해도 술은 心理的으로 성에 대한 절제를 弱하게 하며 一定量 이상을 마셨을 경우 藥物效果로 인하여 理性的인 思考能力을 마비시켜 버린다. 따라서 성에 대하여 抑壓당했던 사람일수록 술이 주는 解禁의 효과는 커서 本能에 따라 성관계를 가질 可能性이 많아질 수 있다. 청소년의 술소비를 抑制 혹은 減少시키기 위한 대책을 제시하면 다음과 같다.

1) 租稅政策

주류산업은 農産物을 주원료로 하기 때문에 정부의 농산물수급 政策과 밀접한 관계가 있으며, 酒稅法에 의한 免許事業으로서 조세원으로서의 비중

이 크기 때문에 원료조달 및 生産, 販賣價格 決定, 流通의 전과정에 걸쳐 정부의 주류산업정책에 큰 영향을 받고 있다. 우리나라의 1990년말 개정주세법은 고가주인 위스키와 청주 등의 주세율 인하와 대중주인 소주의 다양한 제법 허용으로 요약될 수 있는데, 이러한 稅率調整은 앞에서 언급한대로 소주와 양주의 소비량을 늘리는데 기여하였고 맥주는 조정 이후 鈍化되었지만 1994년에 들어와 다시 增加趨勢를 보이고 있어서 國民健康次元에서 음주를 줄여나가기 위해서는 稅率을 인상하는 방향으로 再調整할 필요성이 있다고 보여진다.

2) 술의 購入 抑制를 위한 法律 規程(availability and licensing laws)

特定條件下에서만 술을 구입하거나 마실 수 있도록 하는 法律 規程으로 영국의 경우 1914년에 술의 販賣許可制를 실시하였는데 다음 해에 급격한 소비량 減少를 보게 되었다. 이와는 반대로 핀란드의 경우에는 1969년 술에 대한 許可와 統制를 풀어주는 법을 통과시킨 결과 술을 파는 商店의 증가, 술을 파는 레스토랑의 증가, 술을 판매하는 시간의 연장, 술을 살 수 있는 年齡制限이 낮아지고, 술을 파는 카페와 상점이 새로 개점되어 이 정책의 결과로 술 소비량은 47%나 증가하였다(WHO, 1990). 미국에서도 일부지역에서는 수퍼에서 酒類販賣를 금지하고 있다. 우리나라의 酒類産業은 生産에 있어서 許可制이나 최근 주류도매면허와 주류시장개방, 희석식 소주의 製造免許 개방 등의 改編으로 술의 생산과 販賣가 促進되는 방향으로 나아가고 있다. 최근에는 20대 초반의 젊은이들이나 혹은 여성전용 술집도 등장하여 青少年들과 女性들의 술소비를 조장하고 있다. 술의 消費에 있어 법적인 통제의 중요성은 1993년 酒類市場이 營業時間 制限, 飮酒運轉 團束 等으로 인해 부진했었던 점을 볼 때 쉽게 認識되어질 수 있다. 따라서 술 판매의 許可를 좀 더 엄격하게 해야 하며 특히 食堂이나 수퍼 등 居住地 地域의 販賣許可基準을 강화하여 청소년과 여성들이 早期에 술을 접촉하지 않도록 飮酒制限을 위한 조치가 마련되어야 할 것이다.

3) 술의 廣告 規制

술을 생산하는 企業들이 광고에 투입되는 財源을 볼 때 실제적인 광고의 효과는 크다고 보여진다. 술의 新商品 개발과 광고, 소비는 하나의 맞물려 돌아가는 톱니바퀴와 같다. 현재 주류회사에서는 TV광고와 新聞에서의 廣告를 통하여 勞動生産性과 可能性이 무한한 젊은 세대에게 음주를 하는 것이 사회적인 위치를 높이거나 혹은 당연히 배워야 할 行動(Social Modeling)인 것처럼 誤導하고 있고, 반면 술이 미치는 癌, 心臟病, 간질환, 交通事故, 精神疾患, 家庭暴力, 저체중 新生兒 等 삶의 전반에 걸친 악영향을 감추는 광고를 하고 있는 점은 止揚되어야 할 것이다. 세계적으로 음주 제한 조치의 필요성이 대두되고 있는 가운데 미국은 1988년부터 주(State)에 따라 술병포장의 경고문구 표시를 의무화하고 있음을 참고로 할수 있을 것이다. 1994년 현재 제시된 시안에서도 주류판매용 용기에 過多한 飮酒가 健康에 해롭다는 내용이 명확하게 표현된 警告文句를 표시하는 사항을 담고 있는 사항이 포함되어 있음을 볼 때 이 부분이 立法化되고, 청소년 음주의 절제에 대한 社會的인 지지를 끌어낼 수 있는 戰略이 개발되어야 하겠다.

4) 기타 靑少年 飮酒節制를 위한 對策

실제적인 면에 있어 廣告, 價格, 라이센스에 대한 複合的 統制와 더불어 소비자에 대한 健康敎育이 또한 절실히 요구되어지는데, 이는 공급에 대한 통제보다 效果的인 政策이기 때문이다. 이외에도 公共場所나 운동장, 패스트 푸드 및 커피 판매점에서의 주류판매금지조치와 禁酒캠페인을 위한 소비자 및 民間團體의 活動支援策 등이 講究되어야 한다.

다. 靑少年의 吸煙規制를 위한 國民健康增進法 制定 時急

본 연구결과 吸煙은 미혼남성들의 性經驗에 상당히 영향을 미치고 있는 것으로 나타났으며, 이미 밝혀진 바와 같이 흡연은 건강에 대하여 가장 크고 심각한 影響을 미치는 危險要因으로 알려져 先進國들에서는 국가적인

차원에서의 종합적인 禁煙對策으로 吸煙規制를 위한 강력한 立法措置와 함께 정부차원의 금연을 위한 凡國民 運動을 전개하고 있다.

정부는 미성년자에 대한 담배판매를 禁止하고 담배자판기를 없애는 내용이 포함된 國民健康增進法案을 1994년 8월에 입법예고를 하였다. 청소년은 물론 국민건강을 위하여 국민건강증진법 제정이 매우 시급한 當面課題가 되고 있다.

라. 淪落需要의 減少를 위한 社會的 施策必要

婚前 성행태를 줄이기 위해서는 근로자들이나 대학생과 같은 需要者들뿐만 아니라 성의 상대 역할을 하는 여성에 대한 政策 역시 중요하다. 실질적인 면에서 婚前 성행태를 건전하게 誘導하기 위해서는 성상대자에 대한 검토가 이루어져야만이 敎育이나 술의 抑制政策 또한 現實的인 효과를 볼 수 있다. 다시 말하면 교육이나 술의 억제를 통한 性의 抑制는 성이 生物學的인 자연스러운 현상임을 감안할 때 한계가 있으며, 成年이 되면 이러한 性的인 욕구를 해소할 수 있는 政策的인 배려가 필요하다고 본다.

세계적으로 사회경제의 발달에 따라 賣春이 퇴조되고 있다. 이는 여성의 다른 취업 기회들이 제공됨으로써 매춘에 대한 女子의 供給도 줄어들었기 때문이며, 또 다른 이유는 中産層이 건전한 結婚觀으로 이동함에 따라 매춘의 需要가 下層階級쪽으로 이동하였기 때문이다.

사회정책적으로 早期 결혼을 장려하고 기혼자들의 婚外情事를 엄격하게 처벌하여서, 기혼 남성들이 미혼 여성이나 專門化된 윤락여성과 성관계를 가지는 데 대한 心理的·經濟的 負擔을 증가시켜 건전한 性文化 風土를 확보하여야 할 것이다. 또 다른 처방은 經濟的 혹은 여러가지 이유로 인해 여자를 만나거나 결혼이 어려운 주로 사회의 下部階層에 속할 수 있는 그룹에게 직장과 주택에 優先權을 주고 職業敎育을 시켜서 結婚이 가능하도록 社會的價値를 상승시켜 주는 일이다. 이러한 정책은 사회의 上部階層에 있

는 남성들에게는 結婚前이나 결혼 후 여러 여자와 性行爲를 갖는 것을 억제하게 하고, 하부계층에 속하는 여성들을 量的으로 확보시켜 주고 하부계층에 속하는 남성의 가치를 올려 줌으로서 實質的으로 결혼이 가능하도록 해주는 政策인 것이다.

우리나라는 태국과 같은 매춘을 윤락여성으로 제한하고 일반여성을 보호하는 주의에서 미국과 같은 性開放의 시대로 나아가고 있다고 여겨지는데, 미국의 정책은 상당한 副作用을 낳고 있고 또 윤락여성에 대한 需要를 창출시키고 있음을 감안하여야 할 것이다. 性이 점점 開放化되고 있는 현실에서 그 개방은 상층부에 있어서는 早期 結婚으로 이어지도록 社會的 분위기를 조성하고, 하부계층에 있는 남성들을 위해서는 社會的 地位를 향상시킬 수 있는 경제적인 지원책과 함께 未婚女性들의 결혼에 대한 認識을 전환할 수 있는 社會 敎育이 필요하리라고 본다.

2. 性病管理對策

가. 性病早期檢診

1) 未婚男性에 대한 性病檢診의 强化

본 연구의 중요한 결과를 두가지로 나타낸다면 勤勞者에서 뿐만 아니라 대학생 집단에서도 婚前 성경험은 普遍化되어 있다는 사실과 性相對者에서 윤락여성이 큰 比重을 차지하고 있다는 사실이다.

이 두가지 사실에 비추어 미혼근로남성과 대학생에 대한 定期檢診에서 성병검진 항목이 반드시 포함되어야 하겠으며, 우리 사회에서 職場이나 학교 정기검진의 間隔이 2년 이상이 되고, 검진자체가 근로자나 대학생전체를 포함하고 있지 않다는 점을 고려할 때 定期檢診 이외에도 이들의 성병감염에 대한 特別檢診 프로그램이 導入되어 성병의 적절한 치료를 圖謀하고 성병의 전파를 막아야 하며, 특히 AIDS 감염의 차단을 위한 對策으로서도 성

행태 양상에서 상당한 危險可能性을 가진 것으로 나타난 미혼남성들에 대한 성병검진 대책이 强化되어야 한다.

2) 性病檢診서비스의 利用可能性 提高施策

본 연구에서 성병에 감염된 것을 確認한 곳이 병의원이 아니었던 경우가 많으며, 실제 치료도 藥局에서 自覺症狀 출현 후 自家治療를 받는 경우가 많았던 결과에 비추어 볼 때 근로자나 대학생들이 위험한 性行爲에 노출된 후 適期에 성병검진을 받지 못하는 것으로 보인다. 따라서 기존의 保健所나 성병진료센터의 성병검진 프로그램이 보다 잘 알려질 수 있도록 事業體나 학교에 대한 弘報가 적극적으로 이루어져 대상자들에게 傳達되어야 하겠으며, 政府次元에서 工團이나 대학 근처에 성병진료기관을 좀 더 확대 지정하여 보다 쉽고, 早期에 성병검진과 치료를 받을 수 있도록 검진서비스가 강화되어야 한다.

나. 性病 및 AIDS管理體系의 改善

傳染病 豫防法(제8조 제2항), AIDS예방법에 의하여 성병 및 AIDS감염 危險集團의 관리를 위해 성병전담진료기관에서는 이들을 登錄시켜 集中管理(정기검진.치료)를 하도록 規程하고 있다. 그러나 이와 같은 법적 명시에도 불구하고 특수업태부(賣春婦)를 제외한 기타윤락행위집단에 대해서는 성병관리가 철저하게 이행되고 있지 않아 性病 및 AIDS 豫防에 대비한 登錄管理 및 진료체계에 허점이 많다는 것이 지적되고 있다.

근로자 및 대학생들의 2/3이상이 이들 집단으로부터 성병이 감염되었다는 점을 勘案할 때 性病感染危險集團에 대한 관리를 더 한층 强化시켜야 하겠으며 특히 대학생들이나 근로청소년을 주 고객으로 하는 퇴폐영업소에 대한 團束을 강화하여 윤락행위를 根絶시켜야 한다(公衆衛生法 제12조 2항). 또한 淪落行爲等防止法(1994년 8월 입법예고) 개정에 따라 윤락행위

당사자에 대한 처벌이 크게 강화되었다는 것과 他人에게 성병을 감염시킨 자에 대하여는 加重處罰을 받는다는 것을 정부 保健組織網을 통하여 강력하게 주지시켜야 할 것이다. 이러한 관점에서 성교시에는 반드시 콘돔을 사용하는 것이 서로간의 健康을 보호하는데 最善策이라는 것을 兩者 모두에게 주지시키고, 윤락행위 당사자들이 상대 남성에게 콘돔사용을 요구할 수 있는 雰圍氣를 조성하며, 自發的인 콘돔사용을 유도하기 위한 弘報對策等이 具體的으로 수립 시행되어야 할 것이다.

다. AIDS 豫防을 위한 敎育 弘報 强化

근로자, 대학생 모두 성병 및 AIDS 感染에 대해서 두려움을 갖고 있으나 감염경로 및 예방에 대한 知識水準은 낮았다. 한편 이들이 원하는 性敎育 내용 중에서 성병과 AIDS가 제일 많다는 것을 감안할 때 이들에 대한 敎育과 啓蒙이 절실히 요구된다고 하겠다. 이를 위한 敎育方法으로는 성교육에 포함시켜 교육시키는 방안과 성병, AIDS의 感染經路 및 예방에 대해서 손쉽게 지식을 습득할 수 있는 冊子를 만들어 보급하는 方案이 고려될 수 있을 것이다.

參 考 文 獻

<국내문헌>

1. 강정원 외, "매춘부와 산부인과 입원환자에 있어서 매독 유병율의 비교관찰", 대한산부인과학회지, 31권 9호, 1988.

2. 강준상, "중고교 학생의 성에 대한 태도", 가족계획, 대한가족계획협회, 1971.

3. 공세권 외, 「한국에서의 가족형성과 출산행태」: 1991년 전국출산력 및 가족보건실태조사, 한국보건사회연구원, 1992., p.202.

4. 교육부, "1994학년도 대학편제정원표," 1994.

5. 구본석, 이성교제에 관한 조사연구, 고대교육대학원 석사학위논문, 1975.

6. 국세청, "주요주류 출고실적", 주요주류 출고실적, 1994.

7. 김승권, "한국 미혼남녀의 성행태", 1991년 전국출산력조사 특별분석, 한국보건사회연구원, 1992, pp.11-14.

8. 김한경 외, 한국청소년들의 생식보건에 관한 연구(Ⅰ), 한국인구보건연구원, 1988.

9. 김한경·조항원·박정숙, "산업체 가족계획 및 성교육프로그램 효과 및 전략개발 연구," 대한가족계획협회, 1991.

10. 노동부, 노동력 유동실태조사보고서, 1992년 상반기, p.174.

11. 대한가족계획협회, "대학생의 가족계획 및 성에 대한 태도", 1977.

12. 문화체육부, 1993년 청소년 백서, pp.423-425.

13 보건사회부, 1994년 보험관리과 내부자료.

14 서봉연 외, "순결교육을 위한 기초조사", 중앙의학연구소 조사연구, 제38집, 1965.

15 손명세 외, "특수업태부의 에이즈에 대한 인식과 성행태에 관한 연구", 연세대학교 보건정책 및 관리연구소, 1993.

16 손재형, "주류," 산업동향분석, 제3권, 한국신용평가주식회사, 1993.

17 송건용 외, 1992년 국민건강 및 보건의식행태조사 - 국민건강조사결과 -, 한국보건사회연구원, 1993. p.162.

18 의료보험연합회, 의료보험통계연보, 1990, 1991, 1992.

19. 이기동, "주류," 산업동향분석, 제3권, 한국신용평가주식회사, 1994.

20. 임종권 외, 성병의료보호사업에 관한 연구, 한국보건사회연구원, 1990.

21. 정기원·김만지, 우리나라 입양의 실태분석, 한국보건사회연구원, 1993, p.34, p.94.

22. 조정숙, 고교생의 성교육 필요성에 관한 고찰, 동국대 교육대학원 석사학위논문, 1981.

23. 체육부, 청소년 약물남용실태와 예방, 1989.

24. 통계청, 1990년 경제활동인구연보, p.239.

25. 통계청, 한국의 사회지표, 1993.

26. 팽원순역, 성과 이성, 동아출판사, 1994.

27. 홍문식, 서문희, "미혼근로여성의 인구 및 성에 대한 지식·태도 조사 연구," 한국인구보건연구원, 1984.

<외국문헌>

1. Adolescents and AIDS Edited by R.J. DiClemente, Sage Publications, 1992.

2. Afifi, A.A. and V. Clark, Computer-aided Multivariate Analysis, Lifetime Learning Publications, 1984.

3. Aral, S.O. and K.K. Homes, "Epidemiology of Sexual Behavior and Sexually Transmitted Diseases," in Sexually Transmitted Diseases, Edited by K. K. Holmes et al., McGraw-Hill, 1990.

4. Bandura, A., Social Foundations of Though and Action : A Social Cognitive Theory, Prentice-Hall, Inc., 1986.

5. Baumrind, D., "Familial Antecedents of Adolescent Drug Use: A Developmental Perspective, in Etiology of Drug Abuse: Implications for Prevention, Edited by C.L. Jones and R.J. Battjes, NIDA Research Monograph 56, Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1985.

6. Biglan, A., C. W Metzler, R. Wirt, D Ary, J. Noell, L. Ochs, C. French, and D. Hood, "Social and Behavioral Factors Associated with High-risk Sexual Behavior among Adolescents, Journal of Behavioral Medicine, 13(3): 245-261, 1990.

7. Brooks-Gunn, J., F.F. Furstenberg Jr., "Adolescent Sexual Behavior," American Psychologist, 44(2): 249-257, 1989.

8. Brown, S.A., M.S. Goldman, A. Inn, and L.R. Anderson, "Expectancies of Reinforcement from Alcohol: Their Domain and Relation to Drinking Patterns," Jouranl of Consulting and Clinical Psychology, 48(4): 419-426, 1980.

9. Celentano, D.D., An Evaluation of Alcoholism Prevalence Estimators, Thesis Submitted to the Johns Hopkins University, 1976.

10. Celentano, D.D., K.E. Nelson, S. Suprasert, A. Matanasarawoot, S. Eiumtrakul, S. romyen, S. Tulvatana, S. Kuntolbutra, N. Sirsopana, P. Akarasewi, N. Wright, and C. Theetranont, "Behavioral Risk Factors for Prostitute Use among Northern Thai Men and Association with HIV Infection," Presented in Part at the VIII International Conferende on AIDs, Amsterdam, July 10-24, 1992: 1-30.

11. Chilman, C.S., "Some Psychological Aspects of Adolescent Sexual and Contraceptive Behaviors in A Changing American Society," in School-age Pregnancy and Parenthood: Biosocial Dimensions, Edited by J. B. Lancaster and B. A. Hamburg, New York: Aldine De Gruyter, 1983.

12. Choi, K.H., C.J. Coates, L.D. Hyung, and N. Hearst, "International Travel and AIDs Risk in South Korea," AIDS, 6(12): 1555-1557, 1992.

13. Christopher F.S. and M.W. Roosa, "Factors Affecting Sexual Decisions in the Premarital Relationships of Adolesents and Toung Adults," in Sexuality in Close Relationships, Edited by K. McKinnely and S. Sprecher, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1991.

14. Cooper, M.L., "Alcohol and Increased Behavioral Risk for AIDs," Alcohol Health & Research World, 16(1): 64-72, 1992.

15. Cronbach, L.J., "Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests," Psychometrika, 16: 297-334.

16. Crowe, L.C. and W.H. George, "Alcohol and Human Sexuality: Review and Integration," Psychological Bulletin, 105(3): 374-386, 1989.

17. DiClemente, R.J., "Psychosocial Determinants of Condom Use among Adolescents," in Adolescents and AIDs, Edited by R.J. Diclemente, 1992 Sage Publications.

18. Erikson, E.H., "Identity and the Life Cycle: Selected Paper Part 1", in Psychological Issues, Edited by G. Klein, New York: International Universities Press, 1959.

19. Ewart, C.K., "Changing Dietary Behavior: A Social Action Theory Approach," Clinical Nutrition, 8:9-16.

20. Ewart, C.K., "Social Action Theory for a Public Health Psychology," American Psychologist, 46(9): 931-946, 1991.

21. Grant, M., "National and International Approaches: Strengthening the Links," in Alcohol Policies, WHO Regional Publications, European Series No.18, 1985.

22. Green, L.W. and M.W. Kreuter, Health Promotion Planning, Second Edition, Mayfield Publishing Company, 1991.

23. Havighurst, R.J., Developmental Tasks and Education, 2nd Edition, New York: David McKay, 1952.

24. Hofferth, S.L. and C.D. Hayes, Risking the Future: Adolescent Sexuality, Pregnancy, and Childbearing, Volume II, 1987, Washington, D.C.: National Academy Press.

25. Horvath, P. and M. Zuckerman, "Sensation Seeking, Risk Appraisal, and Risky Behavior," Person. individ. Diff., 14(1): 41-52, 1993.

26. Hosmer, D.W., Jr. and S. Lemeshow, Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, 1989.

27. Jessor, R. and S.L. Jessor, Problem Behavior and Psychosocial Development: A Longitudinal Study of Youth, 1977, New York: Academic Press.

28. Jessor, S.L. and R. Jessor, "Transition from Virginity to Nonvirginity among Youth: A Social-psychology Study over Time," Developmental Psychology, 11(4): 473-484, 1975.

29. Kellam, S.G., C.H. Brown, B.R. Rubin, and M.E. Ensminger, "Paths Leading to Teeage Psychiatric Symptoms and Substance Use: Developmental Epidemiologic Studies in Woodlawn, in Childhood Psychopathology and Development, Edited by S. B. Guze and F.J. Earls, and J.E. Barrett, New York: Raven Press, 1983.

30. Leigh, B.C., "Beliefs about the Effects of Alcohol on Self and Others," Journal of Studies on Alcohol, 48(5): 467-475, 1987.

31. Leigh, B.C., "In Search of the Seven Dwarves: Issues of Measurement and Meaning in Alcohol Expectancy Research," Psychological Bulletin, 105(3): 361-373, 1989.

32. Leigh, B.C., "The Relationship of Sex-related Alcohol Expectancies to Alcohol Consumption and Sexual Behavior," British Journal of Addiction, 85:919-928, 1990.

33. Longitudinal Study of Youth, New York: Academic Press, 1977.

34. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, "Alcohol and AIDs," Alcohol Alert, 15(PH 311):1-4, 1992.

35. Newcomb, M.D. and P.M. Bentler, Consequences of Adolescent Drug Use: Impact on the Lives of Young Adults, Sage Publications, 1988.

36. Nunnally, J.C., Psychometric Theory, New York: McGraw-Hill, 1967.

37. Patterson, G.R., B.D. DeBaryshe, and E.Ramsey, "A Developmental Perspective on Antisocial Behavior," American Psychologist, 44(2): 329-335, 1989.

38. Patterson, G.R. and M. Stouthamer-Loeber, "The Correlation of Family Management Practices and Delinquency," Child Development, 55:1299-1307, 1990.

39. Plummer, F.A. and E.N. Ngugi, "Prostitutes and Their Clients in the Epidemiology and Control of Sexually Transmitted Diseases," AIDs and Sex: An Integrated Biomedical and Biobehavioral Approach, Edited by B. Voeller et al., Oxford University Press, 1990.

40. Polich, J.M. and B.R. Orvis, Alcohol Problems: Patterns and Prevalence in the U.S. Air Force, A Project Air Force Report Prepared for the United States Air Force, 1979.

41. Ross, M.W., "Psychovenereology: Psychological Aspects of AIDs and Other Sexually Transmissible Diseases," in Behavioral Aspects of AIDs, Edited by D.G. Ostrow, Plenum Publishing Corporation, 1990.

42. Samuels, J.F., D. Vlahov, J.C. Anthony, and R.E. Chaisson, "Measurement of HIV Risk Behaviors among Intravenous Drug Users," British Jouranl of Addiction, 1992, 87: 417-428.

43. SAS Institute Inc., SAS/STAT User's Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 1, 1990.

44. SAS Institute Inc., SAS/STAT User's Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 2, 1990.

45. Schwartz, P. and M.R. Gilmore, "Sociological Perspectives on Human Sexuality," in Sexually Transmitted Diseases, Edited by K.K. Holmes et al., McGraw-Hill, 1990.

46. Shafer, M.A., "High Risk Behavior during Adolesence," in AIDs in Children, Adolescents, and Heterosexual Adults. An Interdisciplinary Approach to Prevention, Edited by R.F. Schinazi and A.J. Nahmias, New York: Elsevier, 1988.

47. Steele, C.M. and L. Southwick, "Alcohol and Social Behavior I: The Psychology of Drunken Excess," Journal of Personality and Social Psycholgy, 48(1):18-34, 1985.

48. Upchurch, D.M., P. Ray, C.A. Reichart, D. D. Celentano, T. Quinn, and E.W. Hook Ⅲ, "Prevalence and Patterns of Condom Use among Patients Attending A Sexually Transmitted Disease Clinic," Sexually Transmitted Diseases, 19(3): 175-180, 1992.

49. Vlahov, D., P. Ray, C.A. Reichart, D.D. Celentano, T. Quinn, and E.W. Hook Ⅲ, "Prevalence and Patterns of Condom Use among Patients Attending A Sexually Transmitted Disease Clinic," Sexually Transmitted Diseases, 19(3): 175-180, 1992.

50. Walsh, B.M., "Production of and International Trade in Alcoholic Drinks: Possible Public Health Implications," in Alcohol Policies, WHO Regional Publications, European Series No.18, 1985.

51. WHO, Reproductive Health in Adolescence, position paper, MCH, Division of Family Health, Geneva, Switzerland, 1986.

52. WHO, The Reproductive Health of Adolescents: Astrategy for action, Geneva, 1989.

53. WHO Regional Office for Europe Copenhagen, Management of Drinking Problems, WHO Regional Publications, European Series, No.32, 1990.

54. Woods, S.C. and J.G. Mansfield, "Ethanol and Disinhibition: Physiological and Behavioral Links," in Alcohol and Disinhibition: Nature and Meaning of the Link, Edited by R. Room and G. Collins, NIAAA Research Monograph, No.12, Department of Health and Human Services, 1981.

55. Zuckerman, M., Abbreviated Manual with Scoring Keys and Forms for Form V of the Sensation Seeking Scale, 1979.

56. Zuckerman, M. and R.N. Bone, "What is the Sensation Seeker?" Journal of Consulting and Clinical Psychology, 39(2): 308-321, 1972.

附　　錄

1. 未婚 男性勤勞者 調査票

2. 未婚 男子大學生 調査票

미혼 남성근로자의 건강 및 성에 관한 조사

1 9 9 3

< 인 사 말 씀 >

국가 산업발전을 위하여 얼마나 수고가 많으십니까? 여러분의 노고를 치하드립니다.

저희 연구원에서는 여러분의 건강과 성교육을 위한 대책의 수립과 홍보 교육자료의 개발을 위하여 조사를 실시하게 되었습니다. 본 질문서는 이를 위한 대책을 마련하기 위하여 여러분의 귀중한 의견을 수집하여 반영하고자 하오니 바쁘시더라도 성의껏 응답하여 주십시오.

이 조사표에서 묻는 질문에는 옳고 그른 답이 있는 것이 아니오니 **평소 느끼고 생각하시는 대로, 빠짐없이, 솔직하고 정확하게 응답해 주시기 바랍니다.**

여러분이 응답해 주신 설문서는 **컴퓨터에 의해 통계적으로 처리되므로 개개인의 비밀이 절대 보장**될 뿐만 아니라, 여러분 개개인을 나타낼만한 소속 기입과, 성명 등을 일체 기록하지 않기 때문에 일단 제출된 질문서는 누구의 것인지 전혀 알 수가 없습니다. 여러분께서는 안심하시고 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

더위에 건강하시고 무궁한 발전이 있으시기를 기원합니다.

1993. 7.

한국보건사회연구원장

보 건 사 회 부

한 국 보 건 사 회 연 구 원

I. 일반적 사항

※ 다음의 질문에 대하여 해당되는 곳의 □칸에 V표를 하시고 ____칸에는 직접 기재하여 주십시오.

1. 현재 나이는 만으로 몇살입니까?
   만 _____세

2. 학교는 어디까지 다니셨습니까?
   1) □ 무 학
   2) □ 국민학교
   3) □ 중 학 교
   4) □ 고등학교
   5) □ 전문대학
   6) □ 대 학 교
   7) □ 현재 재학중:
      ① □ 중 학 교
      ② □ 고등학교
      ③ □ 전문대학
      ④ □ 대 학 교

3. 당신은 군복무를 마쳤습니까?
   1) □ 마쳤다
   2) □ 마치지 않았다
   3) □ 면제 받았다

4. 당신이 태어나서 가장 오래 사신 곳은 어디입니까?
   1) □ 대도시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전)
   2) □ 중소도시
   3) □ 읍·면지역
   4) □ 기타(어디: _____)

5. 당신은 지금 어디서 살고 계십니까?
   1) □ 부모, 형제가 함께 사는 집
   2) □ 형제자매 집에서
   3) □ 친척집
   4) □ 기숙사
   5) □ 하숙집
   6) □ 자취
   7) □ 기타(어디: _____)

   (* 6번 질문으로 가시오)

   5-1. 하숙이나 자취를 하는 방에서 누구와 함께 살고 있습니까 ?
   1) □ 혼자
   2) □ 형제
   3) □ 자매
   4) □ 여자 친구
   5) □ 남자 친구
   6) □ 기타(누구:_____)

6. 당신은 중·고등학교 시절 부모님을 떠나 다른 곳에서 산 적이 있습니까?
   1) ☐ 따로 산적이 있다
   2) ☐ 따로 산적이 없다 (* 7번 질문으로 가시오)

6-1. 그러면 그때 어디에서 살았습니까?
   1) ☐ 결혼한 형제집에서
   2) ☐ 친척, 친지집에서
   3) ☐ 하숙(자취)집에서
   4) ☐ 기 타(어디:_____)

6-2. 그 시기에 얼마동안 부모님과 떨어져서 살았습니까?
   1) ☐ 6개월 미만
   2) ☐ 6개월-1년 미만
   3) ☐ 1년-2년 미만
   4) ☐ 2년-3년 미만
   5) ☐ 3년 이상

7. 당신의 부모님은 현재 함께 살고 계십니까?
   1) ☐ 두분이 함께 살고 계신다 (* 8번 질문으로 가시오)
   2) ☐ 아버님만 살아 계신다
   3) ☐ 어머님만 살아 계신다
   4) ☐ 두 분 모두 돌아가셨다
   5) ☐ 이혼 또는 별거를 하셨다

7-1. 부모님 두분 또는 어느 한분이 돌아가셨거나 이혼 또는 별거를 하신 경우 그 당시 당신은 몇살이었습니까?
   1) ☐ 아버님은 내나이 ____살 때 돌아가셨다
   2) ☐ 어머님은 내나이 ____살 때 돌아가셨다
   3) ☐ 부모님은 내나이 ____살 때 이혼 또는 별거를 하셨다

8. 현재 당신집의 생활형편은 어느 정도라고 생각하십니까?
   1) ☐ 아주 넉넉한 편이다
   2) ☐ 먹고 살기에 넉넉한 편이다
   3) ☐ 먹고 살 정도이다
   4) ☐ 약간 쪼들리는 편이다
   5) ☐ 아주 쪼들리는 편이다

9. 아버님과 어머님께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

9-1. 아버지
   1) ☐ 무학
   2) ☐ 국민학교
   3) ☐ 중학교
   4) ☐ 고등학교
   5) ☐ 대학 이상
   6) ☐ 모르겠다

9-2. 어머니
   1) ☐ 무학
   2) ☐ 국민학교
   3) ☐ 중학교
   4) ☐ 고등학교
   5) ☐ 대학 이상
   6) ☐ 모르겠다

10. 당신은 현재 직장에서 어떤 일을 하고 계십니까?

현재 하시는 일(구체적으로): _____

11. 지금까지 당신의 직장 근무기간은 전부 합하여 얼마나 됩니까?

약 ___년 ___개월

12. 현 직업에 대해 만족하십니까?

1) ☐ 매우 만족
2) ☐ 만족
3) ☐ 보통
4) ☐ 불만족
5) ☐ 매우 불만족

13. 현재 본인의 월평균 수입(상여금, 기타 수입 포함)은 얼마나 되십니까?

약 _____원

14. 한달동안 실제로 쓰는 월 평균 용돈은 얼마나 됩니까?

약 _____ 원

15. 당신이 받는 월 수입은 다음 중 어디에 <u>가장 많이</u> 쓰고 있습니까?
해당되는 것 하나만 골라 V표 하십시오.

1) ☐ 가족의 생활비 보조
2) ☐ 형제의 학비보조
3) ☐ 자신의 생활비
4) ☐ 자신의 용돈
5) ☐ 저축
6) ☐ 기타(무엇: _____)

16. 당신은 하루에 담배를 어느 정도 피우십니까?

1) ☐ 상황에 따라 조금 핀다(1일 5개피 정도)
2) ☐ 조금 핀다(1일 반갑 정도)
3) ☐ 많이 핀다(1일 1갑 또는 그 이상)
4) ☐ 전에는 피웠으나 현재는 안 피운다
5) ☐ 피우지 못한다

17. 당신은 술을 드십니까?

1) ☐ 마신다
2) ☐ 전혀 마시지 못한다 (* 18번 질문으로 가시오)

17-1. 술을 언제부터 드시게 되었습니까?

약 _____세 때

17-2. 지난 한달동안 몇 회 정도 술을 드셨습니까?

1) ☐ 안마셨다
2) ☐ 1번
3) ☐ 2-3번 정도
4) ☐ 1주일에 1번 정도
5) ☐ 1주일에 2-3번 정도
6) ☐ 거의 매일

17-3. 당신은 술을 마실 때 대개 한번에 어느 정도 드십니까?

1) ☐ 소주 1-2잔(맥주 1병이하) 정도
2) ☐ 2홉소주 반병(맥주 1-2병) 정도
3) ☐ 2홉소주 1병(맥주 3-4병) 정도
4) ☐ 2홉소주 2병정도
5) ☐ 2홉소주 3병정도

17-4. 당신은 술을 마실 때 보통 어느 정도 취하십니까?

1) ☐ 심하게 취한다
2) ☐ 적당히 취한다
3) ☐ 약간 취한다
4) ☐ 취하지 않는 편이다

17-5. 지난 한달 동안 당신이 1차로 간 술집은 주로 어떤 곳이었습니까?

1) ☐ 포장마차
2) ☐ 일반 주점 (식당)
3) ☐ 생맥주집
4) ☐ 접대부가 있는 술집
5) ☐ 룸싸롱
6) ☐ 접대부와 성행위가 가능한 술집
7) ☐ 기타(어느곳:_____)

17-6. 지난 한달 동안 당신이 2,3차로 간 술집은 주로 어떤 곳이었습니까?

1) ☐ 포장마차
2) ☐ 일반 주점 (식당)
3) ☐ 생맥주집
4) ☐ 접대부가 있는 술집
5) ☐ 룸싸롱
6) ☐ 접대부와 성행위가 가능한 술집
7) ☐ 기타(어느곳:_____)
8) ☐ 2,3차로 간 술집이 없다

18. 당신은 지난 한달간 한번 이상 가진 취미활동이나 클럽활동이 있었습니까? 있었다면 어떤 내용이었습니까?

1) ☐ 있었다 (회수:_____회, 활동내용:_____)
2) ☐ 없었다

Ⅱ. 건강 및 성에 관한 사항

※ 다음의 질문은 당신이 받은 성교육과 성에 관한 사항입니다. 해당되는 곳의 □칸에 V표를 하시고 ___칸에는 직접 기재하여 주십시오.

1. 당신은 가정이나 학교, 직장 또는 기타 모임(클럽,교회 등)에서 성교육(가족계획,성병 포함)및 상담을 받아보신 적이 있습니까?
   1-1. 가정 : 1) □ 있다 2) □ 없다
   1-2. 학교 : 1) □ 있다 2) □ 없다
   1-3. 직장 : 1) □ 있다 2) □ 없다
   1-4. 기타 모임 : 1) □ 있다 2) □ 없다
   1-5. 개별 상담 : 1) □ 있다 2) □ 없다

2. 성교육을 받아 보셨다면 어떤 것이었습니까?
   해당되는 곳에 모두 V표 해 주십시오.
   1) □ 슬라이드
   2) □ 비데오
   3) □ 영화
   4) □ 강 연
   5) □ 책자, 팜프렛, 전단 등
   6) □ 성교육을 받은 적이 없다

3. 이제까지 위와 같은 성교육을 몇 회 정도 받으셨습니까?
   1) □ 1회
   2) □ 2-3회
   3) □ 4-5회
   4) □ 6회 이상
   5) □ 성교육을 받은 적이 없다

4. 이제까지 받은 성교육 내용은 대체로 어느 정도 도움이 되었다고 생각하십니까?
   1) □ 아주 도움이 되었다
   2) □ 약간 도움이 되었다
   3) □ 그저 그랬다
   4) □ 별로 도움이 되지 않았다
   5) □ 전혀 도움이 되지 않았다
   6) □ 성교육을 받은 적이 없다

5. 다음 문항중 옳다고 생각되면 "○" 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시 하십시오.
   5-1. ___ 한번의 성교만으로도 임신은 가능하다
   5-2. ___ 인공유산은 산모에게 치명적일 수도 있다
   5-3. ___ 키스를 하면 임신이 될 수 있다

6. 다음 설명에 해당되는 것을 아래 보기에서 골라 그 번호를 쓰십시오.
   6-1. ___ 콘돔, 루우프, 정관수술, 난관수술, 먹는피임약 등
   6-2. ___ 성병예방이나 임신방지를 위하여 성교시 남자가 사용하는 방법
   6-3. ___ 임신(태아)을 병원에서 인위적으로 제거시키는 행위
   6-4. ___ 남자의 성기관중 하나로서 정자(정충)를 생산하는 기능을 가지는 신체의 일부
   6-5. ___ 잠자는 동안 무의식 상태에서 흥분되어 정액이 방출되는 현상

보기: 1. 인공유산	2. 몽정	3. 고환
4. 피임방법	5. 콘돔	

7. 당신은 모든 남녀가 결혼전 순결을 꼭 지켜야 한다고 생각하십니까? 남자의 경우와 여자의 경우를 구분해서 당신의 의견을 해당되는 칸에 V표 해주십시오.

7-1. 남자는?
1) ☐ 반드시 지켜야 한다
2) ☐ 가급적 지켜야 한다
3) ☐ 지키지 않을 수도 있다
4) ☐ 지킬 필요가 없다
5) ☐ 모르겠다

7-2. 여자는?
1) ☐ 반드시 지켜야 한다
2) ☐ 가급적 지켜야 한다
3) ☐ 지키지 않을 수도 있다
4) ☐ 지킬 필요가 없다
5) ☐ 모르겠다

8. 당신은 결혼전 이성(여자)과 성행위(성교)를 갖는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

8-1. 결혼상대자가 아닌 잘 알고 있는 이성과의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까?
1) ☐ 해도 괜찮다
2) ☐ 해서는 안된다

8-2. 결혼 상대자와의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까?
1) ☐ 해도 괜찮다
2) ☐ 해서는 안된다

8-3. 당신은 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까?
1) ☐ 성적욕구 해소를 위해 필요하다고 생각한다.
2) ☐ 자제하는 것이 좋다
3) ☐ 절대로 하지 않는 것이 좋다

9. 일반적으로 미혼남녀가 결혼전 임신을 했다면 그 임신은 어떻게 해야 한다고 생각하십니까? 하나만 골라 V표 해주십시오.
1) ☐ 반드시 낳아야 한다
2) ☐ 아기를 기를 수 있는 경우에만 낳는다
3) ☐ 절대로 낳아서는 안된다
4) ☐ 잘 모르겠다
5) ☐ 기타(어떻게: _____)

10. 만일 당신과 성행위를 가진 여자가 임신을 했다면 어떻게 하시겠습니까?
1) ☐ 인공유산(낙태)을 하도록 한다
2) ☐ 결혼하여 낳도록 한다
3) ☐ 여자의 의사에 맡긴다
4) ☐ 기타(어떻게 : _____)

11. 다음의 피임방법중 당신이 그 방법의 특징이나 사용법을 알고 있는 것에 모두 V표 하십시오.

1) ☐ 먹는 피임약
2) ☐ 콘돔
3) ☐ 루우프
4) ☐ 난관수술
5) ☐ 정관수술
6) ☐ 월경주기법
7) ☐ 질외사정법(성교중절법)
8) ☐ 질좌약
9) ☐ 주사 피임약
10) ☐ 한방약제
11) ☐ 아는 것이 없다 (* 13번 질문으로 가시오)

12. 알고 있는 피임방법들은 주로 누구 또는 어디로부터 알게 되었습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.

1) ☐ 주간지, 월간잡지
2) ☐ 관련 책자
3) ☐ 라디오, TV
4) ☐ 직장교육에서
5) ☐ 학교
6) ☐ 친구
7) ☐ 가족
8) ☐ 의사, 간호사
9) ☐ 가족계획요원
10) ☐ 기타('무엇:_____)
11) ☐ 확실치 않다

13. 당신은 동성간에(남자끼리) 성행위를 하는 것에 대하여 어떻게 생각하십니까?

1) ☐ 매우 찬성한다
2) ☐ 대체로 찬성한다
3) ☐ 그저 그렇다
4) ☐ 대체로 반대한다
5) ☐ 절대로 반대한다

14. 당신은 2인 이상의 남녀가 같이 혼숙(한방에서 잠자는 것)하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?

1) ☐ 매우 찬성한다
2) ☐ 대체로 찬성한다
3) ☐ 그저 그렇다
4) ☐ 대체로 반대한다
5) ☐ 절대로 반대한다

15. 당신은 어디에서 또는 누구로부터 성병에 관한 이야기를 들어보신 적이 있습니까? 가장 많이 들어보신 순서대로 순위를 1,2,3,4,...순으로 ___칸에 기재하십시오.

1) ___ 라디오, TV
2) ___ 신문, 잡지, 인쇄물
3) ___ 보건소, 병의원
4) ___ 가족
5) ___ 친구
6) ___ 학교, 직장
7) ___ 기타(어디:_____)

16. 다음 성병에 관한 글들 중에서 옳다고 생각되면 "○ " 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "∧"로 각각 표시 하십시오.

16-1. ____ 성병에 걸린 사람과 키스하면 걸린다
16-2. ____ 성병은 공중목욕탕이나 공중변소에서 걸릴 수 있다
16-3. ____ 성병에 걸린 어머니가 낳는 아이는 성병에 감염될 수 있다
16-4. ____ 성병도 다른 전염병과 같이 예방주사를 맞으면 감염되지 않는다
16-5. ____ 성병에 한번 걸렸던 사람은 면역이 생겨서 다음에는 걸리지 않는다

17. 어떻게 하면 성병을 예방할 수 있는지 다음 방법중 옳다고 생각되면 "○ " 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시하십시오.

17-1. ____ 성행위(성교)시 콘돔을 사용한다
17-2. ____ 성행위 전후에 항생제를 먹는다
17-3. ____ 성행위후 즉시 소변을 본다
17-4. ____ 성행위후 즉시 성기를 비누로 씻는다
17-5. ____ 성행위 도중 사정을 하지 않는다

※ 다음 질문은 에이즈에 관한 내용입니다.

18. 에이즈(후천성면역결핍증)가 성병이라고 생각하십니까?

1) □ 그렇다　　2) □ 아니다　　3) □ 모르겠다

19. 에이즈를 어떻게 알게 되었습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.

1) □ 신문, 잡지　　6) □ 직장에서 듣고
2) □ 라디오, TV, 비디오　　7) □ 가족으로 부터
3) □ 보건소의 홍보자료　　8) □ 병·의원에서
4) □ 친구, 선후배로 부터　　9) □ 기타(무엇:_____)
5) □ 학교 선생님으로 부터　　10) □ 들은 적이 없다

20. 에이즈는 현대의학으로 치료가 가능하다고 생각하십니까?

1) □ 그렇다　　2) □ 그렇지 않다　　3) □ 모르겠다

21. 다음중 에이즈는 어떻게 감염되는지 옳다고 생각되면 "○ " 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시 하십시오.

21-1. ____ 에이즈에 감염된 대상자와 성행위(성교)를 하면 걸린다
21-2. ____ 에이즈는 감염된 어머니를 통해서 태아에게 감염될 수 있다
21-3. ____ 에이즈에 감염된 사람과 주사기를 공동으로 사용할 때 걸릴 수 있다
21-4. ____ 에이즈에 감염된 사람과 면도기를 공동으로 사용할 때 걸릴 수 있다
21-5. ____ 에이즈에 감염된 혈액 또는 혈액제제를 수혈했을때 걸릴 수 있다
21-6. ____ 에이즈 감염자와 키스를 하면 걸릴 수 있다
21-7. ____ 에이즈 감염자와 술잔을 주고 받으면 걸릴 수 있다
21-8. ____ 에이즈는 공중목욕탕이나 공중변소에서 걸릴 수 있다
21-9. ____ 에이즈 감염자와 같은 직장이나 같은 집에 있을 때 공기로 감염될 수 있다

22. 신체검사나 종합진찰시 또는 개인적으로 에이즈 검사를 받아보신 적이 있습니까?
1) □ 있다 2) □ 없다 (* 23번 질문으로 가시오)

22-1. 어디에서 에이즈 검사를 받으셨습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 해 주십시오.
1) □ 병의원 3) □ 헌혈장소
2) □ 보건소 4) □ 기 타 (어디 :_____)

22-2. 몇 번이나 에이즈 검사를 받으셨습니까?
_____번

23. 당신은 우리나라의 에이즈 문제가 어느 정도 심각하다고 생각하십니까?
1) □ 매우 심각하다 4) □ 전혀 심각하지 않다
2) □ 심각하다 5) □ 모르겠다
3) □ 심각하지 않다

※ 다음 질문은 젊은 남성의 건강과 성에 관한 내용입니다.
빠짐없이 작성하여 주십시오.

24. 당신이 처음 이성과 교제했을때 당신의 나이는 몇살이었습니까?
1) 처음 교제했을때 나이:_____세
2) □ 교제경험이 없다

25. 당신은 여자와 키스를 해본 경험이 있습니까?
1) □ 있다 2) □ 없다

26. 당신은 현재 교제(데이트)중인 여자친구나 결혼 상대자가 있습니까?
1) □ 있다 2) □ 없다

27. 당신은 여자와 성행위를 해 본 경험이 있습니까?
1) □ 있다 2) □ 없다

28. 당신은 성병에 걸려 본 경험이 있습니까?
1) □ 있다 2) □ 없다

29. 당신은 성적 충동이 일어날때 그 욕구를 주로 어떻게 해소하십니까?
가장 많이 하는 방법의 순서대로 순위를 1,2,3,4,...순으로 __칸에 기재하십시오.
1) ___ 이성과 성행위를 한다
2) ___ 자위(수음)를 한다
3) ___ 취미생활에 몰두한다
4) ___ 자기 의지로 참는다
5) ___ 종교적인 힘으로 참는다
6) ___ 운동을 한다
7) ___ 기타(어떤 방법:_____)

30. 당신은 성행위(성교) 경험이 있으십니까?
1) ☐ 있다 2) ☐ 없다 (* 37번 질문으로 가시오)

30-1. 당신은 몇살에 처음 성행위(성교)를 경험하셨습니까?
만 _____세 때

30-2. 처음 성행위 상대자는 누구였습니까?
1) ☐ 결혼을 약속한 여자 8) ☐ 윤락여성(창녀)
2) ☐ 친구, 애인 9) ☐ 콜걸
3) ☐ 친척 10) ☐ 이발소 여종업원
4) ☐ 가정부 11) ☐ 안마시술소 여자
5) ☐ 다방여자 12) ☐ 기타(구체적으로:_____)
6) ☐ 우연히 만난 여자 13) ☐ 모르겠다
7) ☐ 술집 여자

30-3. 첫 성행위를 하기 전에 술을 마셨었습니까?
1) ☐ 술을 마셨다 2) ☐ 안마셨다 3) ☐ 모르겠다

30-4. 첫 성행위를 할때 피임방법을 사용하셨습니까?
1) ☐ 사용하지 않음 3) ☐ 상대여성이 먹는 피임약 복용
2) ☐ 콘돔 사용 4) ☐ 기타 피임방법 사용(방법:_____)

31. 당신은 이제까지 모두 몇 번의 성행위 경험이 있으십니까?
1) ☐ 1회 2) ☐ 2회 3) ☐ 3회 4) ☐ 4회 이상

32. 당신이 마지막(가장 최근)으로 성행위를 가진 것은 언제였습니까?
1) ☐ 어제 5) ☐ 약 1개월 전
2) ☐ 3일 전 6) ☐ 두달 이상 지남
3) ☐ 약 1주 전 7) ☐ 기억하지 못함
4) ☐ 약 2주 전

32-1. 마지막 성행위 대상자는 어떤 사람이었습니까?
1) ☐ 결혼을 약속한 여자 8) ☐ 윤락여성(창녀)
2) ☐ 친구, 애인 9) ☐ 콜걸
3) ☐ 친척 10) ☐ 이발소 여종업원
4) ☐ 가정부 11) ☐ 안마시술소 여자
5) ☐ 다방여자 12) ☐ 기타(누구 :_____)
6) ☐ 우연히 만난 여자 13) ☐ 모르겠다
7) ☐ 술집 여자

32-2. 마지막 성행위를 하기 전에 술을 마셨었습니까?
1) ☐ 술을 마셨다 2) ☐ 안마셨다 3) ☐ 모르겠다

32-3. 마지막 성행위를 할때 피임방법을 사용하셨습니까?
1) ☐ 사용하지 않음 3) ☐ 상대여성이 먹는 피임약 복용
2) ☐ 콘돔 사용 4) ☐ 기타 피임방법 사용(방법:_____)

33. 당신은 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과 성행위를 한 적이 있습니까?
1) ☐ 있다 2) ☐ 없다 (* 37번 질문으로 가시오)

33-1. 윤락여성과 몇살에 처음 성행위(성교)를 경험했습니까?
만 _____ 세때

33-2. 윤락여성과의 처음 성행위는 어떻게 해서 하게 되었습니까?
1) ☐ 혼자 결정해서 자의로
2) ☐ 친구, 아는 사람이 가자고 해서 타의에 의해
3) ☐ 자의반 타의반으로
4) ☐ 기타(무엇:_____)

33-3. 윤락여성과 처음 성행위를 했을 때 몇명이 같이 갔었습니까?
1) ☐ 나 혼자 3) ☐ 3명 이상이 같이
2) ☐ 1-2명이 같이

33-4. 윤락 여성과 처음 성행위를 했을 때 같이 간 사람은 누구였습니까?
1) ☐ 학교 동창 6) ☐ 업무상 관련된 사람
2) ☐ 학교 선배 7) ☐ 직장 동료
3) ☐ 고향 친구 8) ☐ 기 타 (누구 :_____)
4) ☐ 클럽 친구 9) ☐ 나 혼자 갔다
5) ☐ 군대 친구

34. 가장 최근에 (마지막으로)경험한 윤락 여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과의 성행위는 어떻게 해서 하게 되었습니까?
1) ☐ 혼자 결정해서 자의로
2) ☐ 친구, 아는 사람이 가자고 해서 타의에 의해서
3) ☐ 자의반 타의반으로
4) ☐ 기타(무엇:_____)
5) ☐ 1회 윤락여성과 성행위를 했을 뿐이다 (* 35번 질문으로 가시오)

34-1. 마지막으로 경험한 윤락여성과의 성행위시 몇명이 같이 갔습니까?
1) ☐ 나혼자 3) ☐ 3명 이상이 같이
2) ☐ 1-2명이 같이 4) ☐ 기타

34-2. 그 때 같이 간 사람은 누구였습니까?
1) ☐ 학교 동창 6) ☐ 업무상 관련된 사람
2) ☐ 학교 선배 7) ☐ 직장 동료
3) ☐ 고향 친구 8) ☐ 기 타 (누구 :_____)
4) ☐ 클럽 친구 9) ☐ 나 혼자 갔다
5) ☐ 군대 친구

34-3. 그 때 술을 마셨습니까?
1) ☐ 술을 마셨다 2) ☐ 안마셨다 3) ☐ 모르겠다

34-4. 그 때 콘돔을 사용했습니까?
1) ☐ 사용했다 2) ☐ 사용하지 않았다

34-5. 그 때 상대여성이 콘돔사용을 요구했습니까?
1) ☐ 했다 2) ☐ 안했다

35. 지금까지 당신이 성행위를 가진 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등) 은 누구였습니까? 해당되는 문항에 모두 V표 하십시오.

1) ☐ 매춘부
2) ☐ 유흥업소 여자
3) ☐ 술집 여자
4) ☐ 다방 여자
5) ☐ 이발소 여자
6) ☐ 안마시술소 여자
7) ☐ 콜걸
8) ☐ 기 타 (누구: _____)

36. 지금까지 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과 성행위시 어느정도 콘돔을 사용해 보셨습니까?
1) ☐ 전혀 사용하지 않았다
2) ☐ 거의 사용하지 않았다
3) ☐ 가끔 사용했다
4) ☐ 대부분 사용했다
5) ☐ 성교때마다 항상 사용했다

37. 당신은 이성(여자)과 동거한 경험이 있습니까?
1) ☐ 없다 (* 38번 질문으로 가시오)
2) ☐ 있다
3) ☐ 현재 동거중

37-1. 동거하는 이성(여자)과 성행위를 하신 적이 있습니까?
1) ☐ 있다 2) ☐ 없다

37-2. 이성(여자)과의 동거기간은 전부 합해서 얼마 동안이 됩니까?
총 ____년 _____개월

38. 지금까지 당신과 성행위를 가진 상대방 여성이 임신한 적이 있었습니까?
1) ☐ 있었다 2) ☐ 없었다 (* 39번 질문으로 가시오)

38-1. 지금까지 모두 몇 번이나 상대방 여성이 임신을 하였습니까?
_____번

38-2. 그 임신의 결과로 출생한 아이가 있었습니까?
1) ☐ 있었다 2) ☐ 없었다

39. 당신은 성병에 감염된(걸린) 적이 있었습니까? 있다면 몇번이나 걸렸습니까?
1) 있다: _____번 2) ☐ 없다 (* 42번 질문으로 가시오)

40. 마지막 감염된 성병은 언제 걸렸습니까? (한번 걸렸던 사람도 해당됩니다)
1) 19 ___년 ___월 (본인 나이 ___세때)에 걸렸었다
2) ☐ 현재 걸려 있다

40-1. 그 성병은 어떤 종류입니까?
1) ☐ 임질
2) ☐ 매독
3) ☐ 비임균성 요도염
4) ☐ 기타(무엇 :_____)
5) ☐ 모르겠다

40-2. 그 성병은 누구로부터 옮았다고 생각하십니까?
1) ☐ 결혼을 약속한 여자
2) ☐ 친구, 애인
3) ☐ 친척
4) ☐ 가정부
5) ☐ 다방여자
6) ☐ 우연히 만난 여자
7) ☐ 술집 여자
8) ☐ 윤락여성(창녀)
9) ☐ 콜걸
10) ☐ 이발소 여종업원
11) ☐ 안마시술소 여자
12) ☐ 기타(누구 :_____)
13) ☐ 모르겠다

40-3. 그 당시 성행위를 할때 콘돔을 사용했습니까?
1) ☐ 사용하지 않았다
2) ☐ 바르게 사용했다
3) ☐ 사용중 빠졌다
4) ☐ 사용중 터졌다

40-4. 그 당시 성행위 전에 술을 드셨습니까?
1) ☐ 마셨다
2) ☐ 마시지 않았다

40-5. 그 당시 성병에 감염된 것을 어떻게 알게 되었습니까?
1) ☐ 성기에 이상한 증상이 나타나서
2) ☐ 신체검사를 통하여
3) ☐ 병의원에서 검사를 받고 나서
4) ☐ 성행위를 한 상대가 의심스러워 검사를 받고 나서
5) ☐ 성행위 상대자가 검사를 받아 보라고 해서
6) ☐ 기타(어떻게:_____)

40-6. 그 당시 성병을 치료받으러 제일 처음 어느 곳을 가셨습니까?
1) ☐ 약국
2) ☐ 병·의원
3) ☐ 보건소
4) ☐ 기타(어디:_____)
5) ☐ 치료받지 않았다 (* 41번 질문으로 가시오)

40-7. 첫번째 치료받은 곳에서 그 성병은 완전히 치료가 되었습니까?
1) ☐ 그렇다 (* 41번 질문으로 가시오)
2) ☐ 아니다
3) ☐ 모르겠다

40-8. 그당시 당신이 그 성병을 완치한 곳은 어디입니까?

1) ☐ 약국
2) ☐ 병·의원
3) ☐ 보건소
4) ☐ 기타(어디:_____)
5) ☐ 완치되지 않았다

41. 당신은 성병에 걸린후 완치되지 않은 상태에서 성행위를 하신 적이 있습니까?

1) ☐ 있다
2) ☐ 없다

42. 당신은 성행위 전후에 성병예방을 위하여 어떤 조치를 취하신 적이 있었습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.

성행위 전

1) ☐ 아무 조치도 안했다
2) ☐ 항생제를 먹었다
3) ☐ 주사를 맞았다
4) ☐ 콘돔을 사용하였다
5) ☐ 기타(무엇:_____)

성행위 후

1) ☐ 아무 조치도 안했다
2) ☐ 항생제를 먹었다
3) ☐ 주사를 맞았다
4) ☐ 성교후 즉시 소변을 보았다
5) ☐ 성교후 즉시 성기를 비누물로 씻었다
6) ☐ 기 타 (무엇 :_____)

※ 다음 질문에 대하여 당신의 생각을 ☐칸에 V표 하거나 ____칸에 적어 주십시오.

43. 현재 당신이 가지고 있는 가장 큰 고민은 무엇입니까?

1) ☐ 직장(학교)문제
2) ☐ 가정문제
3) ☐ 이성문제
4) ☐ 결혼문제
5) ☐ 장래문제
6) ☐ 기타(무엇:_____)
7) ☐ 고민거리가 없다

44. 당신은 성에 대해서 궁금하거나 알고 싶은 것이 있습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.

1) ☐ 자위행위(수음)
2) ☐ 성적충동(욕구)
3) ☐ 이성교제
4) ☐ 피임방법
5) ☐ 남녀의 생식기능에 관한 것
6) ☐ 성병/에이즈
7) ☐ 기타(구체적으로:_____)
8) ☐ 없다

45. 당신이 가지고 있는 고민이나 성문제에 대하여 상담을 원하십니까?

1) ☐ 매우 원한다
2) ☐ 원한다
3) ☐ 원치 않는다
4) ☐ 고민이 없다

46. 끝으로, 이성문제나 성문제와 관련해서 현재 당신이나 당신의 동료 친구들이 느끼고 있는 문제나 고민거리, 원하는 상담이나 성교육 내용, 정부나 우리 사회에 바라는 의견 등이 있으면 무슨 내용이든간에 숨김없이, 솔직하게 써 주십시오. 도움이 되도록 힘껏 노력하겠습니다.

- 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다 -

※ 기록이 빠진 곳이 있으면 꼭 적어 주시고 봉투에 넣어 봉하신 후 노조사무실이나 담당자에게 제출하여 주십시오.

조사구분	대 학		조사표번호		
2					

미혼 남자 대학생의 건강 및 성에 관한 조사

1 9 9 3

< 인 사 말 씀 >

안녕하십니까?

저희 연구원에서는 대학생의 건강과 성교육을 위한 대책의 수립과 홍보 교육자료의 개발을 위하여 조사를 실시하게 되었습니다. 본 질문서는 이를 위한 대책을 마련하기 위하여 여러분의 귀중한 의견을 수집하여 반영하고자 하오니 바쁘시더라도 성의껏 응답하여 주십시오.

이 조사표에서 묻는 질문에는 옳고 그른 답이 있는 것이 아니오니 평소 느끼고 생각하시는 대로, 빠짐없이, 솔직하고 정확하게 응답해 주시기 바랍니다.

여러분이 응답해 주신 설문서는 컴퓨터에 의해 통계적으로 처리되므로 개개인의 비밀이 절대 보장될 뿐만 아니라, 여러분 개개인을 나타낼만한 소속 대학과, 성명 등을 일체 기록하지 않기 때문에 일단 제출된 질문서는 누구의 것인지 전혀 알 수가 없습니다. 여러분께서는 안심하시고 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

1993. 10.

한국보건사회연구원장

한 국 보 건 사 회 연 구 원

세 계 보 건 기 구 (W.H.O.)

A1-6

조사구분	대 학		조사표번호		
2					

I. 일반적 사항

※ 다음의 질문에 대하여 해당되는 곳의 □칸에 V표를 하시고 ___칸에는 직접 기재하여 주십시오. 모든 문항에 빠짐없이 답해 주시기 바랍니다 (통계처리를 위해서는 생략하는 문항이 없어야 합니다).

1. 현재 나이는 만으로 몇살입니까? 7-8
   만 _____세

2. 현재 전공하고 있는 학과와 학년을 기재해 주십시오. 9-10
   _____ 학과 _____학년

3. 당신은 군복무를 마쳤습니까? 11
   1) □ 사병으로 마쳤다
   2) □ 방위로 마쳤다
   3) □ R.O.T.C.이다
   4) □ 마치지 않았다
   5) □ 면제 받았다

4. 당신이 태어나서 가장 오래 사신 곳은 어디입니까? 12
   1) □ 대도시(서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전)
   2) □ 중·소도시
   3) □ 읍·면지역
   4) □ 기타(어디: _____)

5. 당신은 지금 어디서 살고 계십니까? 13
   1) □ 부모, 형제가 함께 사는 집
   2) □ 형제자매
   3) □ 친척집
   4) □ 기숙사
   (* 6번 질문으로 가시오)
   5) □ 하숙집
   6) □ 자취
   7) □ 기타(어디: _____)

5-1. 하숙이나 자취를 하는 방에서 누구와 함께 살고 있습니까? 14
   1) □ 혼자
   2) □ 형제
   3) □ 자매
   4) □ 여자 친구
   5) □ 남자 친구
   6) □ 기타(누구: _____)

6. 당신은 중·고등학교 시절 부모님을 떠나 다른 곳에서 산 적이 있습니까? 15
   1) □ 따로 산적이 있다
   2) □ 따로 산적이 없다 (* 7번 질문으로 가시오)

6-1. 그러면 그때 어디에서 살았습니까? 16

1) ☐ 결혼한 형제집에서
2) ☐ 친척, 친지집에서
3) ☐ 하숙(자취)집에서
4) ☐ 기 타(어디:_____)

6-2. 그 시기에 얼마동안 부모님과 떨어져서 살았습니까? 17

1) ☐ 6개월 미만
2) ☐ 6개월-1년 미만
3) ☐ 1년-2년 미만
4) ☐ 2년-3년 미만
5) ☐ 3년 이상

7. 당신의 부모님은 현재 함께 살고 계십니까? 18

1) ☐ 두분이 함께 살고 계신다 (* 8번 질문으로 가시오)
2) ☐ 아버님만 살아 계신다
3) ☐ 어머님만 살아 계신다
4) ☐ 두 분 모두 돌아가셨다
5) ☐ 이혼 또는 별거를 하셨다

7-1. 부모님 두분 또는 어느 한분이 돌아가셨거나 이혼 또는 별거를 하신 경우 그 당시 당신은 몇살이었습니까?

1) ☐ 어머님은 내나이 ___살때 돌아가셨다 19-20
2) ☐ 아버님은 내나이 ___살때 돌아가셨다 21-22
3) ☐ 부모님은 내나이 ___살때 이혼 또는 별거를 하셨다 23-24

8. 당신의 성장과정(대학이전)에서 당신이 보고, 듣고, 느낀 부모님의 모습을 생각하는 그대로 해당되는 곳에 V표 하여 주시기 바랍니다. 부모님을 테스트하는 것이 아니므로 부담없이 적어 주시기 바랍니다.

	① 항상 그렇다	② 대부분의경우 그렇다	③ 간혹 그렇다	④ 결코 그렇지 않다	
8-1. 부모님은 화가 나더라도 절제할 줄 아셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	25
8-2. 부모님은 각자 맡은 일에 충실하였다.	①☐	②☐	③☐	④☐	26
8-3. 부모님은 서로를 진실하게 사랑하셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	27
8-4. 부모님은 서로를 기쁘게 하려고 노력하셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	28
8-5. 부모님은 내가 마음먹고 하면 무엇이든지 잘할 수 있다고 믿어주셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	29
8-6. 부모님은 나의 능력보다 지나치게 기대를 하셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	30
8-7. 부모님은 내가 잘하건 못하건 간에 자녀로서 사랑해 주셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	31
8-8. 문제가 있을때 부모님과 함께 해결하였다.	①☐	②☐	③☐	④☐	32
8-9. 나의 여러가지 계획을 부모님과 상의하였다.	①☐	②☐	③☐	④☐	33
8-10. 부모님은 내가 외출할때 내가 어디에 간다는 것을 알고 계셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	34
8-11. 다른 부모님에 비해 우리 부모님은 우리에게 엄하게 대하셨다	①☐	②☐	③☐	④☐	35
8-12. 부모님은 성에 대해 호기심을 갖는 것이 정상적이라고 보셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	36
8-13. TV나 비디오의 선정적인 장면을 보도록 내버려 두셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	37
8-14. 부모님은 가능한한 조기에 성교육이 실시되어야 한다고 믿으셨다.	①☐	②☐	③☐	④☐	38

9. 아버님과 어머님께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 39-40

9-1. 아버지
1) □ 무학
2) □ 국민학교
3) □ 중학교
4) □ 고등학교
5) □ 대학 이상
6) □ 모르겠다

9-2. 어머니
1) □ 무학
2) □ 국민학교
3) □ 중학교
4) □ 고등학교
5) □ 대학 이상
6) □ 모르겠다

10. 부모님께서는 무슨 직업을 갖고 계십니까? 41-42

10-1. 아버지
1) □ 전문직
2) □ 행정·관리직
3) □ 사무·관리직
4) □ 판매·서어비스직
5) □ 농·림·수산업
6) □ 생산·운수·단순노동직
7) □ 기타
8) □ 무직
9) □ 아버님이 안계신다

10-2. 어머니
1) □ 전문직
2) □ 행정·관리직
3) □ 사무·관리직
4) □ 판매·서어비스직
5) □ 농·림·수산업
6) □ 생산·운수·단순노동직
7) □ 기타
8) □ 주부
9) □ 어머님이 안계신다

11. 현재 당신집의 생활형편은 어느 정도라고 생각하십니까? 43
1) □ 아주 넉넉한 편이다
2) □ 먹고 살기에 넉넉한 편이다
3) □ 먹고 살 정도이다
4) □ 약간 쪼들리는 편이다
5) □ 아주 쪼들리는 편이다

12. 당신은 현재 학업외에 아르바이트나 직업을 갖고 있습니까? 44
1) □ 있다
2) □ 없다

13. 현재 본인의 용돈 이외에 한달 평균 수입(아르바이트, 장학금 포함)은 얼마나 되십니까? 45-47
약 _____원

14. 현재 본인의 한달 평균 용돈은 얼마나 됩니까? 48-49
약 _____ 원

15. 당신은 하루에 담배를 어느 정도 피우십니까? 50
1) □ 상황에 따라 조금 핀다(1일 5개피 정도)
2) □ 조금 핀다(1일 반갑 정도)
3) □ 많이 핀다(1일 한갑 또는 그이상)
4) □ 전에는 피웠으나 현재는 안 피운다
5) □ 피우지 못한다

16. 당신은 지난 일년간 다음과 같은 약물을 사용해 보신적이 있습니까?

	① 사용한적 없다	② 단한번 사용	③ 1회이상 사용	
16-1. 본드	①□	②□	③□	51
16-2. 부탄가스	①□	②□	③□	52
16-3. 신경안정제	①□	②□	③□	53
16-4. 수면제	①□	②□	③□	54
16-5. 기타	①□	②□	③□	55

17. 당신은 술을 드십니까? 56
1) □ 마신다
2) □ 전혀 마시지 못한다 (* 19번 질문으로 가시오)

17-1. 술을 언제부터 드시게 되었습니까? 57-58
약 _____세 때

17-2. 지난 한달동안 몇 회정도 술을 마셨습니까? 59
1) □ 매일
2) □ 거의 매일
3) □ 일주일에 3-4번
4) □ 일주일에 1-2번
5) □ 지난 한달간 2-3번
6) □ 지난 한달간 1번
7) □ 안마셨다

17-3. 지난 한달동안 술을 마실때 대개 한번에 어느 정도 드셨습니까? 60
1) □ 소주 1-2잔(맥주 1병이하) 정도
2) □ 2홉소주 반병(맥주 1-2병) 정도
3) □ 2홉소주 1병(맥주 3-4병) 정도
4) □ 2홉소주 2병 정도
5) □ 2홉소주 3병 이상

※ 이번에는 지난 1년 동안의 음주량을 생각해 봅시다.

17-4. 지난 일년간 대략 몇번이나 과음(만취하도록)을 하셨습니까? 61
1) □ 일주일에 3-4번
2) □ 일주일에 1-2번
3) □ 한달에 1-2번
4) □ 일년간에 3-6번
5) □ 일년간에 1번
6) □ 지난해에는 한꺼번에 많이 마신 일이 없다 (* 17-6번 질문으로 가시오)

17-5. 지난 일년간 과음했을 경우 대개 한번에 어느 정도 술을 드셨습니까? 62
1) □ 2홉소주 반병(맥주 1-2병) 정도
2) □ 2홉소주 2병(맥주 3-4병) 정도
3) □ 2홉소주 3병정도
4) □ 2홉소주 4-5병정도
5) □ 2홉소주 5병이상

17-6. 술을 마실때 주로 몇명과 함께 어울리는 적이 가장 많습니까? 63
1) □ 혼자서 마신다
2) □ 한 두 사람
3) □ 서 너 사람
4) □ 다섯사람 이상

17-7. 가장 자주 어울리는 술 친구는 누구입니까?(하나만 V표하여 주십시오) 64
1) □ 고등학교 친구
2) □ 대학교 친구
3) □ 대학 선.후배
4) □ 군대 친구
5) □ 기타 (누구: _____)

17-8. 지난 한달 동안 당신이 1차로 간 술집은 주로 어떤 곳이었습니까? 65
1) □ 포장마차
2) □ 일반 주점 (식당)
3) □ 생맥주집
4) □ 접대부가 있는 술집
5) □ 룸싸롱
6) □ 접대부와 성행위가 가능한 술집
7) □ 기타(어느곳:_____)

17-9. 지난 한달 동안 당신이 2,3차로 간 술집은 주로 어떤 곳이었습니까? 66
1) ☐ 포장마차
2) ☐ 일반 주점 (식당)
3) ☐ 생맥주집
4) ☐ 접대부가 있는 술집
5) ☐ 룸싸롱
6) ☐ 접대부와 성행위가 가능한 술집
7) ☐ 기타(어느곳:_____)
8) ☐ 2,3차로 간 술집이 없다

18. 이번에는 술이 당신에게 미치는 심리적 효과에 대하여 알아 보고자 합니다. 술을 마실때 본인이 아래와 같은 효과를 느끼거나 혹은 기대한다면 그 정도를 표시해 주시기 바랍니다. 질문 하나하나가 중요하므로 모든 질문에 빠짐없이 답해 주시기 바랍니다.

술을 어느 정도 마시면, 술은 당신에게 다음과 같은 효과를 줍니까?	① 전혀 그렇지 않다	② 거의 그렇지 않다	③ 조금은 그렇다	④ 상당히 그렇다	
18-1. 이성과 대화하기가 쉽다.	①☐	②☐	③☐	④☐	67
18-2. 부끄러움이 없어진다.	①☐	②☐	③☐	④☐	68
18-3. 다른 사람들을 덜 의식하게 된다.	①☐	②☐	③☐	④☐	69
18-4. 이성과 친근하게 느낀다.	①☐	②☐	③☐	④☐	70
18-5. 성적으로 민감하게 반응한다.	①☐	②☐	③☐	④☐	71
18-6. 섹스에 대한 긴장감을 덜어준다고 생각한다.	①☐	②☐	③☐	④☐	72
18-7. 자신감을 높여준다.	①☐	②☐	③☐	④☐	73
18-8. 성적으로 보다 적극적이 된다.	①☐	②☐	③☐	④☐	74
18-9. 성행위를 하고 싶은 충동이 든다.	①☐	②☐	③☐	④☐	75
18-10. 평소라면 성관계를 갖지 않았을 사람과도 섹스를 하게 될 것 같다.	①☐	②☐	③☐	④☐	76
18-11. 성관계를 보다 즐겁게 한다고 생각한다.	①☐	②☐	③☐	④☐	77
18-12. 성병감염에 대한 염려를 덜어준다.	①☐	②☐	③☐	④☐	78
18-13. 스스로에 대한 통제력을 잃게 된다	①☐	②☐	③☐	④☐	79

19. 당신은 지난 한달간 한 번 이상 가진 취미활동이나 클럽활동이 있었습니까? 80-82
있었다면 어떤 내용이었습니까?
1) ☐ 있었다 (회수:_____회, 활동내용:_____)
2) ☐ 없었다

20. 당신의 대학생활은 어떠합니까? 학업과 친구, 교수님들에 대한 질문에 답변해 주시기 바랍니다.

	① 전혀 그렇지 않다	② 그렇지 않다	③ 그렇다	④ 정말로 그렇다	
20-1. 대학생활은 새로운 것들을 배울 기회를 준다.	①□	②□	③□	④□	B7
20-2. 대부분의 교수님은 학업에 많은 도움을 주신다.	①□	②□	③□	④□	8
20-3. 우리과 학생들은 매사에 상호 협력하는 편이다.	①□	②□	③□	④□	9
20-4. 전반적으로 나의 학업성적은 우수한 편이다.	①□	②□	③□	④□	10
20-5. 나는 다시 기회가 주어져도 현재와 같은 전공을 선택하고 싶다.	①□	②□	③□	④□	11
20-6. 기회가 주어진다면 대학을 옮길 생각이다.	①□	②□	③□	④□	12
20-7. 친구들은 남자는 술을 마실줄 알아야 한다고 생각한다.	①□	②□	③□	④□	13
20-8. 친구들로부터 술을 마시라고 권유 받는 때가 많다.	①□	②□	③□	④□	14
20-9. 친구들은 성숙한 남자라면 성경험이 있어야 된다고 말한다.	①□	②□	③□	④□	15
20-10. 나의 친한 친구중에서 대부분은 성경험을 가지고 있다.	①□	②□	③□	④□	16
20-11. 친구들이 여자가 나오는 술집에 같이 가자고 요구할 때가 있다.	①□	②□	③□	④□	17

Ⅱ. 성행태에 관한 사항

※ 다음의 질문은 당신이 받은 성교육과 성에 관한 사항입니다. 해당되는 곳의 □칸에 V표를 하시고 ___칸에는 직접 기재하여 주십시오.

1. 당신은 가정이나 학교 또는 기타 모임(클럽, 교회 등)에서 성교육(가족계획, 성병 포함)및 상담을 받아보신 적이 있습니까?
   1-1. 가 정 : 1) □ 있다 2) □ 없다 18
   1-2. 학 교 : 1) □ 있다 2) □ 없다 19
   1-3. 기타 모임 : 1) □ 있다 2) □ 없다 20
   1-4. 개별 상담 : 1) □ 있다 2) □ 없다 21
   *22

2. 성교육을 받아 보셨다면 주로 어떤 것이었습니까? 해당되는 곳에 하나만 V표 해 주십시오. 23-27
   1) □ 슬라이드
   2) □ 비데오
   3) □ 영화
   4) □ 강연
   5) □ 책자, 팜프렛, 전단 등
   6) □ 성교육을 받은 적이 없다

3. 이제까지 위와 같은 성교육을 몇 회 정도 받으셨습니까? 28
   1) □ 1회
   2) □ 2-3회
   3) □ 4-5회
   4) □ 6회 이상
   5) □ 성교육을 받은 적이 없다

4. 이제까지 받은 성교육 내용은 대체로 어느 정도 도움이 되었다고 생각하십니까? 29
   1) □ 아주 도움이 되었다
   2) □ 약간 도움이 되었다
   3) □ 그저 그랬다
   4) □ 별로 도움이 되지 않았다
   5) □ 전혀 도움이 되지 않았다
   6) □ 성교육을 받은 적이 없다

5. 다음 문항중 옳다고 생각되면 "○" 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시하십시오.
   5-1. ___ 한번의 성교만으로도 임신은 가능하다 30
   5-2. ___ 인공유산은 산모에게 치명적일 수도 있다 31
   5-3. ___ 키스를 하면 임신이 될 수 있다 32

6. 다음 설명에 해당되는 것을 아래 보기에서 골라 그 번호를 쓰십시오.
   6-1. ___ 콘돔, 루우프, 정관수술, 난관수술, 먹는피임약 등 33
   6-2. ___ 성병예방이나 임신방지를 위하여 성교시 남자가 사용하는 방법 34
   6-3. ___ 임신(태아)을 병원에서 인위적으로 제거시키는 행위 35
   6-4. ___ 남자의 성기관중 하나로서 정자(정충)를 생산하는 기능을 가지는 신체의 일부 36
   6-5. ___ 잠자는 동안 무의식 상태에서 흥분되어 정액이 방출되는 현상 37

보기: ① 인공유산 ② 몽정 ③ 고환 ④ 피임방법 ⑤ 콘돔

7. 당신은 모든 남녀가 결혼전 순결을 꼭 지켜야 한다고 생각하십니까? 남자의 경우와 여자의 경우를 구분해서 당신의 의견을 해당되는 칸에 V표 해주십시오.

7-1. 남자는? 38
1) ☐ 반드시 지켜야 한다 3) ☐ 지키지 않을 수도 있다
2) ☐ 가급적 지켜야 한다 4) ☐ 지킬 필요가 없다

7-2. 여자는? 39
1) ☐ 반드시 지켜야 한다 3) ☐ 지키지 않을 수도 있다
2) ☐ 가급적 지켜야 한다 4) ☐ 지킬 필요가 없다

※ 이번에는 당신 자신의 성에 대한 의견을 피력해 주시기 바랍니다.

8-1. 결혼상대자가 아닌 알고 있는 이성과의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까? 40
1) ☐ 해도 된다 3) ☐ 하지 않는 것이 좋다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 해서는 안된다

8-2. 결혼 상대자와의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까? 41
1) ☐ 해도 된다 3) ☐ 하지 않는 것이 좋다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 해서는 안된다

8-3. 당신은 기회가 주워진다면, 결혼상대자가 아닌 알고 있는 이성과 성행위를 하겠습니까? 42
1) ☐ 하겠다 3) ☐ 하지 않을 것 같다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 안하겠다

8-4. 당신은 결혼전 결혼상대자와 성행위를 하시겠습니까? 43
1) ☐ 하겠다 3) ☐ 하지 않을 것 같다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 안하겠다

8-5. 당신은 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과의 성행위에 대해 어떻게 생각하십니까? 44
1) ☐ 해도 된다 3) ☐ 하지 않는 것이 좋다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 해서는 안된다

8-6. 당신은 친구로부터 유흥업소(접대부가 있는 업소)에 가자는 유혹을 받는다면 거절하실 수 있겠습니까? 45
1) ☐ 하겠다 3) ☐ 하지 않을 것 같다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 안하겠다

8-7. 당신은 윤락여성의 유혹을 받을 경우 성행위를 하시겠습니까? 46
1) ☐ 하겠다 3) ☐ 하지 않을 것 같다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다 4) ☐ 안하겠다

9. 일반적으로 미혼남녀가 결혼전 임신을 했다면 그 임신은 어떻게 해야 한다고 생각하십니까? 하나만 골라 V표 해주십시오. 47
1) ☐ 반드시 낳아야 한다
2) ☐ 여자의 의견을 들어보고 낳는다
3) ☐ 아기를 기를 수 있는 경우에만 낳는다
4) ☐ 절대로 낳아서는 안된다
5) ☐ 기타(어떻게: _____)

10. 만일 당신과 성행위를 가진 여자가 임신을 했다면 어떻게 하시겠습니까? 48
1) ☐ 반드시 낳아야 한다
2) ☐ 여자의 의견을 들어보고 낳는다
3) ☐ 아기를 기를 수 있는 경우에만 낳는다
4) ☐ 절대로 낳아서는 안된다
5) ☐ 기타(어떻게: _____)

11. 당신은 동성간에(남자끼리) 성행위를 하는 것에 대하여 어떻게 생각하십니까? 49
1) ☐ 매우 찬성한다
2) ☐ 대체로 찬성한다
3) ☐ 그저 그렇다
4) ☐ 대체로 반대한다
5) ☐ 절대로 반대한다

12. 당신은 2인 이상의 남녀가 같이 혼숙(한방에서 잠자는 것)하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 50
1) ☐ 매우 찬성한다
2) ☐ 대체로 찬성한다
3) ☐ 그저 그렇다
4) ☐ 대체로 반대한다
5) ☐ 절대로 반대한다

13. 다음의 피임방법중 당신이 그 방법의 특징이나 사용법을 알고 있는 것에 모두 V표 하십시오. 51-60 *61
1) ☐ 먹는 피임약
2) ☐ 콘돔
3) ☐ 루우프
4) ☐ 난관수술
5) ☐ 정관수술
6) ☐ 월경주기법
7) ☐ 질외사정법(성교중절법)
8) ☐ 질좌약
9) ☐ 주사 피임약
10) ☐ 한방약제
11) ☐ 아는 것이 없다(* 15번 질문으로 가시오)

14. 알고 있는 피임방법들은 주로 누구 또는 어디로부터 알게 되었습니까? 62-71 *72
해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.
1) ☐ 주간지, 월간잡지
2) ☐ 관련 책자
3) ☐ 라디오, TV
4) ☐ 직장교육에서
5) ☐ 학교
6) ☐ 친구
7) ☐ 가족
8) ☐ 의사, 간호사
9) ☐ 가족계획요원
10) ☐ 기타(무엇:_____)
11) ☐ 확실치 않다

15. 콘돔이 성병예방에 효과가 있다고 생각하십니까? 73
1) ☐ 매우 효과가 있다
2) ☐ 조금 효과가 있다
3) ☐ 거의 효과가 없다
4) ☐ 전혀 효과가 없다

16. 콘돔을 쓰면 얼마나 쾌감이 줄어든다고 생각하십니까? 74
1) ☐ 많이 준다
2) ☐ 조금 준다
3) ☐ 거의 줄지 않는다
4) ☐ 전혀 줄지 않는다
5) ☐ 모르겠다

17. 콘돔을 쓰면 얼마나 심리적인 정복감이 줄어든다고 생각하십니까? 75
1) ☐ 많이 준다
2) ☐ 조금 준다
3) ☐ 거의 줄지 않는다
4) ☐ 전혀 줄지 않는다
5) ☐ 모르겠다

18. 당신은 상대방 여성으로부터 성병감염의 위험이 있다고 생각할 때 콘돔을 사용하겠다고 제안할 수 있겠습니까? 76
1) ☐ 하겠다
2) ☐ 경우에 따라 할 수도 있다
3) ☐ 하지 않을 것 같다
4) ☐ 안하겠다

※ 다음 질문은 성병과 에이즈에 관한 내용입니다.

19. 당신은 어디에서 또는 누구로부터 성병에 관한 이야기를 들어보신 적이 있습니까? 가장 많이 들어보신 것 하나만 V표 하십시오. 77
1) ☐ 라디오, TV
2) ☐ 신문, 잡지, 인쇄물
3) ☐ 보건소, 병의원
4) ☐ 가족
5) ☐ 친구
6) ☐ 학교
7) ☐ 기타(어디:_____)

20. 다음 성병에 관한 글들 중에서 옳다고 생각되면 "○" 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시하십시오.
20-1. ____ 성병에 걸린 사람과 키스하면 걸린다 C7
20-2. ____ 성병은 공중목욕탕이나 공중변소에서 걸릴 수 있다 8
20-3. ____ 성병에 걸린 어머니가 낳는 아이는 성병에 감염될 수 있다 9
20-4. ____ 성병도 다른 전염병과 같이 예방주사를 맞으면 감염되지 않는다 10
20-5. ____ 성병에 한번 걸렸던 사람은 면역이 생겨서 다음에는 걸리지 않는다 11

21. 어떻게 하면 성병을 예방할 수 있는지 다음 방법 중 옳다고 생각되면 "○" 틀리는 것은 "×" 모르는 것은 "△"로 각각 표시하십시오.
21-1. ____ 성행위(성교)시 콘돔을 사용한다 12
21-2. ____ 성행위 전후에 항생제를 먹는다 13
21-3. ____ 성행위후 즉시 소변을 본다 14
21-4. ____ 성행위후 즉시 성기를 비누로 씻는다 15
21-5. ____ 성행위 도중 사정을 하지 않는다 16

22. 에이즈(후천성면역결핍증)가 성병이라고 생각하십니까? 17
1) ☐ 그렇다
2) ☐ 아니다
3) ☐ 모르겠다

23. 에이즈를 어떻게 알게 되었습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오. 18-25 *26
1) ☐ 신문, 잡지
2) ☐ 라디오, TV, 비디오
3) ☐ 보건소의 홍보자료
4) ☐ 친구, 선후배로부터
5) ☐ 학교 선생님으로부터
6) ☐ 가족으로부터
7) ☐ 병 의원에서
8) ☐ 기타(무엇:_____)
9) ☐ 들은 적이 없다

24. 에이즈는 현대의학으로 치료가 가능하다고 생각하십니까? 27
1) ☐ 그렇다
2) ☐ 그렇지 않다
3) ☐ 모르겠다

25. 다음중 에이즈는 어떻게 감염되는지 옳다고 생각되면 "○" 틀리는 것은 "×", 모르는 것은 "△"로 각각 표시하십시오.
25-1. ____ 에이즈에 감염된 대상자와 성행위(성교)를 하면 걸린다 28
25-2. ____ 에이즈는 감염된 어머니를 통해서 태아에게 감염될 수 있다 29
25-3. ____ 에이즈에 감염된 사람과 주사기를 공동으로 사용할 때 걸릴 수 있다 30
25-4. ____ 에이즈에 감염된 사람과 면도기를 공동으로 사용할 때 걸릴 수 있다 31
25-5. ____ 에이즈에 감염된 혈액 또는 혈액제제를 수혈했을때 걸릴 수 있다 32
25-6. ____ 에이즈 감염자와 키스를 하면 걸릴 수 있다 33
25-7. ____ 에이즈 감염자와 술잔을 주고 받으면 걸릴 수 있다 34
25-8. ____ 에이즈는 공중목욕탕이나 공중변소에서 걸릴 수 있다 35
25-9. ____ 에이즈 감염자와 같은 직장이나 집에 있을 때 공기로 감염될 수 있다 36

26. 신체검사나 종합진찰시 또는 개인적으로 에이즈 검사를 받아보신 적이 있습니까? 37
1) ☐ 있다
2) ☐ 없다 (* 27번 질문으로 가시오)

26-1. 어디에서 에이즈 검사를 받으셨습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 해 주십시요. 38
1) ☐ 병의원
2) ☐ 보건소
3) ☐ 헌혈장소
4) ☐ 예비군 교육

26-2. 몇 번이나 에이즈 검사를 받으셨습니까? 39
_____번

26-3. 당신은 왜 에이즈 검사를 받으셨습니까? 40
1) ☐ 성관계를 가진 상대가 의심스러워서
2) ☐ 스스로가 성적으로 활발하기 때문에
3) ☐ 주위 사람들이 검사를 받기 때문에

27. 당신은 우리나라의 에이즈 문제가 어느 정도 심각하다고 생각하십니까? 41
1) ☐ 매우 심각하다
2) ☐ 심각하다
3) ☐ 심각하지 않다
4) ☐ 전혀 심각하지 않다
5) ☐ 모르겠다

28. 당신은 자신이 에이즈에 감염될 가능성이 있다고 생각하십니까? 42
1) ☐ 가능성이 많다
2) ☐ 가능성이 약간 있다
3) ☐ 가능성이 거의 없다
4) ☐ 가능성이 전혀 없다.
5) ☐ 모르겠다

※ 다음 질문은 성행태에 관한 내용입니다. 빠짐없이 작성하여 주십시오.

29. 당신이 처음 이성과 교제했을때 당신의 나이는 몇살이었습니까? 43-44
1) 처음 교제했을때 나이: 만_____세
2) ☐ 교제경험이 없다

30. 당신은 여자와 키스를 해 본 경험이 있습니까? 45
1) ☐ 있다
2) ☐ 없다

31. 당신은 현재 교제(데이트)중인 여자친구나 결혼 상대자가 있습니까? 46
1) ☐ 있다
2) ☐ 없다

32. 당신은 성적 충동이 일어날때 그 욕구를 주로 어떻게 해소하시겠습니까? 47
(하나만 표시하십시오)
1) ☐ 이성과 성행위를 한다
2) ☐ 자위(수음)를 한다
3) ☐ 취미생활에 몰두한다
4) ☐ 자기 의지로 참는다
5) ☐ 종교적인 힘으로 참는다
6) ☐ 운동을 한다
7) ☐ 친구를 만나 시간을 보낸다
8) ☐ 기타(어떤 방법:_____)

33. 당신은 여자 (매춘부 포함)와 성행위를 해 본 경험이 있습니까? 48
1) ☐ 있다
2) ☐ 없다

34. 당신은 일반적으로 어떤 동기에서 성관계를 가지게 되었다고 보십니까? 49
1) ☐ 성경험을 해보고 싶은 호기심에서
2) ☐ 주위의 친구들과 같이 어울리기 위해
3) ☐ 상대방 여성과 좀 더 가까워지고 싶어서
4) ☐ 상대방 여성을 정복하기 위해
5) ☐ 쾌락을 얻기 위해
6) ☐ 사회에 대한 반항심 때문에
7) ☐ 기타(무엇:_____)
8) ☐ 성행위 경험이 없다

35. 당신은 성병에 걸려 본 경험이 있습니까? 50
1) ☐ 있다 2) ☐ 없다

36. 당신은 몇살때 처음으로 성행위(성교)를 경험했습니까? 51-52
1) 있다: 만 ___살 때
2) ☐ 성교 경험이 없다(* 59번 질문으로 가시오)

36-1. 처음 성행위시 상대자는 누구였습니까? 53-54
1) ☐ 결혼을 약속한 여자
2) ☐ 여자 친구
3) ☐ 친척
4) ☐ 가정부
5) ☐ 다방종업원
6) ☐ 우연히 만난 여자
7) ☐ 술집종업원
8) ☐ 창녀
9) ☐ 콜걸
10) ☐ 이발소 여종업원
11) ☐ 안마시술소 여자
12) ☐ 기타 (누구:_____)

36-2. 첫 성행위를 하기 전에 술을 마셨었습니까? 55
1) ☐ 술을 마셨다 2) ☐ 안마셨다 3) ☐ 모르겠다

36-3. 첫 성행위를 할 때 피임방법을 사용하셨습니까? 56
1) ☐ 사용하지 않음
2) ☐ 콘돔 사용
3) ☐ 상대여성이 먹는 피임약 복용
4) ☐ 기타 피임방법 사용(방법:_____)

※ 다음은 윤락여성과의 성행태에 관한 내용입니다. 빠짐없이 작성하여 주십시오.

37. 당신은 몇 살때 처음으로 윤락여성(돈을 받고 성행위를 하는 여자)과 성관계를 가져 본 일이 있습니까? 57-58
1) 있다: 만 ____살 때
2) ☐ 성교경험이 없다(* 45번 질문으로 가시오)

37-1. 처음 관계시 술을 마셨습니까? 59
1) ☐ 마셨다 2) ☐ 안마셨다

37-2. 처음 관계시 콘돔을 사용했습나까? 60
1) ☐ 사용했다 2) ☐ 사용하지 않았다

37-3. 처음 관계시 누구와 같이 갔습니까? (복수이면 있는대로 V표 하십시오) 61-62
1) ☐ 고등학교 친구
2) ☐ 대학교 친구
3) ☐ 군대 친구
4) ☐ 기타 (누구:_____)
5) ☐ 나 혼자 갔다

38. 지난 일년간 몇 명의 다른 윤락여성과 성관계를 가졌습니까? 63
1) ☐ 없다
2) ☐ 1-2명
3) ☐ 3-5명
4) ☐ 6-9명
5) ☐ 10명이상

39. 지난 일년간 몇 번이나 윤락여성과 성관계를 가졌습니까? 64
1) ☐ 없다
2) ☐ 1-2번
3) ☐ 3-6번
4) ☐ 6-12번
5) ☐ 12번 이상

40. 지난 일년간 윤락여성과 성관계를 가졌을때 얼마나 콘돔을 사용했습니까? 65
(퍼센트로 계산)
1) ☐ 사용 안했다
2) ☐ 25% 정도
3) ☐ 50% 정도
4) ☐ 75% 정도
5) ☐ 거의 100%
6) ☐ 성관계가 없었다

41. 마지막으로 윤락여성과 성관계를 가진 것이 언제입니까? 66-67
1) _____년 _____월
2) ☐ 1회경험 뿐이다 (* 45번 질문으로 가시오)

41-1. 마지막 윤락여성과 성관계시 누구와 같이 갔습니까?(있는대로 V표 하십시오)
1) ☐ 고등학교 친구
2) ☐ 대학교 친구
3) ☐ 대학교 선·후배
4) ☐ 군대 친구
5) ☐ 기타 (누구) 68-69
6) ☐ 나 혼자 갔다

41-2. 마지막 윤락여성과 성관계시 술을 마셨습니까? 70
1) ☐ 마셨다 2) ☐ 안마셨다 (* 41-4번 질문으로 가시오)

41-3. 그 당시 술을 얼마나 드셨습니까? 71-72
소주 _____병, 맥주 _____병

41-4. 마지막 윤락여성과 성관계시 콘돔을 사용했습니까? 73
1) ☐ 아니다 2) ☐ 그렇다

42. 지금까지 당신이 성행위를 가진 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)은 74-81
누구였습니까? 있는대로 전부 V표 하십시오.
1) ☐ 매춘부
2) ☐ 유흥업소 여자
3) ☐ 술집 여자
4) ☐ 다방 여자
5) ☐ 이발소 여자
6) ☐ 안마시술소 여자
7) ☐ 콜걸
8) ☐ 기타 (누구:_____)

43. 현재까지 당신이 기억하는 한, 전부 몇명의 윤락여성과 성관계를 가졌습니까? D7-8
모두 _____명

44. 지금까지 윤락여성(또는 접대부, 여급, 콜걸 등)과 성행위시 어느 정도 콘돔을 9
사용해 보셨습니까?
1) ☐ 전혀 사용하지 않았다
2) ☐ 거의 사용하지 않았다
3) ☐ 가끔 사용했다
4) ☐ 대부분 사용했다
5) ☐ 성교때마다 항상 사용했다

※ 다음은 당신의 여자친구(결혼을 약속한 여자 포함)와의 성관계에 대한 질문입니다

45. 당신은 여자친구와 성행위를 한 적이 있습니까? 10-11
1) 그렇다: ___년 ___월 처음으로 하였다(맨처음 관계를 가진 여자친구를 말함)
2) ☐ 없다(* 52번 질문으로 가시오)

45-1. 여자친구와 처음 관계시 술을 마셨습니까? 12
1) ☐ 마셨다 2) ☐ 안마셨다

45-2. 여자친구와 처음 관계시 콘돔을 사용했습니까? 13
1) ☐ 사용했다 2) ☐ 사용하지 않았다

46. 지난 일년간 몇명의 다른 여자친구와 성관계를 가졌습니까? 14
1) ☐ 없다 4) ☐ 3-4명
2) ☐ 1명 5) ☐ 5명 이상
3) ☐ 2명

47. 지난 일년간 몇 번이나 여자친구와 성관계를 가졌습니까? 15
1) ☐ 없다 4) ☐ 6-12번
2) ☐ 1-2번 5) ☐ 12번 이상
3) ☐ 3-6번

48. 지난 일년간 여자 친구와 성관계를 가졌을때 얼마나 콘돔을 사용했습니까? 16
(퍼센트로 계산)
1) ☐ 사용 안했다 4) ☐ 75% 정도
2) ☐ 25% 정도 5) ☐ 거의 100%
3) ☐ 50% 정도 6) ☐ 성관계가 없었다

49. 현재까지 당신이 기억하는 한, 전부 몇명의 여자친구와 성관계를 가졌습니까? 17-18
모두 _____명

50. 지금까지 여자친구들과 성행위시 어느정도 콘돔을 사용해 보셨습니까? 19
1) ☐ 전혀 사용하지 않았다 4) ☐ 대부분 사용했다
2) ☐ 거의 사용하지 않았다 5) ☐ 성교때마다 항상 사용했다
3) ☐ 가끔 사용했다

51. 마지막으로 여자 친구와 성관계를 가진 것이 언제입니까? 20-21
1) _____년 _____월
2) ☐ 1회 성관계 뿐이다 (* 52번 질문으로 가시오)

51-1. 마지막 성관계시, 술을 마셨습니까? 22
1) ☐ 마셨다 2) ☐ 안마셨다 (* 51-3번 질문으로 가시오)

51-2. 얼마나 드셨습니까? 23-24
소주 _____병, 맥주 _____병

51-3. 마지막 여자 친구와의 성관계시 콘돔을 사용했습니까? 25
1) ☐ 아니다 2) ☐ 그렇다

※ 다음은 우연히 혹은 오다가다 만난 여자와의 성행태 조사입니다.

52. 당신은 우연히 만난 여자와 성관계를 가진 적이 있습니까? 26-27
1) 그렇다: ___년 ___월 처음으로 (맨 처음으로 관계를 가진 여자)
2) ☐ 없다 (* 59번 질문으로 가시오)

52-1. 처음 관계시 술을 마셨습니까? 28
1) ☐ 마셨다 2) ☐ 안마셨다

52-2. 처음 관계시 콘돔을 사용했습니까? 29
1) ☐ 사용했다 2) ☐ 사용하지 않았다

52-3. 그 당시 누구와 같이 만났습니까? 30
1) ☐ 고등학교 친구 4) ☐ 군대 친구
2) ☐ 대학교 친구 5) ☐ 나 혼자
3) ☐ 대학교 선후배 6) ☐ 기타(누구: _____)

53. 지난 일년간 몇명의 우연히 만난 여자와 성관계를 가졌습니까? 31
1) ☐ 없다
2) ☐ 1-2명
3) ☐ 3-5명
4) ☐ 6-9명
5) ☐ 10명이상

54. 지난 일년간 몇 번이나 우연히 만난 여자와 성관계를 가졌습니까? 32
1) ☐ 없다
2) ☐ 1-2번
3) ☐ 3-6번
4) ☐ 6-12번
5) ☐ 12번이상

55. 지난 일년간 우연히 만난 여자와 성관계를 가졌을때 얼마나 콘돔을 사용했습니까? (퍼센트로 계산) 33
1) ☐ 사용 안했다
2) ☐ 25% 정도
3) ☐ 50% 정도
4) ☐ 75% 정도
5) ☐ 거의 100%
6) ☐ 성관계가 없었다

56. 현재까지 당신이 기억하는 한, 전부 몇명의 우연히 만난 여자와 성관계를 가졌습니까? 34
모두 _____명

57. 지금까지 우연히 만난 여자와 성행위시 어느 정도 콘돔을 사용해 보셨습니까? 35
1) ☐ 전혀 사용하지 않았다
2) ☐ 거의 사용하지 않았다
3) ☐ 가끔 사용했다
4) ☐ 대부분 사용했다
5) ☐ 성교때마다 항상 사용했다

58. 마지막으로 우연히 만난 여자와 성관계를 가진 것이 언제입니까? 36-37
1) _____년 _____월
2) ☐ 1회 성관계 뿐이다 (* 59번 질문으로 가시오)

58-1. 그 당시 누구와 같이 만났습니까? (전부 표시하시오) 38-39
1) ☐ 고등학교 친구
2) ☐ 대학교 친구
3) ☐ 대학교 선·후배
4) ☐ 군대 친구
5) ☐ 기타 (누구: _____)

58-2. 마지막 성관계시 술을 마셨습니까? 40
1) ☐ 마셨다
2) ☐ 안마셨다 (* 58-4번 질문으로 가시오)

58-3. 얼마나 드셨습니까? 41-42
소주 _____병, 맥주 _____병

58-4. 마지막 우연히 만난 여자와의 성관계시 콘돔을 사용했습니까? 43
1) ☐ 사용했다
2) ☐ 사용하지 않았다

59. 당신은 이성(여자)과 동거한 경험이 있습니까? 44
1) ☐ 있다
2) ☐ 현재 동거중
3) ☐ 없다 (* 60번 질문으로 가시오)

59-1. 동거하는 이성(여자)과 성행위를 하신 적이 있습니까? 45
1) ☐ 있다
2) ☐ 없다

59-2. 이성(여자)과의 동거기간은 전부 합해서 얼마 동안이 됩니까? 46-47
총 ___년 ____개월

60. 지금까지 당신과 성행위를 가진 상대방 여성이 임신한 적이 있었습니까? 48
1) □ 있었다
2) □ 없었다 (* 61번 질문으로 가시오)
3) □ 성교경험이 없다 (* 65번 질문으로 가시오)

60-1. 지금까지 모두 몇 번이나 상대방 여성이 임신을 하였습니까? 49
_____번

60-2. 그 임신의 결과로 출생한 아이가 있었습니까? 50
1) □ 있었다 2) □ 없었다

61. 당신은 성병에 감염된(걸린) 적이 있었습니까? 있다면 몇번이나 걸렸습니까? 51
1) 있다: _____번 2) □ 없다 (* 64번 질문으로 가시오)

62. 마지막 감염된 성병은 언제 걸렸습니까? (한번 걸렸던 사람도 해당됩니다) 52-53
1) 19 ___년 ___월 (본인 나이 만___세 때)에 걸렸었다 *54
2) □ 현재 걸려 있다

62-1. 그 성병은 어떤 종류입니까? 55
1) □ 임질 4) □ 기타(무엇 :_____)
2) □ 매독 5) □ 모르겠다
3) □ 비임균성 요도염

62-2. 그 성병은 누구로부터 옮았다고 생각하십니까? 56-57
1) □ 결혼을 약속한 여자 8) □ 윤락여성(창녀)
2) □ 친구, 애인 9) □ 콜걸
3) □ 친척 10) □ 이발소 여종업원
4) □ 가정부 11) □ 안마시술소 여자
5) □ 다방여자 12) □ 기타(누구 :_____)
6) □ 우연히 만난 여자 13) □ 모르겠다
7) □ 술집 여자

62-3. 그 당시 성행위를 할때 콘돔을 사용했습니까? 58
1) □ 사용하지 않았다 3) □ 사용중 빠졌다
2) □ 바르게 사용했다 4) □ 사용중 터졌다

62-4. 그 당시 성행위 전에 술을 드셨습니까? 59
1) □ 마셨다 2) □ 안마셨다

62-5. 그 당시 성병에 감염된 것을 어떻게 알게 되었습니까? 60
1) □ 성기에 이상한 증상이 나타나서
2) □ 신체검사를 통하여
3) □ 병의원에서 검사를 받고 나서
4) □ 성행위를 한 상대가 의심스러워 검사를 받고 나서
5) □ 성행위 상대자가 검사를 받아 보라고 해서
6) □ 기타(어떻게:_____)

62-6. 그 당시 성병을 치료 받으러 제일 처음 어느 곳을 가셨습니까? 61
1) □ 약국
2) □ 병 의원
3) □ 보건소
4) □ 기타(어디:_____)
5) □ 치료받지 않았다 (* 63번 질문으로 가시오)

62-7. 첫번째 치료받은 곳에서 그 성병은 완전히 치료가 되었습니까? 62
1) □ 그렇다
2) □ 아니다 (* 63번 질문으로 가시오)
3) □ 모르겠다

62-8. 그당시 당신이 그 성병을 완치한 곳은 어디입니까? 63
1) □ 약국
2) □ 병·의원
3) □ 보건소
4) □ 기타(어디:_____)
5) □ 완치되지 않았다

63. 당신은 성병에 걸린후 완치되지 않은 상태에서 성행위를 하신 적이 있습니까? 64
1) □ 있다
2) □ 없다

64. 당신은 성행위 전후에 성병예방을 위하여 어떤 조치를 취하신 적이 있었습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오.

64-1. 성행위 전 65-66
1) □ 아무 조치도 안했다
2) □ 항생제를 먹었다
3) □ 주사를 맞았다
4) □ 콘돔을 사용하였다
5) □ 기타(무엇:_____)

64-2. 성행위 후 67-68
1) □ 아무 조치도 안했다
2) □ 항생제를 먹었다
3) □ 주사를 맞았다
4) □ 성교후 즉시 소변을 보았다
5) □ 성교후 즉시 성기를 비누물로 씻었다
6) □ 기타 (무엇 :_____)

※ 다음 질문에 대하여 당신의 생각을 □칸에 V표 하거나 ___칸에 적어 주십시오.

65. 현재 당신이 가지고 있는 가장 큰 고민은 무엇입니까? 69
1) □ 직장문제
2) □ 가정문제
3) □ 이성문제
4) □ 결혼문제
5) □ 학교문제
6) □ 기타(무엇:_____)
7) □ 고민거리가 없다

66. 당신은 성에 대해서 궁금하거나 알고 싶은 것이 있습니까? 해당되는 곳에 모두 V표 하십시오. 70-76 *77
1) □ 자위행위(수음)
2) □ 성적충동(욕구)
3) □ 이성교제
4) □ 피임방법
5) □ 남녀의 생식기능에 관한 것
6) □ 성병/에이즈
7) □ 기타(구체적으로:_____)
8) □ 없다

67. 당신이 가지고 있는 고민이나 성문제에 대하여 상담을 원하십니까? 78
1) □ 매우 원한다
2) □ 원한다
3) □ 원치 않는다
4) □ 고민이 없다

68. 마지막으로 타고난 성향과 종교성에 대한 설문입니다. 피곤하시겠지만 끝까지 협조해 주시기 바랍니다.
* 지시사항: 자신의 타고난 성향에 대한 것입니다. A 와 B 두가지 중에서 답안을 비교, 하나만 선택하여 V표 하여 주십시오

68-1. ☐ A. 나는 춤, 술은 물론 모든 것이 허용되는 장소에서의 만남을 즐긴다. E7
☐ B. 나는 조용하게 대화할 수 있는 장소에서의 만남을 즐긴다.

68-2. ☐ A. 나는 성관계에 있어서 자유분방한 사람들을 싫어한다. 8
☐ B. 나는 성관계가 자유분방한 사람들을 좋아한다.

68-3. ☐ A. 나는 술이나 담배가 잘 맞지 않는다. 9
☐ B. 나는 때때로 술과 담배를 즐긴다.

68-4. ☐ A. 나는 이것 저것 경험만을 높이는 데에는 큰 관심이 없다. 10
☐ B. 나는 조금은 상식에 어긋나는 놀랄만한 일이라도, 그러한 새롭고 감각적인 경험을 좋아한다.

68-5. ☐ A. 나는 섹시한 이성과 데이트하기를 원한다. 11
☐ B. 나는 대화가 통하는 이성과 데이트 하기를 원한다.

68-6. ☐ A. 남자라면 결혼 전에 충분한 성적 경험이 있어야 한다. 12
☐ B. 성적 경험은 결혼하여 아내와 갖는 것이 바람직하다.

68-7. ☐ A. 요즘 영화에는, 대체적으로 성적인 묘사가 너무 많다. 13
☐ B. 요즘 영화는 성적인 장면이 많아 볼 맛이 난다.

69. 당신의 종교는? 14
1) ☐ 기독교
2) ☐ 불교
3) ☐ 천주교
4) ☐ 기타 (무엇: _____)
5) ☐ 없다 (* 73번 질문으로 가시오)

70. 당신은 규칙적으로 종교활동(예배 등)에 참석하고 있습니까? 15
1) ☐ 없다
2) ☐ 1년에 1-2번
3) ☐ 1년에 3-4번
4) ☐ 한달에 1번 정도
5) ☐ 한달에 2-3번
6) ☐ 일주에 1번
7) ☐ 일주에 1번 이상

71. 당신에게 있어 다음의 사항들이 얼마나 중요하다고 생각하는지 해당되는 곳에 표시하여 주십시오.

	① 중요하지 않다	② 약간 중요하다	③ 중요하다	④ 매우 중요하다	
71-1. 규칙적으로 종교활동에 참석하는 것	①☐	②☐	③☐	④☐	16
71-2. 일상생활을 행하는데 있어서 종교의 교리(믿음)에 따라 생활하는 것	①☐	②☐	③☐	④☐	17
71-3. 어려운 문제에 부딪혔을때 기도를 하는 것	①☐	②☐	③☐	④☐	18

72. 당신이 믿고 있는 종교가 술과 성적인 유혹을 자제하는데 어느 정도 영향을 준다고 생각하십니까? 19
1) □ 절대적인 영향을 준다
2) □ 많은 영향을 준다
3) □ 보통이다
4) □ 거의 영향을 주지 않는다
5) □ 전혀 영향을 주지 않는다

73. 끝으로, 이성문제나 성문제와 관련해서 현재 당신이나 당신의 동료 친구들이 느끼고 있는 문제나 고민거리, 원하는 상담이나 성교육 내용, 정부나 우리 사회에 바라는 의견 등이 있으면 무슨 내용이든 간에 숨김없이, 솔직하게 써 주십시오. 도움이 되도록 힘껏 노력하겠습니다.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다 -

※ 기록이 빠진 곳이 있으면 꼭 적어 주시고 학과사무실이나 조교 또는 과대표에게 제출하여 주십시오.

研究報告書 94-13

未婚男性의 性行態에 관한 硏究

1994年 10月 17日 印刷 값 5,000원
1994年 10月 21日 發行

著 者 林 鍾 權 外

發行人 延 河 淸

發行處 韓國保健社會硏究院
서울特別市 恩平區 佛光洞 山42-14
代表電話 : 355-8003~7

登 錄 1994年 7月 1日 (第8-142號)
印 刷 아진인쇄

ⓒ 韓國保健社會硏究院 1994

<著者略歷>

林 鍾 權
서울大學校 保健大學院 保健學 碩士
現 韓國保健社會硏究院 硏究委員

金 惠 蓮
서울大學校 保健大學院 保健學 碩士
現 韓國保健社會硏究院 責任硏究員

張 東 鉉
總會神學大學 神學 碩士
現 韓國保健社會硏究院 主任硏究員

金 柱 亨
美國 University of Johns Hopkins 保健學 博士 過程
前 韓國保健社會硏究院 臨時 主任硏究員

金 漢 敬
美國 University of Pennsylvania 社會事業學 碩士
現 聖公會 神學大學 社會事業學科 敎授