

90-07

HIV 感染의 高危險集團 (同性戀愛者)

實態調查 報告書 - 서울地域을 中心으로 -

1990

韓國保健社會研究院

✓

HIV 感染의 高危險集團 (同性戀愛者)

實態調查 報告書

- 서울地域을 中心으로 -

1 9 9 0

朱 信 一
張 東 紘



韓國保健社會研究院



머리말

20世紀最大의 恐怖를 자아내고 있는 AIDS가 우리나라에서도 患者와 感染者를 包含하여 百餘名을 치솟게 되었다.

美國에서 첫 患者報告가 1981年 同性戀愛者 사이에서 發見된 後世界的으로 擴散되면서 1990年에 들어와서는 世界保健機構에 書面으로報告된 總件數만 하여도 10餘萬名을 超씬 넘는다고 한다.

中世紀의 黑死病 以後 世界는 또 다시 새로운 保健醫學的挑戰을 받게 되었다. 癌의 征服과 함께 21世紀의 最大難題라 하겠다.

同性戀愛者は AIDS의 疫學的인 觀點에서 이들이 選好하는 特定性行態와 頻煩한 性行爲의 파트너交替로 因하여 AIDS의 一次的인 高危險群으로 알려져 왔다.

本研究는 AIDS感染의 高危險群인 우리나라의 同性戀愛者の 實態를 把握하여 國家의 豫防施策에 一助를 하고자 本院 研究陣이 計劃하여 推進한 것이다. 調査의 性格上 어려운 本研究事業을 처음부터 끝까지 計劃하여 完了한 朱信一, 張東鉉 研究陣의 勞苦를 致賀하며 調査對象의 HIV抗體檢査에 積極的으로 協助하여 주신 國立保健院長님과 AIDS센터 및 서울特別市 鐘路區保健所 여러분께 感謝를 드린다.

韓國保健社會研究院

院長 池達顯

目 次

第一章 序 論	1
1. 背 景	1
2. 調査의 目的	2
第二章 實態調査	3
1. 調査對象	3
2. 調査方法	3
1) 調査道具	3
2) 調査方法	4
2.1 事前調査	4
2.2 郵便調査	5
2.3 事前調査結果	6
2.4 本 調査	6
2.5 業主 및 從業員에 대한 設問調査	7
2.6 酒店의 顧客에 對한 設問調査	7
2.7 神經精神科來院 同性戀愛者 設問調査	7
2.8 血液採取	7
2.9 業所施設 實態調査	7
3. 調査의 制限點	8
第三章 資料分析	9
1. 調査對象者の 社會, 人口學的 特性	9
1) 年齡	9
2) 教育水準	10
3) 結婚狀態	11
4) 現居住地 및 居住形態	12

5) 所得水準	14
2 . AIDS에 對한 認識 및 行態	15
1) AIDS에 對한 認知度 및 認知經路	15
2) AIDS에 對한 認識	20
3) HIV抗體 檢查 受檢實態	22
3 .1 既 受檢實態	22
3 .2 向後 受檢意思 및 諸般便宜에 對한 希望事項	27
4) 콘돔 使用實態	30
3 . AIDS에 對한 相談, 弘報 · 啓蒙의 必要性에 對한 認識 ..	32
1) 相談	32
2) 弘報 및 啓蒙	37
4 . 同性戀愛 行態	40
1) 初經驗	40
1 .1 同性戀愛 動機	40
1 .2 年齡	40
1 .3 職業	40
1 .4 相對者	40
2) 同性戀愛 相對者 選擇基準 및 同性戀愛期間	42
2 .1 選擇基準	42
2 .2 同性戀愛期間	43
3) 性行爲 回數 및 相對者 數	45
3 .1 同性間 性行爲 回數 및 相對者數	45
3 .2 異性間 性行爲 回數 및 相對者數	48
4) 外國人과의 同性戀愛實態	50
5) 性行態	51
6) 性病 既往歷	53
7) 麻藥類 覚醒劑誤濫用實態	54

5 . 同性戀愛者 專用酒店 業所實態 및 從業員의 諸特性	55
1) 業所實態	55
2) 業主 및 從業員의 諸特性	56
2.1 同性戀愛 相對者의 成立樣態	56
2.2 其他業所業務와 關聯된 事項	57
6 . HIV 抗體檢查	59
第四章 主要 調查結果 要約 및 國際比較	60
第五章 政策建議	70
參考文獻	71
附 錄	75
1 . 郵便調查用 設問書	77
2 . 顧客調查用 設問書	85
3 . 業主 및 從業員 調查設問書	96

表 目 次

〈表2－1〉	事前調査의 種類 및 設問書配布 및 回收狀態	6
〈表2－2〉	調查種類別 對象 및 調查完了率(%)	6
〈表3－1〉	調查應答者의 社會·人口學的 特性分布(%)	10
〈表3－2〉	調查應答者 年齡別 結婚狀態分布(%)	11
〈表3－3〉	對象 I의 現居住地 分布	12
〈表3－4〉	對象 II의 現居住地分布(%)	13
〈表3－5〉	對象 I의 現居住形態別 分布(%)	13
〈表3－6〉	對象 I 의 結婚狀態別 現居住形態分布(%)	14
〈表3－7〉	對象 I의 月平均 所得水準의 分布(%)	15
〈表3－8〉	應答者の AIDS에 對한 認知分布率(%)	16
〈表3－9〉	AIDS를 認知하게된 經路分布(%)	16
〈表3－10〉	AIDS 認知에 對한 年齡分布(%)	17
〈表3－11〉	應答者の 教育水準別 AIDS 認知分布(%)	18
〈表3－12〉	應答者の AIDS 知識水準에 對한 問項內容別 正誤百分率(%)	19
〈表3－13〉	應答者の AIDS 問項에 對한 正答百分率(%)	20
〈表3－14〉	HIV 感染者增加에 對한 두려운 정도 百分率(%)	21
〈表3－15〉	“HIV 感染者中 同性戀愛者가 많다”는 事實을 알고 있는 應答者の 分布	21
〈表3－16〉	“HIV 感染者中 同性戀愛者가 많다는 事實을 알고 있는 應答者の 豫防을 為한 選好行態의 分布(%)	22

〈表3-17〉 應答者の HIV 抗體検査 受検率(%)	23
〈表3-18〉 既受検者の 受検事由別 百分率(%)	23
〈表3-19〉 未受検者の 理由別 百分率(%)	24
〈表3-20〉 應答者の 結婚状態別 HIV 抗體検査 既受検 百分率(%)	25
〈表3-21〉 性行為 行態別 HIV 抗體検査 既受検百分率(%)	26
〈表3-22〉 外国人との 同性恋愛 経験有無別 HIV 抗體検査 既受検百分率(%)	27
〈表3-23〉 向後 HIV 抗體検査에 對한 受容度(%)	28
〈表3-24〉 HIV 抗體検査의 用意者が 選定한 便宜別 百分率(%)	28
〈表3-25〉 HIV 感染者 増加에 對한 두려움別 抗體検査 用意 百分率(%)	29
〈表3-26〉 HIV 感染의 知識 有無에 따른 抗體検査用意度(%)	30
〈表3-27〉 同性間 性行為別 콘돔使用實態(%)	31
〈表3-28〉 콘돔의 AIDS 豫防에 對한 知識有無別 肛門性行為 時 콘돔使用實態(%)	32
〈表3-29〉 AIDS에 對한 相談서비스希望 百分率(%)	33
〈表3-30〉 AIDS에 對한 相談서비스 運營時 應答者が 選好 하는 相談方法, 場所, 相談役의 分布(%)	34
〈表3-31〉 AIDS에 對한 相談不願者の 事由分布 百分率(%)	35
〈表3-32〉 年齢別 AIDS에 對한 相談希望 百分率(%)	35
〈表3-33〉 結婚状態別 AIDS에 對한 相談希望 百分率	36
〈表3-34〉 AIDS에 對한 弘報·啓蒙의 必要性에 對한 認識度(%)	37

〈表3-35〉 AIDS에 對한 弘報·啓蒙方法 및 印刷物 配布 選好場所의 分布 百分率(%)	38
〈表3-36〉 教育水準別 AIDS에 對한 弘報·啓蒙의 必要에 對한 認識度(%)	36
〈表3-37〉 同性戀愛 自/他意 比率(%)	40
〈表3-38〉 同性戀愛 첫經驗時 年齡, 職業 및 相對者의 分布 百分率(%)	41
〈表3-39〉 同性戀愛 相對者 選擇에 關한 基準의 百分率	42
〈表3-40〉 應答者の 同性戀愛期間分布(%)	43
〈表3-41〉 結婚狀態別 同性戀愛期間 分布(%)	44
〈表3-42〉 同性間 月平均 性行為 回數 및 年間 性相對者數 分布(%)	45
〈表3-43〉 年齡階層別 月平均 同性戀愛回數	46
〈表3-44〉 結婚狀態別 月平均 同性戀愛 回數分布(%)	47
〈表3-45〉 年齡階層別 年平均 同性戀愛 相對者數(名)	48
〈表3-46〉 異性間 月平均 性行為回數分布(%)	48
〈表3-47〉 異性(女性)과의 性行為 年間相對者數 및 相對者 女性別 分布(%)	49
〈表3-48〉 外國人과의 同性戀愛經驗 및 相對한 外國人數別 百分率(%)	50
〈表3-49〉 出國 및 海外에서의 同性戀愛經驗 百分率(%)	51
〈表3-50〉 同性戀愛 行為時의 刺戟部位 및 役割別 百分率	52
〈表3-51〉 同性戀愛時 相對의 精液을 吸入한 經驗 百分率(%)	53

〈表3-52〉 應答者의 性病既往歴 및 既感染性病別 百分率(%)	54
〈表3-53〉 對象I의 麻藥類 및 覚醒劑別의 誤濫用經驗率(%)	55
〈表3-54〉 業所內서의 顧客間에 同性戀愛파트너가 이루어지는 類型에 對한 對象II의 肯定率(%)	57
〈表3-55〉 業所勤務動機 및 職業의 滿足度等에 關한 百分率	58
〈表4-1〉 AIDS에 關한 三個國 地域住民의 知識 比較	61
〈表4-2〉 美國 Sanfrancisco市 居住 同性戀愛者의 肛門性行爲時 콘돔非使用率(%)	63
〈表4-3〉 英領 Columbia의 Vancouver居住 同性戀 愛者 Cohort의 調查時期別 콘돔의 使用頻度 (%)	63
〈表4-4〉 2個地域의 肛門性交率 比較	66
〈表4-5〉 公共診療機關 및 個人醫院에 來院한 同性戀愛者 의 麻藥 및 向精神性 醫藥品 誤濫用 頻度	67
〈表4-6〉 同性戀愛者 HIV抗體陽性率(%) 數個國 比較	68

第 I 章 序 論

1. 背 景

AIDS가 처음으로 알려진 것은 1981年8月 美國 칼리포니아州 로스안젤레스에 居住하였던 同性戀愛者 5名이 *Pneumocystis Carinii*에 依한 肺淡으로 死亡한 內容이 美國聯邦政府의 조지아주 아틀랜타市所在 疾病管理센터(CDC)가 發刊하는 疾病 및 死亡週間報告書(*Morbidity and Mortality Weekly Report*)에 記載된 것이 始初이다. 以後 같은 樣相의 疾狀과 同一病因으로 因한 死亡한 例가 増加함에 따라 調査를 繼續한 結果 同性戀愛者와 藥物濫用者에서 많이 發生함을 把握하게 되었다. 美國에서 同性戀愛者들 사이에 AIDS가 急速度로 많이 發生한 큰 理由는 이들이 肛門性交를 選好하였고 더욱이 肛門性交時 콘돔을 별로 使用하지 않았던 탓이었다. 肛門性交는 肛門의 粘膜을 쉽게 破裂시켜 바이루스의 侵入이 쉬워져서 感染이 빨리 이루어 진다고 한다. 게다가 이들이 性交相對役을 자주 交替하는 亂交性의 性行爲가 이들 사이에 HIV의 感染을 넓게 빠르게 自招하게 되었다고 한다. 保健學上 AIDS의 問題를 더욱 어렵게 하는 것은 3個月에서 6年까지의 이 病의 긴 潜伏期이다. 潜伏期 期間中에는 感染이 되어 있으나 症狀이 거의 全無하기 때문에 正常人과 같은 樣相을 보이고 抗體 檢查에 만 陽性일 뿐이어서 性이 比較的開放이 된 社會에 있어서는 수 많은 사람에게 潜伏期間中 感染을 漣鎖的으로 이르킬수가 있게된다. 이러한 疫學上의 여러 問題를 안고 있는 AIDS의 高危險群으로 알려진 同性戀愛의 實態調查가 우리나라에서는 1989年 日本人 이마이대미오에 依하여 部分的으로 調査된 것 以外에는 體系的으로 試圖된 적이 全無하여 保健社會部의 要請에 따라 AIDS綜合 對策에 必要한 資料를 蒐集코자 本 實態調查가 實施하게 되었다.

2. 調査의 目的

AIDS의豫防 및 弘報啓蒙과 相談서비스의 開發에 直·間接으로 關聯되는 아래의 여섯가지로 大別되는 各種 情報를 菲集하는 것이 研究의 主要目的으로 設定되었다.

첫째, 同性戀愛者의 一般的 特性

둘째, AIDS에 關하여 同性戀愛者가 이미 알고 있는 知識水準

셋째, 一般人과 相異하다고 알려진 性行態

넷째, HIV 感染의 抗體 檢查에 對한 既往歷 및 向後受容度

다섯째, 藥物濫用에 對한 既往歷 및 一回用 注射의 使用歷 및 重複使用與否

여섯째, 弘報啓蒙 및 相談서비스 設置運營에 對한 意見

第Ⅱ章 實態調查

1. 調査의 對象

서울特別市 鐘路區 樂園洞에 集中되어 있는 同性戀愛者가 出入하는 酒店의 業主와 從業員 그리고 이곳에 出入하는 顧客을 調査對象으로 選定하였다. 諮問會議에서 神經精神科 病醫院에 來院하는 同性戀愛者도 調査對象에 包含하도록 提議되었으나 病醫院에 出入하는 同性戀愛者는 同性戀愛者 專用酒店에 出入하는 同性戀愛者群과는 同一視할 수가 없다고 判斷되어 本 分析對象에서 除外키로 하였다. 諮問會議에서 提議된 또 다른 方法은 同性戀愛者를 爲한 相談室을 設置運營하면서 相談進行 過程에서 被相談者로부터 設問書를 記入收去하는 調査가 可能할 것이라는 觀點에서 오랫동안 舉論되었으나 制限된豫算과相當한 數의 同性戀愛者를 短期間內에 相談室로 誘致하기에는 長時日이 所要될 것이明白해지면서 短期間內에 情報蒐集이 切實히 必要한 本 調査의 緊急性과도 一致되지 않아 考慮하지 않기로 하였다.

2. 調査方法

1) 調査道具

無記名式으로 記入하는 設問書를 調査方法으로 採擇하였으며 調査對象에 따라 總3種(附錄1,2,3)을 開發하여 活用하였다.

顧客과 共通되는 問項外에도 從業員으로부터 蒐集可能한 情報만을 記入토록 誘導한 從業員用 設問書와 各酒店의 施設 現況을 記入하게 하는 施設調查設問書, 酒店에 出入하는 顧客이 現場에서 記入한 後 收去하도록 되어 있는 現場收去用과 現場에서 記入하는 것을 謝絕하는 境遇, 顧客이 願하는 場所에서 記入한 後 郵送하도록 返回郵票가 봉투에 插入되

어 있는 郵送用設問書의 네가지 設問調査書를 開發하여 調査道具로 活用 코자 하였다.

2) 調査方法

2.1 事前調査

事前調査 期間에는 設問書의 内容 및 表現에 對한 檢討外에도 아래의 3 가지 調査 方法을 酒店에서 現場實施하여 短點을 補完코자 하였다.

첫째, 開發된 設問書를 從業員과 業主에게 配布하고 本 調査팀의 參席下에 記入한 후 收去한다.

둘째, 施設調查는 業主를 營業外時間에 一定場所에 오도록 勸誘하여 現場에서 記入한 設問書를 收去토록하고 漏落된 業所는 個別訪問을 通하여 補完한다.

셋째, 顧客에 對한 調査는 從業員이나 業主를 事前教育한 후 이들이 顧客에게 設問書를 配布하여 收去토록 한다.

事前調査實施酒店으로 21個中 比較的 顧客 收容能力이 큰 “R”酒店을 選定하였다.

事前調査 첫날 營業이 開始되기 前인 午後 5時頃에 R酒店에 到着하였을때 支配人은 完了된 50餘枚의 設問書를 調査팀에게 提出하면서 이미 當日年前과 午後에 樂園洞에 散在한 同性戀愛 專用酒店을 巡回하면서 各酒店의 從業員에게 設問書를 配布한 후 記入된 것을 收去한 것이라고 說明하였으나, 設問書記入은 調査팀의 參席下에 各者가 記入하는 것이 原則이라는 것을 強調하면서 支配人으로 하여금 收去하였던 50餘枚의 設問書를 破棄케 하고 支配人을 包含 6名의 從業員이 調査팀의 參觀下에 個個人이 直接 設問書를 記入케 한후 調査팀이 現場에서 收去하였다. 顧客에 對한 調査는 첫날부터 顧客으로부터 頑強한 抵抗에 부딪쳤다. 調査팀이 酒店內에 比較的 눈에 띠이지 않는 후미진 구석에 앉아있었으나 酒店에 出入하는 顧客에게는 同性戀愛者가 아닌 異邦人으로 한 눈에 알아 볼 수가 있었기

때문이었다. 調査팀이 酒店內 한 구석에 있는 것을 感知한 顧客은 그即時 離席을 하여 酒店을 나가는 것이 目擊되었다. 이같은 事態에도 첫날 業主의 協助를 받아 顧客으로부터 一件의 設問書가 作成되어 現場에 있던 調査팀에게 傳達되어 收去할 수가 있었으나 調査팀이 現場에 있는 限繼續하여 顧客이 R酒店을 忌避하는 狀況이 發生되어 調査팀은 一但 現場에서 撤收할 수 밖에 없었다. 調査第三日도 전날과 같은 狀況이 反復되어 業主가 直接 調査팀의 撤收를 要請하기에 이르러 退場할 수 밖에 없었으며 追後 調査팀의 現場參席下에 顧客이 設問書에 記入하는 調査方法은 實質的으로 不可能한 것으로 判斷되었다. 調査第五日에 R酒店의 業主와 支配人과의 連席會議에서 當初 調査의 信賴度를 提高하기 爲하여 主張하였던 調査팀의 現場參觀을 一但 撤回하여야 하며 業主와 從業員의 顧客과의 親分에 따라 自身들이 調査對象을 選定할 수 있도록 하여야 하며 顧客에 對한 設問調查는 調査팀의 現場監視的인 參觀이 없어야 本調査에 對한 顧客의 拒否感과 疑懼心이 拂拭될 것이라는 主張과 提案이 있었다. 業主와 從業員에게 設問書를 委託한다하여도 많아야 一日 1 ~ 3名의 顧客에 限하여 說得이 可能할 것이라는 推定이었다. 本 調査期間中에 業主와 從業員의 HIV抗體検査를 爲한 血液採取를 希望한다는 調査팀의 提議에 他業主들과 協議하여 決定할 것이라는 意思表明에 血液採取를 한다면 設問調查가 完了되는대로 現場에서 直接할 수 있도록 措置할 것을 確約하였다.

2.2 郵便調查

從業員이 2名인 業所 1個所와 4 ~ 7名이 就業하고 있는 酒店 4個所에 各各 設問書 50部를 配布하였다. 顧客이 酒代를 支拂하고 酒店을 나서기 直前 顧客에게 設問書를 配付하고 어느 곳에서라도 顧客이 便利한 場所에서 記入하여 郵送하도록 業主가 顧客에게 懇請하도록 하였다.

2.3 事前調査結果

<表2-1>에서 보는 바와같이 調査팀의 現場 參觀下에 顧客으로부터 完了된 設問書를 收去한다는 것은 不可能한 것으로 把握되어 本 調査에서는 業主와 從業員에게 一任하기로 合議하였다. 郵便調査도 回收率이 極히 低調하여 調査方法에서 除外키로 하였다.

<表2-1> 事前調査의 種類 및 設問書配布 및 回收狀態

調査種類	期 間	業所數	設問書數	
			配 布	回 數
設問調査	1989.9.5 ~ 9.11	1個所	40	1
郵便調査	1989.9.5 ~ 9.30	5個所	250	10

2.4 本調査

<表2-2> 調査種類別 對象 및 調査完了率(%)

種 類	期 間	調 査		
		對 象 數	完 了 數	完 了 率
設問調査				
一業主 및 從業員	1989.10.25 ~ 10.31	業 主 21名	21名	100%
		從業員 47名	43名	91%
一酒店의 顧客	1989.10.25 ~ 11.30	—	377名	—
一神經精神科來院患者 *	1989.11.1 ~ 12.16	—	7名	—
HIV抗體検査를 위한 血液採取	1989.10.25 ~ 10.31	業 主 21名	20名	95%
		從業員 47名	42名	89%
業所施設調査	1989.10.25 ~ 10.31	21個 所	21個 所	100%

* 總 23 個 病醫院에 勤務하는 精神科專門醫 25 名

2.5 業主 및 從業員에 對한 設問調查

서울市 鐘路區 樂園洞 調查地域內의 同性戀愛者를 顧客으로 하여 營業中인 21 個 酒店의 全業主와 從業員을 對象으로 調查한 結果 <表2-2>와 같이 業主는 100%從業員은 4 名을 除外하고 나머지 全員을 調查하여 完了率은 91%였다.

2.6 酒店의 顧客에 對한 設問調查

總 21 個業所中 從業員 3 人就業 業所 1 個所 4 ~ 7 人就業 業所 7 個所總 8 個業所를 選定하여 總 377 名의 顧客으로부터 設問書를 收去하였다. 調查期間內의 完了된 設問書는 業所當 1 日平均 1 ~ 2 名이었다.

2.7 神經精神科來院同性戀愛者 設問調查

韓國 臨床性學會의 協助를 받아 同學會所屬會員인 서울市內의 23 個綜合病院, 醫院에 勤務하는 25 名의 神經精神科專門醫에게 設問書를 配布하여 調査期間中 總 7 名의 同性戀愛患者가 記入한 設問書를 收去하였다. 이 7 名의 病的인 狀況에 處한 同性戀愛者는 健康하다고 생각하며 酒店을 出入하며 顧客調查에 應하였던 同性戀愛群과는 相異할 것이라고 判斷하여 參與資料로만 活用하고 最終分析對象에서 除外하였다.

2.8 血液採取

性因性 疾患診斷과 HIV 抗體檢査를 為하여 業主 및 從業員으로부터 血液을 採取하고자 國立保健院의 AIDS 센터, 서울市 鐘路區 保健所, 本 調査팀의 混成 血液採取班을 編成하여 <表2-2>에서와 같이 業主 20 名, 從業員 42 名 각各 95% 및 89%의 血液收檢率을 完了하였다.

2.9 業所施設實態調查

21 個 全業所에 對하여 各業所의 施設規模, 許可狀況, 健康手帖所持如否等 營業運營에 關係된 諸般狀況을 調査하였다.

3. 調査의 制限點

本調査의 制限點으로

첫째, 酒店을 出入하는 同性戀愛者에 限하여 調査가 이루어졌으므로 同性戀愛者中 飲酒選好의 同性戀愛者群에 限한 情報를 提示할 뿐이며 非飲酒 同性戀愛者에 關해서는 아무런 情報도 提示못하는 脆弱點이 있으며
둘째, 顧客에 對한 調査는 業主와 從業員에게 設問書를 委託하여 이들이 自身과 親分이 두터운 親知(同性戀愛者)에게 設問書를 配布하여 收去한 것임으로 客觀的인 觀點에서는 調査의 信賴度에 疑問을 提起할 수 있다는 것과

셋째, 業主 및 從業員에 對한 調査는 調査팀의 現場參觀下에 本人들이 直接 設問書에 記入하여 提出하였기 때문에 故意로 不誠實하게 記載하지 않는 限에서는 信賴度에는 再論할 餘地가 없으나 설혹 全體調查對象數의 90%以上의 調査가 이루어졌다 하더라도 設問書完了數가 64名밖에 되지 않아서 細部的인 項目別分析은 觀察數가 적기 때문에 不可能하다는 制約點과

넷째, 本 調査는 全國大都市를 母集團으로 實施한 標本調查가 결코 아니기 때문에 他都市에 一般化할 수 없다는 點이 本調査의 限界性으로 보여진다.

第Ⅲ章 資料分析

研究對象으로 調査된 男性 同性戀愛者數는 同性戀愛者 專用酒店의 顧客(對象Ⅰ) 377名, 同性戀愛者로 알려진 業主 및 從業員(對象Ⅱ) 64名, 神經精神科 來院 患者 7名으로 모두 448名이 調査되었으나 神經精神科를 통한 調査資料(7名)는 除外하고 專用酒店을 통해 調査된 441名의 資料에만 局限하여 分析하였으며, 그 結果는 다음과 같다.

1. 調査對象者의 社會, 人口學的 特性

1) 年 齡

調查對象者の 年齃分布 <表3-1>를 10歲 간격으로 보았을때 20 ~ 29歲가 51.3%로 가장 많고, 다음으로 30 ~ 39歲가 31.3%로 나타났으며, 50歲 以上의 構成比率은 3.9%로 極히 적은 比率을 보여준다.

<表3-1> 調查應答者の 社會·人口學의 特性分布(%)

特 性	全 體 **		對象 I *		對象 II †	
	%	N	%	N	%	N
<u>年 齡</u>						
計	100.0(437)		100.0(374)		100.0(63)	
19 歲 이하	2.5	(11)	2.7	(10)	1.6	(1)
20 ~ 29	51.3	(224)	51.9	(194)	47.6	(30)
30 ~ 39	31.3	(137)	31.5	(118)	30.1	(19)
40 ~ 49	11.0	(48)	10.2	(38)	15.9	(10)
50 歲 이상	3.9	(17)	3.7	(14)	4.8	(3)
<u>教育水準</u>						
計	100.0(436)		100.0(373)		100.0(63)	
中卒以下	7.6	(33)	7.8	(29)	6.4	(4)
高卒	39.7	(173)	38.9	(145)	44.4	(28)
大卒 以上	52.7	(230)	53.3	(199)	49.2	(31)
<u>結婚狀態</u>						
計	100.0(437)		100.0(374)		100.0(63)	
未婚	71.1	(310)	71.0	(265)	71.4	(45)
有配偶	24.4	(107)	25.0	(94)	20.6	(13)
離婚·別居·死別	4.5	(20)	4.0	(15)	8.0	(5)

* 對象 I : 同性戀愛者 專用酒店의 顧客

† 對象 II : 上記 酒店의 業主 및 從業員

** 無應答의 경우는 除外함.

2) 教育水準

調查應答者の 教育水準은 專門大學을 포함한 大學卒業者가 52.7 %로

가장 많고, 다음 高卒이 39.7%, 中卒以下도 7.6로 나타났다

2) 結婚狀態

結婚狀態 <表3-1>를 보면은 未婚이 71.1%, 婦人이 있는 有配偶者가 24.4%, 離婚·別居·死別 狀態가 4.5%로 나타났으며, 이를 年齡別<表3-2>로 보면 20~29 歲 群의 경우 96.4%가 未婚者이

<表3-2> 調査應答者 年齡別 結婚狀態分布(%)

年 齡	結 婚 狀 態			
	% (N)	未 婚	有 配 偶	離 婚 · 別 居 死 別
<u>全 體</u>				
計	100.0(437)	71.2	24.4	4.5
19 才 以 下	100.0(11)	100.0	-	-
20 ~ 29 才	100.0(224)	96.4	3.2	0.4
30 ~ 39 才	100.0(137)	56.2	38.7	5.1
40 ~ 49 才	100.0(48)	10.4	70.8	18.8
50 才 以 上	100.0(17)	11.8	70.6	17.6
<u>對 象 I</u>				
計	100.0(374)	71.1	24.9	4.0
19 才 以 下	100.0(10)	100.0	-	-
20 ~ 29 才	100.0(194)	95.9	3.6	0.5
30 ~ 39 才	100.0(118)	55.1	41.5	3.4
40 ~ 49 才	100.0(38)	7.9	71.1	21.0
50 才 以 上	100.0(14)	14.3	71.4	14.3
<u>對 象 II</u>				
計	100.0(63)	71.9	20.3	7.8
19 才 以 下	100.0(1)	100.0	-	-
20 ~ 29 才	100.0(30)	100.0	-	-
30 ~ 39 才	100.0(19)	63.2	21.0	15.8
40 ~ 49 才	100.0(10)	20.0	70.0	10.0
50 才 以 上	100.0(3)	-	66.7	33.3

고 30代群, 40代群, 50歲以上 群에서는 각각 56.2%, 10.4%, 11.8%가 未婚者로 나타났다.

4) 現居住地 및 居住形態

調查對象者中 顧客의 現居住地 分布<表3-3>를 보면은, 서울市에 居住하고 있는 사람이 81.2%, 서울市外의 居住者가 18.8%(67名)로 나타났다.

또한 業主 및 從業員의 現居住地 分布<表3-4>는 “勤務하고 있는 業所 内에 居住하고 있다”가 28名(43.8%)으로 가장 많고, 다음으로 “勤務하고 있는 業所近處에 居住하고 있다”가 21名(32.8%)으로 大部分의 從業員은 業所가 있는 鐘路區 樂園洞 一帶에 居住하고 있는 것으로 나타났다.

顧客의 現居住形態<表3-5>를 보면은 “家族과 함께 居住하고 있다”고 應答한 사람이 62.4%로 가장많고, 다음으로 혼자서 自炊 또는 下宿하고 있다”가 21.19% 나타났으며, 특히 “其他”라고 應答한 顧客中에는 같은 男性 同性戀愛者와 同居하고 있다고 答한 사람도 있었다.

<表3-3> 對象I의 現居住地 分布

居 住 地	% (N) *
計	100.0(357)
서울市內	81.2(290)
京畿道 市地域	10.1(36)
京畿道 郡地域	1.4(5)
直轄市	3.9(14)
其他地域	3.4(12)

* 無應答者 除外

<表 3-4> 對象Ⅱ의 現居住地分布(%)

居 住 地	% (N)
計	100.0(64)
勤務하고 있는 業所近處	32.8(21)
勤務하고 있는 業所內	43.8(28)
서울市 鐘路區 外 他區	17.2(11)
其他地域	6.2(4)

<表 3-5> 對象Ⅰ의 現居住形態別 分布(%)

居 住 形 態	% (N)
計	100.0(375)
家族과 함께 居住	62.4(234)
혼자서 自炊 또는 下宿	21.9(82)
다른사람과 함께 自炊 또는 下宿	9.9(37)
寄宿舍에 居住	3.7(14)
其 他	2.1(8)

顧客의 結婚狀態別 居住形態別 <表 3-6>를 보면은 未婚者인 경우 應答者 51.7 %가 家族과 함께 居住하고 있는 反面, 有配偶者는 大部分 (95.7 %)이 家族과 함께 居住하고 있는 것으로 나타났다.

<表3-6> 對象 I(顧客)의 結婚狀態別 現居住形態分布(%)

結婚狀態	計 N * %	家族과 함께 住	혼자서 居	自炊또 는下宿	다른사 람과같 이自炊 또는 下宿	寄宿舍 에 居 住	其他
		62.3	21.9	9.9	3.8	2.1	
計	374 100.0						
未 婚	265 100.0	51.7	26.8	14.0	4.9	2.6	
有配偶	94 100.0	95.7	3.2	-	1.1	-	
未婚・別居・ 死別	15 100.0	40.0	53.3	-	-	6.7	

* 無應答者 除外

5) 所得水準

應答者 354 名의 月平均 所得水準<表3-7>을 보면은 40 ~ 60萬원 이 33.3 %로 가장많고, 그 다음으로 20 ~ 40 萬원이 25.4 %, 60 ~ 80 萬원이 13.8 % 順이며, 100 萬원 以上의 所得者도 53名(15.0 %)이나 있는가 하면은 20 萬원 未滿의 低所得者도 19名(5.4 %)이 있는 것으로 나타나 顧客의 所得 階層間 分布가 多樣한 것을 볼 수 있다.

<表 3-7> 對象 I 의 月平均所得水準의 分布(%)

月 所 得 額	% (N) *
計	100.0(354)
20 萬원未滿	5.4(19)
20 萬원 40 萬원 未滿	25.4(90)
40 萬원 60 萬원未滿	33.3(118)
60 萬원 ~ 80 萬원未滿	13.8(49)
80 萬원 ~ 100 萬원未滿	7.1(25)
100 萬원 ~ 150 萬원未滿	9.9(35)
150 萬원以上	5.1(18)

* : 無應答者 除外

2. AIDS에 對한 認識 및 行態

1) 認知度 및 認知經路

“AIDS”라는 疾病에 대해 알고 있느냐?는 設問에 應答한 440 名의 應答分布<表 3-8>를 보면 “알고있다”고 應答한 사람은 84.7%이고, 對象 I 群에 비해 對象 II 群에서 높은 認知率로 나타났다.

AIDS를 알고 있다고 應答한 377 名의 認知經路<表 3-9>를 보면 은 新聞, 雜誌가 70.7%, T V, 라디오 68.7%, 전문서적 23.1%, 친구, 선·후배, 직장동료 17.4%로 新聞, 雜誌를 통해 알게된 사람이 가장 많은 것으로 나타났다.

AIDS에 대한 認知與否를 年齡階層 <表 3-10>로 보면 40 ~ 49 歲群에서 “알고 있다”고 應答한 率이 93.7%로 他年齡階層에 비해 높게 나타났으며, 調查對象者の 教育水準別<表 3-11>로 보면 教育水準

<表 3-8> 應答者의 AIDS에 對한 認知分布率(%)

認 知 如 否	全 體		對 象 I		對 象 II	
	%	N	%	N	%	N
計	100.0	440	100.0	376	100.0	64
알 고 있 다	84.7	373	84.3	317	87.5	56
모 른 다	15.3	67	15.7	59	12.5	8

<表 3-9> AIDS를 認知하게된 經路分布(%)

經 路 *	全 體		對象 I		對象 II	
	(N = 373)	(N = 317)	(N = 317)	(N = 56)	(N = 56)	
新聞 · 雜誌	70.7		70.9		70.0	
T V · 라디오	68.7		71.5		53.3	
專門書籍	23.1		26.1		6.7	
친구 · 선후배 · 직장동료	17.4		19.3		6.7	
醫療機關	6.2		6.1		6.7	
其 他	1.0		1.2		-	

* 1 個에 局限되지 않고 重複이 많음

이 높은 大學卒業 以上群에서 90.4 %로 가장 높게 나타났다.

應答者의 主觀的 判斷에 의해 AIDS를 알고 있다고 應答한 群이 어느정도 실제로 AIDS에 대해 認知하고 있는가를 分析하기 위하여 設問한 AIDS의 症狀,豫防, 感染經路 等과 관련된 5個 問項의 應答結果 <表 3-12>를 보면은 “AIDS 환자의 첫증상은 감기나 몸살과 비슷

<表3-10> AIDS認知에對한年齢分布(%)

年 齡	計		A I D S	
	%	N*	알고있다	모른다
<u>全 體</u>				
計	100.0	(438)	87.7	12.3
19 세 이 하	100.0	(11)	63.6	36.4
20 ~ 29 세	100.0	(225)	84.4	15.6
30 ~ 39 세	100.0	(137)	93.4	6.6
40 ~ 49 세	100.0	(48)	93.7	6.3
50 세 이 상	100.0	(17)	82.4	17.6
<u>對 象 I</u>				
計	100.0	(374)	86.6	13.4
19 세 이 하	100.0	(10)	60.0	40.0
20 ~ 29 세	100.0	(194)	83.5	16.5
30 ~ 39 세	100.0	(118)	92.4	7.6
40 ~ 49 세	100.0	(38)	94.7	5.3
50 세 이 상	100.0	(14)	78.6	21.4
<u>對 象 II</u>				
計	100.0	(64)	93.8	6.2
19 세 이 하	100.0	(1)	100.0	-
20 ~ 29 세	100.0	(31)	90.3	9.7
30 ~ 39 세	100.0	(19)	100.0	-
40 ~ 49 세	100.0	(10)	90.0	10.0
50 세 이 상	100.0	(3)	100.0	-

* 無應答者 除外

<表 3-11> 應答者の 教育水準別 AIDS 認知分布(%)

教育水準	計 % (N)*	AIDS	
		알고 있다	모른다
<u>全體</u>			
計	100.0 (437)	87.9	12.1
國卒以下	100.0 (8)	87.5	12.5
中卒	100.0 (25)	84.0	16.0
高卒	100.0 (174)	85.1	14.9
大卒以上	100.0 (230)	90.4	9.6
<u>對象 I</u>			
計	100.0 (373)	86.9	13.1
國卒以下	100.0 (7)	85.7	14.3
中卒	100.0 (22)	81.8	18.2
高卒	100.0 (145)	83.4	16.6
大卒以上	100.0 (199)	89.9	10.1
<u>對象 II</u>			
計	100.0 (64)	93.8	6.2
國卒以下	100.0 (1)	100.0	
中卒	100.0 (3)	100.0	
高卒	100.0 (29)	93.1	6.9
大卒以上	100.0 (31)	93.5	6.5

* 無應答者 除外

하다”라는設問에對한正答率은 85.9%, “AIDS에 걸린妊娠한女子가 낳는 아이는 AIDS에 걸리지 않는다”의正答率은 90.6%, “性行爲時 콘돔을使用하면破損되지 않는한AIDS에 걸리지 않는다”는 82.3%, “AIDS患者와握手만하여도AIDS에 걸릴危險이 높다”는問項에對한正答은 94.3%, “一回用새주사기使用이AIDS豫防의한方法이다”에對해서는 94.6%로나타났으며콘돔use에關한知識이가장낮은分布로나타났다.

〈表 3-12〉 應答者的 AIDS 知識水準에 對한 問項內容別
正誤百分率 (%)

* 無應答者 除外

또한 각問項에 對한 正答을 1점씩 하여 5個의 正答을 合計한 分布 <表3-13>를 보면은 5個問項 모두 마친 應答者는 51.8%이고 4個問項을 21.8%, 3個問項을 8.9%의 順으로 나타났으며, 5個問項全部 틀린 사람도 15.2%나 된다.

<表3-13> 應答者의 AIDS 問項에 對한 正答百分率 (%)

點 數 *	全 體		對 象 I		對 象 II	
	N	%	N	%	N	%
計	440	100.0	376	100.0	64	100.0
5 점	228	51.8	198	52.7	30	46.9
4 점	96	21.8	74	19.7	22	34.4
3 점	39	8.9	32	8.5	7	10.9
2 점	7	1.6	6	1.6	1	1.6
1 점	3	0.7	3	0.8	0	0.0
0	67	15.2	63	16.7	4	6.2

* <表3-12>의 各問項에 對한 正答을 一점으로 計算.

2) AIDS에 대한 認識

調查對象者の AIDS에 대한 認識을 分析하기 위해 設問한 “현재 우리나라에도 AIDS 감염자가 증가하고 있는 것에 대해 어느정도 두려움을 느끼고 있는가?”에 對한 應答分布 <表3-14>를 보면 “두렵다”고 認識하고 있는 사람은 42.6%이고, “두렵지 않다”고 答한 사람은 26.0%로 나타났다.

〈表 3 - 14〉 HIV 感染者增加에 對한 두려운 정도 百分率(%)

程 度	全 體		對 象 I % (N)	對 象 II % (N)
	%	(N)*		
計	100.0	(439)	100.0 (375)	100.0 (64)
두 렵 다	42.6	(187)	41.9 (157)	46.9 (30)
보 통 이 다	31.4	(138)	31.2 (117)	32.8 (21)
두 렵지 않다	26.0	(114)	26.9 (101)	20.3 (13)

*無應答者 除外

또한 “HIV 感染者중 동성연애자가 많다는 사실을 알고 있는가? “앞으로 AIDS를 어떻게 豫防하겠는가?”의 應答結果 〈表 3 - 15 및 表 3 - 16〉를 보면은 그러한 事實을 알고 있다는 사람이 77.7 %이고, 이러한 事實을 알고 있는 342 名의 向後 AIDS 豫防對策 〈表 3 - 16〉으로는 “모르는 사람하고는 절대로 동성연애를 하지 않겠다”가 38.6 %, “외국인과는 절대로 동성연애를 하지 않겠다”가 32.2 %, “동성연애를 할때마다 반드시 콘돔을 사용하겠다”가 26.9 %의 順으로 나타났다.

〈表 3 - 15〉 “HIV 感染者中 同性戀愛者가 많다”는 事實을 알고 있는 應答者의 分布

對 象	計		알고 있다	모 른 다
	N	%		
全 體	440	100	77.7	22.3
對 象 I	376	100	77.1	22.9
對 象 II	64	100	81.3	18.7

〈表 3 - 16〉 “HIV 感染者中 同性戀愛者가 많다는 事實을 알고 있는
應答者의豫防을 為한 選好行態의 分布(%)^{*}

選 好 行 態	全 體	對 象 I	對 象 II
	(N = 342)	(N = 290)	(N = 52)
모르는 사람하고는 절대로 同性戀愛 를 하지 않겠다	38.6	40.0	30.8
동성연애를 할 때마다 반드시 콘돔을 사용하겠다	26.9	29.0	15.4
外國人과는 절대로 동성연애를 하지 않겠다	32.2	29.7	46.2
同性戀愛를 하지 않겠다	4.7	2.8	15.4
其 他	9.1	9.3	6.3

※ 選好行態의 選定은 重複選擇이 可能케 하였으므로 各項의 合計는
100 %를 超過

3) HIV 抗體檢查 受檢實態

3.1 既 受檢實態

現在 “HIV” 的 一次 選別檢查가 가능한 檢查機關은 一般 痘・醫院, 國立保健院, 市・道 保健研究所, 國立檢疫所, 韓國健康管理協會, 大韓赤十字社 血液院 等이다. 이러한 機關을 통해 누구나 檢查를 받을 수 있다. 따라서 HIV 感染 高危險 集團인 同性戀愛者의 既 受檢率 〈表 3 - 17

을 보면은 應答者 483 名中 45.4 %가 檢查를 이미 받았고, 既受檢者 199 名의 受檢事由別 百分率(表 3-18)에서는 “獻血을 통해 檢查를 받아 보았다”고 應答한 사람이 48.2 %로 가장많고, 保健所에서 檢查를 받아보고 싶어서 檢查를 받아 보았다”가 30.2 %, “病・醫院에서 檢查를 받아보고 싶어서” 18.1 %의 順으로 나타 났으며 對象 I은 献血을 통해, 對象 II는 保健所를 통해 주로 檢查를 받은 것으로 나타났다.

〈表 3-17〉 應答者의 HIV抗體検査 受検率(%)

對 象	N	%	受 檢	未 受 檢
I	374	100	43.9	56.1
II	64	100	54.7	45.3
計	438	100	45.4	54.6

〈表 3-18〉 既受檢者의 受檢事由別 百分率(%)

受檢事由	全 體 N = 199	對 象 I N = 164	對 象 II N = 35
計	100.0	100.0	100.0
保健所에서 檢查를 받아보고 싶어서	30.2	23.2	62.9
病・醫院에서 檢查를 받아보고 싶어서	18.1	19.5	11.4
獻血하면서	48.2	53.6	22.8
其 他	3.5	3.7	2.9

検査를 받아보지 않았다고 應答한 239 名의 未受檢 事由 <表 3-19> 를 보면 “검사받을 필요가 없다고 생각되어서” 가 54.0 %로 가장 많고, 어디서 검사받는지를 몰라서 ”가 20.1 %, “검사받는 것이 창피해서 ” 10.5 %의 順으로 나타났다.

<表 3-19> 未受檢者의 理由別 百分率 (%)

未受檢理由	全體 (N=239)	對象 I (N=210)	對象 II (N=29)
計	100.0	100.0	100.0
検査할 必要가 없다고 생각되어서	54.0	53.3	58.6
検査받는 것이 창피해서	10.5	11.5	3.4
検査結果가 두려워서	5.8	5.2	10.3
어디서 하는지를 몰라서	20.1	21.9	6.9
身分露出이 두려워서	7.1	6.2	13.8
其 他	2.5	1.9	6.9

調查對象者の 結婚狀態別로 受檢實態(表 3 - 20)를 보면 未婚者の 경우 45.7%가 檢查를 받았고, 有配偶者は 47.7%가 檢查를 받았다고應答하였다.

HIV 感染의 危險한 同性變愛 性行態로서는 肛門性行爲로 HIV傳染과 密接한 關聯이 있다고 한다. 이와 관련하여 肛門性行爲를 한다고 應

<表 3 - 20> 應答者の 結婚狀態別 HIV 抗體検査 既受檢百分率 (%)

結 婚 狀 態	計		受 檢	未受檢
	%	(N)*		
全 體				
計	100.0	(439)	45.5	54.5
未 婚	100.0	(312)	45.7	54.3
有 配 偶	100.0	(107)	47.7	52.3
離 婚 · 別 居 · 死 別	100.0	(20)	30.0	70.0
對 象 I				
計	100.0	(376)	43.9	56.1
未 婚	100.0	(267)	43.8	56.2
有 配 偶	100.0	(94)	45.7	54.3
離 婚 · 別 居 · 死 別	100.0	(15)	33.3	66.7
對 象 II				
計	100.0	(63)	54.7	45.3
未 婚	100.0	(45)	56.5	43.5
有 配 偶	100.0	(13)	61.5	38.5
離 婚 · 別 居 · 死 別	100.0	(5)	20.0	80.0

* 無應答者 除外

答한 群의 HIV抗體 受檢率 <表 3-21>은 44.5 %이며 肛門性行爲를 하지 않는다고 應答한 群의 受檢率은 47.5 %이다.

<表 3-21> 性行爲 行態別 HIV抗體検査 既受檢百分率 (%)

性行爲行態	計		受 檢	未受檢
	%	(N)*		
全 體	100.0	(436)	45.2	54.8
肛門性行爲함	100.0	(335)	44.5	55.5
肛門性行爲하지 않음	100.0	(101)	47.5	52.5
對 象 I				
肛門性行爲함	100.0	(306)	44.1	55.9
肛門性行爲하지 않음	100.0	(69)	42.0	58.9
對 象 II				
肛門性行爲함	100.0	(29)	48.3	51.7
肛門性行爲하지 않음	100.0	(32)	59.4	40.6

* 無應答者 除外

우리나라 實情으로 비추어 볼때 에이즈 感染의 危險度가 가장 높다고 생각되는 外國人과의 同性戀愛 經驗有無別로 受檢實態 <表 3-22>를 보면 外國人과 同性戀愛經驗이 “있다”고 應答한 65名中 63.1%가 檢查를 받았다고 應答하였고, 經驗이 없는 群은 42.0%로 나타났다.

〈表3-22〉 外國人과의 同性戀愛 經驗有無別 HIV抗體検査
既受檢百分率 (%)

外國人과의 同性戀愛	計		受 檢	未 受 檢
	%	(N)*		
全 體	100.0	(436)	45.2	54.8
경 험 있 음	100.0	(65)	63.1	36.9
경 험 없 음	100.0	(371)	42.0	58.0
對 象 I				
경 험 있 음	100.0	(54)	64.8	35.2
경 험 없 음	100.0	(320)	40.0	60.0
對 象 II				
경 험 있 음	100.0	(11)	54.5	45.5
경 험 없 음	100.0	(51)	54.9	45.1

* 無應答者 除外

3.2 向後 受檢用意 및 受檢方法

앞으로 HIV抗體 檢査를 便利하게 받을 수 있도록 措置한다면은 定期的으로 檢査를 받겠느냐?의 設問에 對한 應答分布〈表3-23〉를 보면 “檢査를 받겠다”고 受檢用意 意思를 밝힌 사람은 全體의 64.3%이고, 對象II가 對象I보다 높은 受容度를 보여줬으며, “받지 않겠다”고 否定的인 意思를 나타낸 사람은 13.0%로 나타났다.

受檢 意思를 밝힌 281名의 願하는 便宜事項 分布〈表3-24〉는 “남의 눈에 띠지 않는 장소에서 身分을 밝히지 않는 방법”이 43.8%로 가장 많고, 그 다음으로 對象I은 “모든 진료기관에서 本人의 要求에

〈表3-23〉 向後 HIV抗體検査에 對한 受容度 (%)

受容意思	全體*	對象 I	對象 II
	(N=437)	(N=374)	(N=63)
検査에 應하겠다.	64.3	59.9	90.5
検査에 應하지 않겠다.	13.0	13.9	7.9
모르겠다.	22.7	26.2	1.6
計	100.0	100.0	100.0

* 無應答者 除外

〈表3-24〉 HIV抗體検査의 用意者가 選定한 便宜別 百分率 (%)

便宜內容	全體	對象 I	對象 II
	N=281	N=224	N=57
計	100.0	100.0	100.0
남의 눈에 띠지 않는 장소에서 신분을 밝히지 않는다면	43.8	43.3	45.6
남의 눈에 띠는 장소라도 신분만 밝히지 않는다면	11.0	12.1	7.0
신분을 밝히더라도 남의 눈에 띠지 않는 장소에서라면	8.2	9.8	1.8
신분도 밝히고 남의 눈에 띠는 장소라도 편리하기만 하면	12.5	11.6	15.8
모든 진료기관에서 본인의 요구에 따라 받을 수 있다면*	18.1	22.8	-
오늘과 같이 업소에 와서 해 주었으면**	6.0	-	29.8
기타	0.4	0.4	-

* : 대상 I에만 질문함.

** : 대상 II에만 질문함.

따라 받을 수 있는 방법”이 18.1 %, 對象Ⅱ는 本 調査와 함께 本人들이 勤務하는 業所에 檢査팀이 직접 來所하여 採血하여 주는 方法을 願하는 사람이 29.8 %로 나타났다.

HIV 感染者 增加에 대해 느끼는 두려움 程度에 따라 受檢用意(表 3-25)를 보면 “두렵다”고 應答한 群의 경우가 79.1 %가 “檢査를 받겠다”고 應答하였고 “두렵지 않다”고 答한 群은 41.3 %가 “받겠다”고 答하였다. 또한 HIV 感染者 中 同性戀愛者가 많다는 知識의 有無에 따른 受檢用意(表 3-26)를 보면 “알고 있다”고 應答한 群은 70.7 %가, “모르고 있다”고 答한 群은 42.9 %가 檢査를 받을 用意가 있다고 答하였다.

〈表 3-25〉 HIV 感染者增加에 對한 두려움別 抗體検査 *
用意 百分率 (%)

두려움 程度	計(N) ^{**}	검사에 응하겠음	검사에 응하지 않겠음	모르겠음
<u>全體</u>	100.0 (438)	64.4	13.0	22.6
두렵다	100.0 (187)	79.1	5.9	15.0
보통이다	100.0 (137)	63.5	9.5	27.0
두렵지 않다	100.0 (114)	41.3	28.9	29.8
<u>對象 I</u>				
두렵다	100.0 (157)	77.1	5.7	17.2
보통이다	100.0 (117)	57.3	11.1	31.6
두렵지 않다	100.0 (101)	36.6	29.7	33.7
<u>對象 II</u>				
두렵다	100.0 (30)	90.0	6.7	3.3
보통이다	100.0 (20)	100.0	-	-
두렵지 않다	100.0 (13)	76.9	23.1	-

* : HIV 抗體検査

** : 무응답자 3 명 제외

〈表 3-26〉 HIV感染의 知識 * 有無에 따른
抗體検査用意度 (%)

知 識	計 (N) **	検査에 應하겠음	検査에 應하지 않겠음	모르겠음
<u>全體</u>	100.0 (440)	64.5	13.0	22.5
안다	100.0 (342)	70.7	12.6	16.7
모른다	100.0 (98)	42.9	14.3	42.8
<u>對象 I</u>				
안다	100.0 (290)	66.9	13.8	19.3
모른다	100.0 (86)	37.2	14.0	48.8
<u>對象 II</u>				
안다	100.0 (52)	92.2	5.8	2.0
모른다	100.0 (12)	83.3	16.7	-

* : “HIV感染者中 同性戀愛者가 많다”

** : 무응답자 제외

4) 콘돔 使用實態

同性間 性行爲時 콘돔 使用實態〈表 3-27〉를 보면 肛門 性行爲者 334 名의 경우 83.8 %가 “서로 사용하지 않는다”고 應答하였고, ORAL 性行爲를 한다고 應答한 372 名의 경우는 89.2 %가 사용하지 않는다고 答하였다.

AIDS 知識有無를 알아보기 위한 設問中 “AIDS豫防의 한 방법이 콘돔사용이다”에 “그렇다”고 대답한 群의 콘돔使用實態〈表 3-28〉를 보면은 83.1 %가 서로 使用하지 않는다고 答하여, 콘돔 使用이 AIDS豫防의 한 方法인줄 알면서도 실제로는 대부분 使用하지 않고 있어 콘

<表 3-27> 同性間 性行爲別 콘돔使用實態 (%)

性 行 爲	全 體	對 象 I	對 象 II
<u>(肛門 性行爲時)</u>			
(N) ¹⁾	(334)	(306)	(28)
計	100.0	100.0	100.0
나와 相對方이 반드시 使用	9.3	9.8	3.6
서로 사용하지 않음	83.8	84.7	74.9
相對方에 關係없이 사용	4.8	3.5	17.9
相對方에 사용토록 勸誘	2.1	2.0	3.6
.....			
<u>ORAL 性行爲時</u>			
(N) ²⁾	(372)	(329)	(43)
計	100.0	100.0	100.0
나와 相對方이 반드시 使用	5.1	4.6	9.3
서로 使用하지 않음	89.2	89.7	86.0
相對方에 關係없이 사용	3.8	3.6	4.7
相對方에 사용토록 勸誘	1.9	2.1	-

1) 肛門性行爲를 하지 않는다고 표記한 應答者 除外

2) 無應答者 및 ORAL性行爲를 하지 않는다 표記한 應答者 除外

돔 使用에 대한 弘報・啓蒙教育이 보다 強化되어야 할 것이다.

〈表 3-28〉 콘돔의 AIDS豫防에 對한 知識有無別
肛門性行爲時 콘돔使用實態 (%)

知 識 有 無	計 (N)*	나와 相對方이 반드시 使用 use	서로 使用하지 않음	相對方에 관계없이 使用	相對方에 使用토록 勸誘
計	100.0(281)	8.5	83.7	5.7	2.1
<u>全體</u>					
知識있음	100.0(237)	8.4	83.6	5.9	2.1
知識없음	100.0(44)	9.1	84.0	4.5	2.3
<u>對象 I</u>					
知識있음	100.0(216)	9.3	84.6	4.2	1.9
知識없음	100.0(39)	10.3	82.0	5.1	2.6
<u>對象 II</u>					
知識있음	100.0(21)	-	71.4	23.8	4.8
知識없음	100.0(5)	-	100.0	-	-

* 항문 성행위를 하지 않는다(101명), 콘돔의豫防效果에 대해서 모른다(54명), 무응답자 5명 제외

3. AIDS에 대한 相談, 弘報, 啓蒙의 必要性에 對한 認識

급속한 傳染과 높은 致命率을 보이고 있는 AIDS는 아직까지豫防을 위한 백신이나 治療方法의 開發이 되지 않아 오직 弘報·啓蒙教育을 통한豫防만이 유일한 方法으로 提示되고 있다. 이러한 觀點에서 調查對象者の AIDS에 대한 相談, 弘報·啓蒙 要求와 要求內容等을 蒐集한 調査資料의 分析結果는 다음과 같다.

1) 相談

AIDS에 대하여 相談서비스를 願하고 있는지의 實態(表 3-29)와 相談을 願하는 경우 選好하는 相談方法, 相談所의 設置場所, 相談役의 分布

(表 3-29) AIDS에 對한 相談서비스 希望 百分率 (%)

相談 서비스	全體 N = 440	對象 I N = 376	對象 II N = 64
計	100.0	100.0	100.0
願한다	54.3	52.9	62.5
願하지 않는다	45.7	47.1	37.5

*無應答者 除外

(表 3-30)와 相談을 願하지 않는 경우 그 事由別 分布(表 3-31)를 보면, 全體 應答者 440名中 54.3%가 相談을 願한다고 應答하였으며, 이들이 願하는 相談方法으로는 “相談電話가 있으면 전화로 하는방법”이 53.8%로 가장 많고 그다음으로 “상담소 방문과 전화상담 두가지 모두가 좋다”고 應答한 사람이 32.4%로 나타났다.

選好하는 相談所 設置場所로는 “身分證確認 없이出入이 自由롭고 一般에게 露出되지 않는 場所”가 75.5%로 가장 높게 나타났으며, 選好하는 相談役(者)으로는 醫師가 56.0%, 心理學子 40.2%로 나타났다.

相談을 願하지 않는다고 應答한 群의 事由로는 “AIDS에 대해 이미 알고 있기 때문에”가 42.3%로 가장 많고 그다음으로 “특별한 이유가 없다”가 34.8%로 나타났다.

〈表 3-30〉 AIDS에 對한 相談서비스 運營時 應答者가
選好하는 相談方法, 場所, 相談役의 分布(%)

相 談	全 體	對 象 I	對 象 II
<u>相 談 方 法</u>			
(N)	(239)	(199)	(40)
計	100	100	100
相談所가 있으면 찾아가서	13.4	12.6	17.5
相談所가 있으면 電話로	53.8	54.5	50.0
위 두가지 方法 모두	32.4	32.3	32.5
其 他	0.4	0.6	-
<u>相 談 場 所</u>			
(N)	(237)	(197)	(40)
計	100	100	100
特殊病院	5.1	5.1	5.0
保健所等의 公共機關	13.5	9.6	32.5
一般病院	4.6	5.1	2.5
身分證 없이 出入이 自由로운 露出 된지 않는 場所	75.5	78.7	60.0
其 他	1.3	1.5	-
.....			
<u>相 談 役</u>			
(N)	(234)	(194)	(40)
計	100	100	100
醫 師	56.0	54.2	65.0
看 護 士	2.1	1.5	5.0
心 理 學 者	40.2	42.8	27.5
其 他	1.7	1.5	2.5

〈表 3-31〉 AIDS에 對한 相談不願者의 事由分布 百分率(%)

相 談 不 頗 事 由	全 N = 201	對 象 I N = 177	對 象 II N = 74
計	100.0	100.0	100.0
AIDS에 대해 이미 알고 있어서	42.3	41.2	50.0
귀찮아서	9.5	10.2	4.2
창피해서	1.5	1.7	--
AIDS에 感染될 機會가 없다고 생각되어 특별한 이유 없이	11.4 33.8	10.7 35.0	16.7 25.0
其 他	1.5	1.2	4.1

또한 年齡階層別 〈表 3-32〉로 보면 20~29 歲群에서 相談을 須한다고 應答한 率이 62.2 %로 가장높게 나타났으며, 30 代는 48.9 %, 40 代는 37.5 %로 나타났다.

〈表 3-32〉 年令別 AIDS에 對한 相談希望 百分率(%)

年 令	計		相 談 希 望	相 談 不 頗
	N	%		
全 體 *	438	100.0	54.3	45.7
19세 이하	11	100.0	(45.4)	(54.6)
20 - 29	225	100.0	62.2	37.8
30 - 39	137	100.0	48.9	51.1
40 - 49	48	100.0	(37.5)	(62.5)
50세 이상	17	100.0	(47.0)	(53.0)

年 令	計		相談希望	相談不願
	N*	%		
<u>對象 I</u>	374			
19세 이하	10	100.0	(40.0)	(60.0)
20 - 29	194	100.0	61.3	38.7
30 - 39	118	100.0	44.0	56.0
40 - 49	38	100.0	42.1	57.9
50세 이상	14	100.0	(42.8)	(57.2)
<u>對象 II</u>	64			
19세 이하	1	100.0	(100.0)	
20 - 29	31	100.0	67.7	32.3
30 - 39	19	100.0	73.7	(26.3)
40 - 49	10	100.0	(20.0)	(80.0)
50세 이상	3	100.0	(66.7)	(33.3)

*무응답자 3명 제외 () : 관찰치 10例 以下

〈表 3-33〉 結婚狀態別 AIDS에 對한 相談希望 百分率

	計		相談要求	相談不要求
	N*	%		
<u>全體</u>	(440)	100.0	54.3	45.7
미 혼	(313)	100.0	59.7	40.3
유 배 우	(107)	100.0	44.9	55.1
이혼, 사별, 별거	(20)	100.0	20.0	80.0
<u>對象 I</u>				
미 혼	(267)	100.0	58.1	41.9
유 배 우	(94)	100.0	44.7	55.3
이혼, 사별, 별거	(15)	100.0	13.3	86.7
<u>對象 II</u>				
미 혼	(46)	100.0	69.6	30.4
유 배 우	(13)	100.0	46.2	53.8
이혼, 사별, 별거	(5)	100.0	40.0	60.0

*무응답 제외

應答者の 結婚狀態別(表 3-33)로 보면 未婚者는 59.7%, 有配偶者는 44.9%가 願하고 있는 것으로 나타났다.

2) 弘報 및 啓蒙

AIDS에 대한 弘報·啓蒙의 必要性에 對한 應答者の 認識與否(表 3-34)를 보면 應答者 440名中 275名(62.5%)이 必要하다고 應答하였고, 願하는 方法(表 3-35)으로는 “相談電話設置”가 57.5%로 가장 많고, “T·V·라디오 放映이 51.6%, “印刷物을 製作하여 配布”가 47.6%, “相談所를 設置 運營하는 方法”이 35.6% 등으로 나타났다.

弘報用 印刷物 配布場所로는 모든 사람이 쉽게 볼 수 있는 公共場所가 좋은것으로 나타났다.

〈表 3-34〉 AIDS에 對한 弘報·啓蒙의 必要性에 對한
認識度(%)

弘報·啓蒙의 必要與否	全體 N = 440	*	對象 I N = 376	對象 II N = 64
計	100.0		100.0	100.0
必要하다	62.5		58.8	84.4
必要하지 않다	18.0		20.5	(3.1)
모르겠다	19.5		20.7	(12.5)

* 무응답, 제외

() : 관찰치 10例 以下

〈表3-35〉 AIDS에 對한 弘報·啓蒙方法 및 印刷物 配布
選好場所의 分布 百分率 (%)

區 分	全 體	對 象 I	對 象 II
<u>弘報啓蒙方法</u>			
(N)	(275)	(271)	(54)
印刷物 配布	47.6	51.6	31.5
TV · 라디오 放映	51.6	57.5	27.8
相談電話 設置	57.5	58.8	51.9
相談所 設置	35.6	33.9	42.6
巡回啓蒙	20.7	23.1	11.1
其 他	1.8	1.4	3.7
<u>配布場所</u>			
(N)	(271)	(217)	(54)
保健醫療施設의 待期室	21.0	18.0	33.3
버스터미널의 待期室 및 化粧室	10.3	10.6	9.3
飲食店 內의 化粧室	3.3	2.8	5.6
鐵道, 電鐵驛 構內	4.1	4.6	1.8
위의 모든 施設에	40.0	42.9	27.8
위의 場所中 2個所 以上	20.3	20.3	20.4

* 各問項의 選擇을 重複이 可能토록 하였으므로 各項의 百分率 合計는 100 %를 超過.

弘報·啓蒙이 必要하지 않다고 應答한 群은 18.0 %이고 對象Ⅰ에서 對象Ⅱ보다 높은 分布로 나타났다.

이를 教育水準別(表 3-36)로 보면 中卒者의 경우 28.0 %, 高卒者 63.8 %, 大卒 以上者 65.2 %가 必要하다고 應答하였다.

〈表 3-36〉 教育水準別 AIDS에 對한 弘報·啓蒙의 必要에
對한 認識度(%)

教育水準	N [*]	%	必要하다	必要하지 않다	모르겠다
全體	427	100.0	62.7	17.6	19.7
국졸이하	8	100.0	(75.0)	(12.5)	(12.5)
중 졸	25	100.0	(28.0)	40.0	(32.0)
고 졸	174	100.0	63.8	17.2	19.0
대졸이상	230	100.0	65.2	15.7	19.1
對象Ⅰ	373	100.0	59.0	20.1	20.9
국졸이하	7	100.0	(71.4)	((14.3))	(14.3)
중 졸	22	100.0	(27.2)	45.5	(27.3)
고 졸	145	100.0	58.7	20.6	20.7
대졸이상	199	100.0	62.3	17.1	20.6
對象Ⅱ	64	100.0	84.4	(3.1)	(12.5)
국졸이하	1	100.0	(100.0)	-	-
중 졸	3	100.0	(33.0)	-	(67.0)
고 졸	29	100.0	89.7	-	(10.3)
대졸이상	31	100.0	83.9	(6.45)	(9.6)

* 무응답자 3명 제외 () : 調査數 10例 以下

4. 同性戀愛 行態

1) 初經驗

1.1 同性戀愛 動機

처음으로 同性戀愛를 하게된 動機에 對하여 應答한 內容을 自意에 依하여 한것인가, 他意에 의한 것인가로 區分한 分布(表 3-37)를 보면 應答者 331名中 自意에 依하여 하였다는 사람이 88.5%이고, 他意에 依하였다는 應答者は 10.3%로 대부분 自意에 依하여 한것으로 나타났다.

(表 3-37) 同性戀愛 自 / 他意 比率 (%)

調査對象	全 N*	體 %	自意	他意	其他
對象 I	279	100.0	87.1	11.8	(1.1)
對象 II	52	100.0	96.2	(1.9)	(1.9)
計	331	100.0	88.5	10.3	(1.2)

※ 無應答者 110名 除外

() : 調査數 10例 以下

1.2 年齢

첫경험의 年齡分布(表 3-38)를 보면 20~29 歲때가 61.1%로 가장 많고, 그다음으로 19 歲以下가 26.1%로 나타났으며, 14 歲以下, 40 歲以下도 각각 2.3%, 1.9%로 나타났다.

1.3 職業

첫경험때의 應答者の 職業分布(表 3-38)를 보면 學校에 在學中이 41.7%로 가장 많고, 職場에 勤務中 24.3%, 軍服務中 16.4% 顺序으로 나타났다.

〈表 3 - 38〉 同性戀愛 첫 경험時 年齡, 職業 및 相對者の
分布 百分率 (%)

區 分	全 體	對 象 I	對 象 II
1) 年 齡			
計 (N)*	100.0 (432)	100.0 (375)	100.0 (57)
14세 이하	2.3	2.7	-
15 - 19	23.8	23.7	24.6
20 - 29	61.1	61.6	57.9
30 - 39	10.9	10.4	14.0
40 - 49	1.4	1.1	3.5
50세 이상	0.5	0.5	-
2) 職 業			
計 (N)*	100.0 (432)	100.0 (373)	100.0 (59)
學校에 在學中	41.7	44.2	25.4
軍服務	16.4	16.4	16.9
外國滯留	0.9	1.1	-
教導所服役	1.4	0.5	6.8
無 職	6.5	6.7	5.1
自營業	8.1	7.2	13.6
一般職場	24.3	23.3	30.5
其 他	0.7	0.6	1.7
3) 相對者			
計 (N)*	100.0 (433)	100.0 (375)	100.0 (58)
친 구	19.4	19.2	20.7
선 배	27.9	27.2	32.8
후 배	4.8	5.1	3.4
친 쳇	1.6	1.3	3.4
학교선생	12.5	13.6	5.2
외 국 인	1.6	1.1	5.2
직장동료	15.5	13.9	25.9
우연히 만난 사람	13.9	15.5	3.4
기 타	2.8	3.1	-

* 無應答者除外

1.4 相對者

첫經驗時 相對者 區分別 分布〈表3-38〉를 보면 先輩가 27.9%로 가장많고, 親舊 19.4 %, 같은곳에 勤務하는 同僚 15.5 %, 우연히만난 사람 13.9 % 順으로 대부분 가까운 사람을 통해 經驗한 것으로 나타났다.

〈表3-39〉 同性戀愛 相對者 選擇에 關한 基準의 百分率

選 擇 基 準	全 體	對 象 I	對 象 II
計 (N) *	100.0 (425)	100.0(371)	100.0 (55)
처음만난 사람과도 意思만 통하면 누구하고도 한다	47.2	49.9	27.1
처음만난 사람하고는 절대로 하지 않는다	23.9	23.7	25.5
처음만난 사람일지라도 紹介해준 사람을 믿고한다	18.5	19.1	14.5
外貌만 맘에 들면 한다	4.5	3.2	12.7
其 他	5.7	4.0	18.2

* 無應答者 除外

2) 同性戀愛 相對者 選擇基準 및 同性戀愛期間

2.1 選擇基準

現在 同性戀愛 相對者를 어떻게 選擇하느냐?의 設問에 대한 應答分布〈表3-39〉를 보면 “처음만난 사람과도 意思만 통하면 누구하고도

한다”가 47.2 %로 가장많고, “처음만난 사람하고는 절대로 하지 않는다”고相反된 基準을 나타낸 應答者도 23.9 %, 外貌만 맘에 들어도 한다고 應答한 사람이 4.5 %로 나타났다.

2.2 同性戀愛期間

應答者 435 名의 지금까지 同性戀愛한 期間 <表 3 - 40 >을 보면 5 年 未滿이 43.4 %로 가장많고, 5 ~ 9 年이 26.7 %, 10 ~ 15 年 18.9 %로 나타났으며, 20 年 以上도 32 名(7.3 %)으로 나타났다.

<表 3 - 40 > 應答者의 同性戀愛期間分布(%)

期 間	全 體	對 象 I	對 象 II
計 (N)*	100.0 (435)	100.0 (375)	100.0 (60)
1 年 未滿	6.9	5.9	13.3
1 ~ 4 年	36.5	36.5	36.7
5 ~ 9 年	26.7	27.2	23.3
10~15 年	18.9	18.4	21.7
16~19 年	3.7	4.0	1.7
20 年 以上	7.3	8.0	3.3

* 無應答者 除外

이를 結婚狀態別 <表 3 - 41 >로 보면 未婚者의 경우 1 ~ 4 年(45.5 %), 5 ~ 9 年이 26.6 %로 높은 分布로 나타났으며 有配偶者는 10 ~ 19 年이 33.9 %, 높은 分布로 나타나, 結婚生活을 하면서도 同性戀愛는 繼續하고 있는 것으로 나타났다.

<表3-41>

結婚状態別 同性戀愛期間 分布(%)

		結 婚 狀 態			1 年未満			1 - 4 年		5 - 9 年		10 - 19 年		20 年以上		計 (N)*	
		計		6.9		36.5		26.6		22.6		7.4		100.0 (435)			
全 體		未	婚	8.3	45.5	26.6	17.7									100.0 (312)	
		配 偶	偶 偶	1.9	16.6	26.2	33.9									100.0 (103)	
		離婚・別居・死別		10.0	-	30.0	40.0									100.0 (20)	
<u>對象 I</u>	計			5.9	36.5	27.2	22.4									100.0 (375)	
	結	婚		7.1	45.4	28.1	17.2									100.0 (267)	
	有	配 偶		1.1	17.2	26.9	32.2									100.0 (93)	
	離婚・別居・死別			13.3	-	13.4	53.3									100.0 (15)	
<u>對象 II</u>	計			13.3	36.8	23.3	23.3									100.0 (60)	
	未	婚		15.6	46.7	17.8	19.9									100.0 (45)	
	有	配 偶		10.0	10.0	20.0	50.0									100.0 (10)	
	離婚・別居・死別			-	-	80.0	-									100.0 (5)	

*無應答者 除外

3) 性行爲 回數 및 相對者數

3.1 同性間 性行爲 回數 및 相對者數

男性 同性戀愛者에서의 頻繁한 性行爲 回數 및 相對者數 交替가 HIV 感染과 密接한 관계가 있다고 專門家들은 지적하고 있다.

따라서, 同性間 月平均 性行爲 回數 및 年間 性行爲 相對者數 分布<3 - 42>를 보면, 月平均 性行爲 回數의 경우 1 - 3回를 한다고 應答한

<表 3 - 42 > 同性間 月平均 性行爲 回數 및 年間
性相對者數 分布 (%)

性行爲回數 및 相對者數 *	全 體	對 象 I	對 象 II
1) 月平均 性行爲回數(N)	100.0 (431)	100.0 (371)	100.0 (60)
1 - 3回	52.9	50.1	70.0
4 - 6回	20.6	19.9	25.0
7 - 9回	10.9	12.4	1.7
10 - 12回	10.0	11.1	3.3
13 - 15回	2.8	3.2	-
16回 以上	2.8	3.2	-
.....
2) 年間 性行爲 相對者數(N) **	100.0 (419)	100.0 (364)	100.0 (55)
1 - 5名	61.0	58.2	80.0 SD=14.1
6 - 10名	20.9	21.6	16.4 median=4
11 - 15名	7.6	8.2	3.6 range(1,200) mean = 8.2
16 - 20名	4.5	5.2	-
21 - 50名	4.0	4.6	-
51 - 100名	1.2	1.4	-
101名 200名	0.7	0.8	-

* : 無應答者 除外

**: 無應答者 및 年間相對者數量 200名 以上 記入한 2名 除外

사람이 52.9 %로 가장많고, 다음으로 4 - 6 회가 20.6 %로 나타났으며 16회 以上도 2.8 %로 나타났다.

同性戀愛를 함께 한 年間 同性戀愛 相對者數의 分布는 1 - 5 名이 61.0 %로 가장많고, 6 - 10 名이 20.9 %, 11 - 15 名 7.6 % 順으로 나타났으며 51名 以上도 1.9 %나 있는 것으로 나타났다.

年齡 階層別로 月平均 性行爲 回數 分布(表 3 - 43)를 보면, 19 歲 以下의 경우 月平均 7.5回이고, 30代, 50 歲以上 群에서는 5.4回, 20代 群은 4.7回의 順으로 나타났다.

또한 結婚狀態別 月平均 性行爲 回數(表 3 - 44)를 보면 未婚者, 有配偶者 모두가 1 - 3回를 한다고 應答한 群이 각각 54.4 %, 51.5 %로 가장많고, 有配偶者의 경우 10回 以上을 한다고 答한 사람이 16.5 %로 나타났다.

年齡 階層別로 同性戀愛를 같이 한 年平均 相對者數의 分布(表 3 - 45)를 보면 19 歲 以下是 18.8名, 30代는 7.8名 50 歲以上은 7.2名, 20代는 6.9名의 順으로 나타났다.

〈表 3 - 43〉 年令階層別 月平均 同性戀愛回數

年 令	全體平均	對 象 I			對 象 II		
		平 均	표준편차	(N)	平 均	표준편차	(N)
計	5.0	5.2	4.2	371	3.5	2.5	64
19 歲 以下	7.5	8.1	5.1	10	2.0	0.0	1
20-29 歲	4.7	4.9	4.2	192	3.8	2.7	31
30-39 歲	5.4	5.7	3.2	118	3.5	2.3	19
40-49 歲	4.1	4.5	3.9	37	2.7	2.2	10
50 세이상	5.4	5.7	4.0	14	4.0	1.7	3

無應答者 除外

<表3-44>

結婚状態別 月平均同性戀愛 回數分布(%)

結 婚 狀 態		回 數				計 (N)*
		1 - 3	4 - 6	7 - 9	10 - 15	
全體 *	計	53.0	20.7	10.9	12.8	2.6
未	婚	54.4	18.4	11.7	12.5	3.5
有	配 偶	51.5	23.3	8.7	16.5	-
離婚・別居・死別		38.9	44.4	11.1	5.6	-
對象 I	計	50.3	20.0	12.4	14.3	3.0
未	婚	52.3	17.0	13.3	13.3	4.1
有	配 偶	47.3	24.7	9.7	18.3	-
離婚・別居・死別		30.8	46.0	15.4	7.8	-
對象 II	計	70.0	20.0	1.7	3.3	-
未	婚	66.7	26.7	2.2	4.4	-
有	配 偶	90.0	10.0	-	-	-
離婚・別居・死別		60.0	40.0	-	-	-

* 無應答者 除外

〈表 3 - 45〉 年令階層別 年平均 同性戀愛 相對者數(名)

年 令	全體平均	對 象 I			對 象 II		
		平 均	표준편차	(N)*	平 均	표준편차	(N)*
計	7.5	8.0	10.1	362	4.0	3.5	56
19才以下	18.8	19.2	25.2	10	15.0	-	1
20-29才	6.9	7.3	8.5	188	4.4	3.4	28
30-39才	7.8	8.4	10.0	116	3.9	3.4	17
40-49才	6.2	7.2	9.9	34	1.4	1.3	7
50才以上	7.2	8.1	9.0	14	3.0	1.7	3

* 無應答者 및 年間相對者數를 100 名, 以上 記入한 4 名除外

3.2 異性間 性行爲 回數 및 相對者數

異性과는 性行爲를 하지 않는다고 應答한 175 名을 除外한 248 名 (58.6 %)의 月平均 異性과의 性行爲 回數 分布 〈表 3 - 46〉를 보면 1 - 3回를 한다고 應答한 사람이 66.9 %로 가장많고 4 - 6回가 16.5% 7 - 9回가 8.5 %의 順으로 나타났다.

〈表 3 - 46〉 異性間 月平均 性行爲回數分布 (%)

回 數	全 體	對 象 I	對 象 II
計 (N)*	100.0 (248)	100.0 (211)	100.0 (37)
1 - 3	66.9	66.8	67.6
4 - 6	16.5	15.6	21.6
7 - 9	8.5	9.5	2.7
10 - 15	7.6	7.5	8.1
16 以上	0.5	0.6	-

* 無應答者 除外

年間 異性과 性行爲를한 相對者數 分布〈表3-47〉를 보면 1名과 하였다고 應答한 사람이 36.8 %로 가장많고 2名이 9.5 %, 5名以上이 5.3 %, 3名이 5.0 %의 順으로 나타났으며, 性行爲를한 相對者로는 “여자친구”가 24.2 %로 가장많고, “부인” 17.0 %, “개인목적으로 교제한여자” 6.9 %의 順으로 나타났다.

〈表3-47〉 異性(女性)과의 性行爲 年間相對者數 및
相對者 女性別 分布(%)

性行爲女性相對者數(名)	全體		對象 I	對象 II
	N*	%	%	%
0	175	41.5	42.9	32.7
1	155	36.8	35.8	43.6
2	40	9.5	9.2	10.9
3	21	5.0	4.2	10.9
4	8	1.9	2.2	—
5 以上	22	5.3	5.7	1.9
計	421	100	100	100

相對女性의 分類				
(男性)	175	(41.5)	(42.9)	(32.7)
女子친구	102	24.2	24.1	25.4
婦人	72	17.0	17.1	16.6
個人的으로 交際한 女子	29	6.9	5.4	14.9
婦人 및 다른 對象	22	5.4	4.3	8.9
其他	21	5.0	6.2	1.5
計	421	100	100	100

* 無應答者 除外

4) 外國人과의 同性戀愛實態

HIV: 感染者의 高危險 集團 男性 同性戀愛者 가운데에서도 더욱 그危險度가 높다고 볼 수 있는 外國人과 同性戀愛를 한 經驗이 있느냐?에 對한 調査結果를 보면, 全體應答者 437名中 66名(15.1%)이 外國人과 同性戀愛 經驗이 있다고 하였다.

또한 이들이 經驗한 外國人數 <表 3-48>를 보면 1名과 行爲를 하였다고 應答한 사람이 25名(37.9%), 2名, 3-5名이 각각 13名(19.7%)이고, 10名 以上이라고 答한 사람도 6名(9.1%)이나 나타났다.

<表 3-48> 外國人과의 同性戀愛經驗 및 相對한 外國人數別
百分率(%)

外國人과의 同性戀愛	全體*	%	N	對象 I	%	N	對象 II	%	N
<u>經 驗</u>									
有 다	15.1	66		14.7	55		17.7	11	
없 다	84.9	371		85.3	320		82.3	51	
計	100	437		100	375		100.0	62	
<u>經驗한 外國人數</u>									
1 名	37.9	25		38.2	21		36.4	4	
2 名	19.7	13		18.2	10		27.2	3	
3 - 5 名	19.7	13		16.4	9		36.4	4	
6 - 9 名	10.6	7		12.7	7		-		
10名 以上	9.1	6		10.9	6)		-		
無 應 答	3.0	2		3.6	2		-		
計 (N)	100	66		100	55	100		11	

* 無應答者 除外

이러한 實態는 國家 經濟發展과 함께 來韓하는 外國人觀光客의 增加와 더불어 內國人の 海外出入도 自由롭게 됨에 따라 同性戀愛者의 海外出入도 쉽게 이루어 질 수가 있기 때문이라 하겠다.

調查對象者 435名의 外國에 滯留한 經驗과 海外滯在時 同性戀愛行爲與否〈表3-49〉를 보면 外國에 滯在經驗이 있다고 應答한 사람은 41名(9.4%)으로, 이중 同性戀愛를 한 사람은 26名(5.9%)으로 나타났다.

〈表3-49〉 出國 및 海外에서의 同性戀愛經驗 百分率(%)

出 國 經 驗	全 體	對 象 I	對 象 II
計 (N)*	100.0 (435)	100.0(371)	100.0(64)
없 다	90.6	89.5	96.9
있 다 (소계)	(9.4)	(10.5)	(3.1)
<u>海外에서의 同性戀愛</u>			
있 었 다	5.9	6.5	3.1
없 었 다	3.5	4.0	-

* 無應答者 除外

5) 性行態

同性戀愛者가 HIV 感染의 高危險集團이라는 事實은 既 外國資料에 나타나 있고, 그들의 性行態가운데 肛門性行爲, 여러 相對者와의 行爲等이 HIV 感染의 主 要因으로 나타나 있다.

따라서, 本 調查應答者들이 어떤 性行態를 가지고 있는가? 調查結果는 다음과 같다.

性戲를 위해 서로 刺戟하는 部位와 行爲役割別 百分率(表3-50)를 보면 刺戟部位의 경우 “키스한다”에 應答한 사람은 59.4%, “서로 손으로 하여주기”에 62.4%, “입으로 하여주기”에는 85.6%로 가장 많은 사람이 應答하였고, 허벅지 사이에 넣어주기”는 44.3%, HIV 感

〈表3-50〉 同性戀愛 行爲時의 刺戟部位 및 役割別 百分率*

區 分	全 體 ⁺	對 象 I	對 象 II
刺戟部位 (N)	(436)	(375)	(61)
키 스	59.4	62.7	39.3
서로 손으로 하여주기	62.4	61.6	67.2
입으로 하여주기	85.6	88.0	70.5
허벅지 사이에 넣어주기	44.3	45.3	37.7
肛門에 隱莖을 넣기	76.8	81.6	47.5
肛門에 손을 넣어주기	4.4	5.1	-
其 他	2.0	2.4	-
役 割 (N)	(412)	(356)	(56)
主로 受動의이다(女性役割)	20.6	23.6	1.8
主로 能動의이다(男性役割)	35.2	31.2	60.7
상황에 따라 모두 한다	41.3	42.4	33.9
其 他	26.2	27.2	14.2

+ : 無應答者 除外

* : 각 問項의 選擇을 重複이 可能토록 하였으므로 百分率合計는 100 % 를 超過.

染의 主要因이 되는 肛門에 陰莖을 넣기 ”는 全體 76.8 %가 한다고 應答하였고 對象 I 은 81.6 %, 對象 II 는 47.5 %로 나타났다. 對象 II 의 경우 調査方法의 차이로 인해 실제보다 낮게 나타난 것으로 생각된다. 各 問項의 百分率合計가 100 %를 超過하는 것으로 미루워 한部位만을 刺戟하며 性愛를 하는群도 있지만 대부분 2 個以上의 部位를 利用하여 行爲를 하는 것으로 나타났다.

性愛時의 役割은 상황에 따라 男性, 女性 役割을 모두 한다고 應答한 사람이 41.3 %로 가장많고, 주로 男性인 役割만을 한다고 應答한 사람은 35.2 %, 女性 役割만을 한다는 사람도 20.6 %나 答한 것으로 나타났다.

同性戀愛를 하면서 相對者의 精液을 吸入해본 經驗 <表 3 - 51 >을 보면 經驗이 있다고 應答한 사람이 182 名 (42.0 %) 으로 나타났다.

<表 3 - 51 > 同性戀愛時 相對의 精液을 吸入한 經驗百分率 (%)

經 驗	全 體 *	對 象 I	對 象 II
	N = 433	N = 373	N = 60
計	100.0	100.0	100.0
有 다	42.0	45.3	21.7
無 다	58.0	54.7	78.3

* : 無應答者 除外

6) 性病 既往歷

應答者の 性病既往歷 및 感染되었던 性病 種類別 分布 <表 3 - 52 > 를 보면 應答者 423 名中 性病 既往歷이 있다고한 사람은 70 名 (16.5 %) 이고, 感染되었던 性病種類로는 임질이 제일많으며, 비임균성요도염, 매독

〈表 3 - 52 〉 應答者의 性病既往歴 및 既感染性病別 百分率 (%)

既 往 歷	全 體 *	對 象 I		對 象 II
		對 象 I	對 象 II	
計(N)	100.0 (423)	100.0(364)		100.0 (59)
有 다	<u>16.5</u>	<u>17.0</u>		<u>13.6</u>
임 질	10.4	10.7		8.5
매 독	1.2	0.8		3.4
비임 균성요도염	3.6	4.1		-
연성하감	0.7	0.6		1.7
기 타	0.1	0.2		-
2 가지 이상감염	0.5	0.6		-
無 다	<u>83.5</u>	<u>83.0</u>		<u>86.4</u>

* : 無應答者 除外

의 順으로 나타났다.

7) 麻藥類 使用實態

外國의 경우 同性戀愛者들이 藥物誤濫用(drug abuse)이 높다는 사실을 감안하여, 이들의 麻藥類의 誤濫用 經驗이 있는가? 使用했던 藥物類는 무엇인가를 把握하기 위하여 調査하였다.

그러나 研究者가 직접 調査한 對象II 群에서는 “使用經驗이 있다”고 應答한 사람은 한사람도 없었으며, 對象I 群에서 使用經驗이 있다고 應答한 사람이 모두 17名 〈表 3 - 53 〉이고 이들이 使用한 藥物種類로는 “마리화나”使用者가 9名, “히로뽕” 4명, “기타” 4명으로 나타났다.

〈表 3-53〉 對象 I 의 麻藥類 및 覺醒劑別의 誤濫用經驗率 (%)

麻藥類 및 覺醒劑	計		經 有 多 N %		經 無 多 N %		驗 無 多 N %	
	N	%	N	%	N	%	N	%
마리화나	377	100	9	2.4	346	91.8	22	5.8
히로뽕	377	100	4	1.1	339	89.9	34	9.0
其他(본드등)	377	100	4	1.1	339	89.9	34	9.0

5. 同性戀愛者 專用酒店의 業所實態 및 從業員의 諸特性

1) 業所實態

서울市內에 男性 同性戀愛者가 專用하는 酒店이 鐘路區 樂園洞과, 龍山區 梨泰院洞, 永登浦區, 江南區 等地에 있다는 情報를 蒐集하여 研究陣이 該當地域을 直接現地確認한 結果 鐘路區 樂園洞 一帶에만 密集해 있었고 他地域에는 없는것으로 나타났다.

따라서 本 研究陣은 鐘路區 區廳 衛生課와 大韓 料食業 中央會 鐘路支部의 協助를 받아 現地踏查 結果 調查 當時 21個 業所가 營業中인 것으로 나타났다. 이들 21個 業所의 實態를 보면, 4個業所가 調査當日 無許可 였으며, 나머지 許可된 業所의 許可된 業種은 대부분 大衆飲食店이었다.

業所의 客室面積은 제일작은곳이 3坪, 제일큰곳은 80坪으로 그 크기가 多樣하나 10 - 16坪이 대부분이었다.

또한 顧客用 좌석수가 제일많은 곳이 78석, 제일적은 곳은 4석뿐이었으나 대부분의 경우 10 - 14석이었다.

從業員數는 業主를 包含하여 1 ~ 7名이 있고 큰業所에 주로 많으나 몇몇 작은 業所에서도 從業員 個人마다 단골 顧客이 있어 從業員이 4 -

5名이나 있는 곳도 있으며 全體 業所의 平均 從業員數는 3.2名 이었다.

調查當時 業所를 利用하는 1日平均 顧客數는 10-50名으로 業所 크기에 따라 다르나 全體 業所의 平均 利用者는 22名程度이었다.

단골 顧客이 있다고 應答한 業所가 11個 業所로 10~100餘名의 단골을 확보하고 있다고 한다.

外國人 同性戀愛者의 出入에 關해서는 10個 業所만이 있다고 應答하였으며 外國人們은 前記한 바와같이 소문을 듣고 찾아 오거나, 外國에서 發刊되는 同性戀愛者用 雜誌에 國內業所의 位置가 紹介되어있는 略圖를 가지고 찾아오는 것으로 나타났다.

2) 業主 및 從業員의 諸特性

2.1 同性戀愛 파트너의 成立樣態

業所內에서의 同性戀愛 파트너가 이루어지는 類型에 對해 假想狀況을 設定하여 對象Ⅱ(業主 및 從業員)에게 設問하였다. 이에 對한 對象Ⅱ의 肯定과 否定의 應答率은 內國人 顧客間에 同性戀愛 파트너가 이루어 진다”가 應答者 61名中 55名(90.2%)이 그렇다고 應答하였고, “業所에 오는 內國人 손님과 外國人 손님간에 파트너가 이루어진다”에 58名中 31名(53.4%)이 應答하였다. “業所에 勤務하는 從業員과 內國人 顧客間에 同性戀愛파트너가 이루어진다”에 60名中 49名(81.7%), 從業員과 外國人 顧客間에 同性戀愛 파트너가 이루어진다”에는 59名中 40名(67.8%)이 그렇지 않다고 否定하였다. “從業員의 紹介로 業所에 오는 손님間에 同性戀愛 파트너가 이루어진다”에 59名中 39名(66.1%)이 그렇다고 應答하였고, “從業員의 紹介로 內國人 손님과 外國人 손님간에 파트너 가 이루어 진다”에는 59名中 46名(78.0%)이 그렇지 않다고 應答하였다.

〈表 - 54〉 業所內서의 顧客間에 同性戀愛파트너가 이루어지는
類型에 對한 對象Ⅱ의 肯定率(%)

파트너 類型	計		% % 그렇다 그렇지 않다	
	N	%		
內國人 顧客間에	61	100	90.2	9.8
內國人과 外國人 顧客間에	58	100	53.4	46.6
業所 從業員과 内國人 顧客間에	60	100	81.7	18.3
業所從業員과 外國人 顧客間에	59	100	32.2	67.8
從業員의 紹介로 内國人 顧客間에	59	100	66.1	33.9
" 内國人과 外國人 顧客間에	59	100.	22.0	78.0
顧客間에				

※ : 無應答者 除外

2.2 其他 業所業務와 關聯된 問項

業所에 勤務하게된 動機別 分布〈表 3-55〉를 보면 “偶然히 勤務하게 되었다”고 應答한 사람이 應答者 62 名中 35 名(56.5%)이고, 同性戀愛를 하기때문에 좋아서가 11 명(17.7%)으로 나타났다.

現業所에 就業하기전 同性戀愛 經驗有無는 應答者 63 名中 46名(73.0%)이 經驗하였다고 答하였고, 現 職業에 대한 滿足度는 62 名中 7 名(11.3%)만이 滿足한 것으로 나타났다.

業所에 오는 顧客 또는 다른 사람의 紹介로 만난사람과 同性戀愛를 한 후 代價(팁)를 받느냐의 問項에는 應答者 59 名中 16 名(27.0%)만이 빙는다고 答하였다.

本人의 단골 顧客 有無에 있어서는 應答者 61 名中 40 名(65.6%)이 있다고 答하였으며, 健康診斷手帖을 所持하고 있느냐?에 對한 問項

〈表 3-55〉 業所勤務動機 및 職業의 滿足度等에 關한 百分率

區 分	N	%
1) 業所에 勤務하게 된 勤機 收入이 좋을것 같아서 同性戀愛하기 때문에 좋아서 아는 사람의 紹介로 우연히 其 他	62	100 9.7 17.7 12.9 56.5 3.2
2) 就業前 同性戀愛 經驗有無 있다 없다	63	100 73.0 27.0
3) 現職業에 對한 滿足度 滿足한다 普通이다 不滿이다.	62	100 11.3 62.9 25.8
4) 顧客 또는 다른사람의 紹介로 만난 사람과 同性戀愛를 한후 代價(팁) : 받는다 받지 않는다	59	100 27.1 72.9
5) 단골 有無 있다 없다	61	100 65.6 34.4
6) 健康診斷手帖 所持與否 • 有効期間의 手帖을 갖고 있다 • 有効期間이 지난것을 갖고 있다 • 아무것도 갖고 있지 않다 미소지 사유 : 발급받지 않아도 될것 같아서 어디서 발급받는지 몰라서 발급받으면 귀찮을 것 같아서 기 타 무응답	64	100 37.5 12.5 (50.5) 28.1 6.3 4.7 7.8 3.1

에는 應答者 64名中 24名(37.5%)만이 發給期間이 有効한 것을 所持하고 있다고 했으며, “없다”고 應答한 40名의 未所持 理由로는 “發給받지 않아도 될것 같아서가 18名(28.1%)으로 가장많고, 有効期間이 지난것을 所持하고 있는 사람도 8名(12.5%)으로 나타났다. 그러나, 大衆飲食店 從業員에게는 HIV抗體検査를 받도록 規制되어 있지 않기 때문에 健康診斷手貼을 所持하고 있다고 해서 반드시 HIV抗體検査를 받은것은 아니다.

6. HIV抗體検査

調査業所의 業主와 顧客을 接待하는 從業員은 거의 모두가 同性戀愛者로 알려지고 있으며 調査結果에서도 나타난 바와같이 이들의 業務 및 性行態에 따라 HIV感染의 危險에 恒時 露出되어 있어 HIV抗體検査의 必要性이 横頭되어 國立保健院 AIDS센터의 支援을 받아 檢査를 實施하였다.

検査對象者 數는 모두 64名이나 業主 1名과 從業員 1名은 本人의 拒否와 나머지 1名은 不在中으로 62名만을 檢査하였다.

検査結果는 WESTERN BLOT確認検査에 62名 모두가 HIV感染에 對한 抗體가 生成되지 않아 抗體가 없다는 隱性으로 判定되었으며, 以外 2名의 梅毒 陽性反應者가 있었다.

第四章 調査結果의 主要要約 및 國際比較

本 調査는 이미 우리나라에서도 問題의 深刻性이 높아져 가고 있는 AIDS의 效率的인 管理對策을 為하여 必要한 資料를 蒐集코저着手되었다. 調査對象은 HIV感染의 機轉으로 보아 同性戀愛者가 高危險集團으로 차지하는 重要性에 비추어 疫學的인 特性에 重點을 두면서 이들에 對한 實態를 調査하였다. 調査地域은 優先的으로 서울市를 選定하고 最終調査對象은 同性戀愛者가 出入하는 酒店의 顧客과 業主 및 從業員 으로 確定하고 無記名式 設問紙를 通하여 資料를 蒐集하였다.

顧客이 377名, 業主 및 從業員 64名으로 모두 441名이 調査되었고, HIV抗體検査는 62名이 調査現場에서 受檢하였다.

調査된 分析資料中 主要結果를 要約하면 다음과 같다.

1) 調査對象者の年齢分布는 20 ~ 29 歲 群이 51.3 %로 가장 많고 50 歲以上도 3.9 %로 나타났으며, 教育水準은 大卒 (專文大包含)者가 52.7 %로 많으며, 結婚狀態는 未婚者가 71.1 %, 有配偶者 24.4 %로 나타났다.

2) AIDS에 대한 認知率은 84.7 %이고 認知經路는 新聞・雜誌를 통해 알게 되었다가 70.7 %로 가장 많았다.

AIDS를 알고 있다고 한 應答者가 實際로 얼마나 알고 있는가를 把握하기 위해 設問한 5 間項 모두를 마친 사람은 51.8 %로 나타났다.

싱가폴政府의 保健部가 1988年末에 實施한 KABP調査에 依하면 싱가폴住民의 AIDS에 對한 認知率이 韓國의 本調査應答者보다 훨씬 높으며 (98%) AIDS에 對한 知識을 主로 新聞(93%)이나 TV(83%)를 通하여 얻은 것으로 나타났다.¹

東京²과 美國에서의 調査는 一般住民이 對象인 것이 本調査와 다르나 <表4-1>의 問項에 對한 正誤答의 百分率은 서울의 本調査應答者가

東京住民에 比하여 正答率이 높은 反面 美國의 一般住民의 正答率과 거의 對等한 것으로 보인다.

〈表 4-1〉 AIDS에 關한 三個國 地域住民의 知識 比較

問 項	地 域	%		比 較
		맞 다 (a)	틀리다 (b)	
○ AIDS에 걸린 女子가 낳은 아이는 AIDS에 걸리지 않는다.	서 울	9.4	90.6	(b)가 正答
○ 性行爲 時 : 콘돔을 使用 하면 破損되지 않는 限 AIDS에 걸리지 않는다.	東 京	2.1	82.1	
	美 國	.0	95.0	
○ AIDS患者와 握手만 하 여도 AIDS에 걸릴 危險 이 높다.	서 울	82.3	17.7	(a)가 正答
	東 京	64.2	6.6	
	美 國	83.0	14.0	
○ AIDS患者와 握手만 하 여도 AIDS에 걸릴 危險 이 높다.	서 울	5.7	94.3	(b)가 正答
	東 京	2.6	78.0	
	美 國	8.0	84.0	

AIDS에 對하여 極히 一部分만 알고 있거나 전혀 잘못알고 있으면自身이 AIDS에 感染되기 쉬운 高危險에 處하여져 있다고 생각하는 것과 連關係이 높다고 한다.⁴

3) AIDS에 대한 認識에 있어 現在 우리나라에도 HIV感染者가 增加하고 있는 것에 대해 어느정도 두려움을 느끼고 있느냐?의 設問에 42.6%가 “두렵다”고 應答하였고, 26.0%가 “두렵지 않다.”고 應答하였으며, HIV感染者中 同性戀愛者가 많다는 事實에 對해 “그렇다”

고 認識하고 있는 사람은 77.7 %로 나타났다.

4) HIV 抗體検査를 받아본 經驗이 있다고 對答한 應答者は 總 45.4 %
이고 이중 献血時에 受檢한 應答者が 48.2 %, 保健所에서 檢查를 받아
보고 싶어서 受檢한 사람이 30.2 %로 나타났고 未受檢者の 事由로는 “
検査받을 必要가 없어서”라고 應答한 사람이 54.0 %로 가장높은 分布
를 보였다.

1987 年 3 月에 美國 Seattle 市에 居住하고 있는 同性戀愛者の 調
査⁵에서 밝혀진 HIV 抗體検査의 既受檢率은 本 調査의 資料보다 낮은 受
檢率을 보여주고 있다.

5) 向後 便利하게 檢査를 받을 수 있도록 서비스를 提供하면은 檢査를
받겠느냐?의 設問에 “받을 用意가 있다.”고 應答한 사람은 64.3 %,
“願하지 않는다.”가 “모르겠다.”(22.7 %)를 포함해서 35.7 %이며,
願하는 檢査方法으로는 “남의 눈에 띠지도 않고 身分도 밝히지 않는 場
所에서 받는 方法”이 43.8 %로 가장 많았다.

6) 肛門性行爲者로 記入한 334 名의 콘돔 使用實態를 보면은 83.8 %
가 “사용하지 않는다”고 應答하였다.

本 調査對象의 肛門性行爲時 콘돔을 使用하지 않는 率이 相當이 높은
며 比하여 美國의 調査⁶에서는 受動的役割에서의 콘돔非使用率이 50 %,
能動的役割의 肛門性交에서 콘돔非使用率이 45 %로 우리나라 同性戀愛
者들 보다 低率이었거나, <表 4-2>와 <表 4-3>에서 보듯이 콘돔
非使率이 점점 줄어들고 있다.

〈表4-2〉 美國 Sanfrancisco 市居住 同性戀愛者의
肛門性行爲時 콘돔非使用率(%)⁷

肛門性交	% ⁷	
	1984	1985
受動的性交	14.4	5.8
能動的性交	39.6	13.3

〈表4-3〉 英領 Columbia의 Vancouver 居住 同性戀愛者
Cohort*의 調查時期別 콘돔의 使用頻度(%)⁸

受動的 肛門性交時 콘돔使用頻度	%	
	1984.4-1985.3	1986.10-1987.9
전혀 使用하지 않는다.	79.3	45.7
간혹 使用한다.	17.1	20.0
자주 使用한다.	1.8	2.9
대개 使用한다.) 3.6 1.8) 34.3 31.4

* n = 700 名

肛門性交時 콘돔을 使用하지 않는 것은 HIV感染과 높은 連關性을 갖는다고 알려지고 있으며 콘돔의 使用은 AIDS와 對抗하여 싸울 수 있는 가장 威力이 있는 武器^{10.11}라고 한다.

우리나라 同性戀愛者의 콘돔使用率이 本 調查에서 보여 주듯이 아주 낮은 것은 앞으로 이를 特殊集團의 一部가 HIV에 感染이 될 경우 急速度로擴散될 수 있는 危險한 疫學的狀態가 造成되어 있음을 示唆하여

주고 있다. 따라서 콘돔에 對한 教育과 동시에 同性戀愛者가 必要할 때
自由롭게 無料로 使用할 수 있도록 措置하여야 콘돔의 利用이 提高될
것이다.¹²

7) 應答者的 54.3 %가 AIDS에 對한 相談서비스를 要求하고 있으며
相談을 希望하는 應答者中 選好하는 相談서비스로는 상담電話를 통한 方
法이 53.8 %, 相談所와 電話를 함께 利用할 수 있는 方法이 32.4 %로
나타났다. 相談所의 位置는 身分證 없이 出入이 자유롭고 露出되지 않는
場所를 가장 選好(75.5 %)하였으며 相談役으로 醫師를 第一希望 (56.0 %)
하는 것으로 나타났다. 弘報·啓蒙의 必要性에 對한 認識은
62.5 %가 必要하다고 認識하고 있으며 願하는 方法으로는 相談電話를
設置하여 運營하는 方法이 57.5 %로 가장 높았다.

특히 相談서비스는 HIV 抗體検査의 受檢者가 受檢하기 直前과 檢查結果를 通報 받을 때 반드시 이루어 져야 한다¹³고 한다.

8) 同性戀愛 첫 經驗時의 年齡은 20 – 29 歲의 年齡階層에 囊하였다고
記入한 應答者가 61.1 %로 가장 많고 當時 職業은 學校에 在學中이였
다가 41.7 %, 相對者は 선배였었다가 27.9 %로 가장 높게 나타났다.

9) 同性戀愛는 “처음 만난 사람과도 의사만 통하면 누구하고도 한
다”가 47.2 %로 가장 많고,

10) 同性戀愛를 한 期間은 5 年未滿이 43.4 %, 5 – 9 年 26.7 %, 20
年以上 7.3 %로 나타났다.

11) 月平均 同性間의 性行爲 回數는 1 – 3 回가 52.9 %, 4 – 6 回
20.6 %, 16 回以上 2.8 %로 나타났다. 同性間 性行爲를 함께한 年間
同性戀愛 相對者數의 分布는 1 – 5 名 61.0 %, 6 – 10 名 20.9 %, 51
名 以上은 1.9 %로 나타났다.

全體應答者の 年間同性愛相對者數의 median이 4 名, range는 (1, 200)名이고, mean은 8.2 名, SD:14.1이였다.

前述한 British Columbia의 Vancouver Cohort 調査⁸에서는 median이 6 名, range는 (0, 140)名, mean이 16.1 名, SD : 23.2 이다.前述한 美 Seattle 市 居住의 同性戀愛者를 對象으로 實施한 調査⁵에서도 3個月 間에 相對한 同性戀愛者數의 中央值가 7, range가 1-150인 것과 比較해 보면은 歐美의 同性戀愛者가 우리나라의 同性戀愛者들 보다 同性戀愛者의 相對者數가 더 많아서 性的 活動이 높은 것으로 보여진다.

12) 异性間 性行爲를 하는 248 (59 %)의 月平均 性行爲 回數는 1—3 回가 66.9 %로 가장많고, 4—6 回 16.5 %, 7—9 回 8.5 %로 나타났다.

13) 外國人과의 同性戀愛 經驗이 있다고 應答한 사람은 66 名 (15.1 %)이고, 이 중 外國人 1 名과 經驗한 應答者가 37.9 %로 제일 많았으며 10 名以上의 外國人과 經驗을 가졌다고 記入한 應答者도 6 名 (9.1 %)이나 있는 것으로 나타났다.

14) 同性戀愛 性行爲의 刺戟部位(方法) 中 肛門性行爲를 하는 사람은 76.8 %이고, 行爲姿勢는 상황에 따라 男·女 역할을 모두 한다가 41.3 %로 나타났다. 이 중 受動的인 女性役割이 20.6 %, 能動的인 男子役割이 35.2 %, 狀況에 따라 모두 한다가 41.3 %이다.

同性戀愛者의 性行態中 受動的인 女性役割의 肛門性交가 HIV 感染의 가장 높은危險要因이다^{14.15.18} 라고 밝혀져 왔다. 1984.7—1985.7 間 Canada, Toronto에서 實施한 調査¹⁷에서는 HIV에 感染된 同性戀愛者와 受動的 肛門性交뿐만 아니라 能動的 肛門性交를 할 境遇에도 交叉比(odds ratio)가 2.44나 上昇되었음을 보여 주었다. 1987 年

3月中 美國의 Seattle市 居住同性戀愛者를 對象으로 實施한 電話 調查⁵에서는 <表4-4>에서 보듯이 本 調查보다 훨씬 높은 肛門性交率을 提示하고 있으나 美國의 Sanfrancisco市居住 同性戀愛者 cohort ($n = 411$) 調査¹⁶에서는 1984年 調査當時의 肛門性交의 女性役割率

<表4-4> 2個地域의 肛門性交率 比較

肛門性交	本調査	Seattle市
受動的 女性役割	20 %	27 %
能動的 男性役割	35 %	41.9 %

이 15%였으나 同一集團에 對한 1987年의 調査結果는 女性役割率이 3%로 低下되었고 男子役割은 40%에서 5%로 激減하였다고 한다.

British Columbia의 Vancouver에서 1984年부터 2年6個月間의 同性戀愛者 Cohort 調査⁸에서도 肛門性交 特히 女性役割을 전혀 하지 않는 率이 28.1%에서 45.3%로 높아진 것으로 나타났다. 이와 같이 同性戀愛者가 比較的 많은 西歐에서는 HIV感染의 危險要因인 肛門性交가 激減하고 있는 趨勢이나 우리나라에서는相當히 높은 實行率을 보여주고 있다. 앞으로 本 調査集團의 一部라도 HIV感染에 露出된다면 은 同性戀愛者間에 迅速히 感染의 幅이 넓어질 것이다. 더욱이 全體 59%의 同性戀愛者가 매달 婦人 또는 女子친구인 異性과 1-3回의 性交가 이루어지고 있는 性行態는 가까운 將來에 우리나라도 漸進的인 社會的 性開放의 風潮에 힘입어 HIV感染이 一般에게 쉽게 빠르게 擴散될 危險에 놓여 있다고 하겠다.

15) 同性戀愛를 시작한 후의 性病 既往歷에 對하여 感染된 經驗이 있

다고 應答한 사람은 16.5 %이고, 淋疾에 感染되었던 사람이 全體의 10.4 %로 가장 많은 것으로 記入되어 있다.

美國의 調査¹⁹에서는 陰毛에 이(虱)가 寄生하는 感染(pediculosis)이 66.8 %로 제일 많고 다음이 淋疾이 38.4 %, 非特性 尿道炎이 24.1 %의 順位이다.

16) 麻藥類, 覺醒劑를 誤濫用해본 經驗이 있다고 應答한 사람은 對象 I群에서 마리화나 9名, 히로뽕 4名, 기타 4名으로 나타났다.

美國의 調査²⁰에서는 <表4-5>에서와 같이 麻藥 및 向精神性醫藥品等에 對한 同性戀愛者の 誤濫用 實態는 本 調査의 水準과는 광장한 差異가 있음을 보여주고 있다.

<表4-5> 公共診療機關 및 個人醫院에 來院한 同性戀愛者の
麻藥 및 向精神性 醫藥品 誤濫用 頻度*

不法使用物質	公共醫療機關	民間醫療機關
街頭密賣醫藥品*(median)	4	4
아질산염吸入製劑(%)	96	95
ethyl chloride (%)	35	38

* Jaffe HW, Choi K, Thomas PA : national case-control study of kaposi's sarcoma and pneumocystis carinii Pneumonia in homosexual men : Part I, Epidemiologic Results: Annals of Internal Medicine 1983; 99: 145 - 150의 Table 2에서 拔取

** marijuana, cocaine, heroine, amphetamines, barbiturates, LSD, methaqualone, phencyclidine 포함

17) 從業員이 顧客과 同性戀愛後 代價(팁)를 받는다고 應答한 사람
이 59名中 16名으로 나타났으며, 健康診斷手帖을 所持하고 있는 사람
은 24名(37.5%)뿐이었다.

前述한 美國의 Seattle市 居住 同性戀愛者를 對象으로 한 調查⁵
에서도 總調查數 102名中 5名이 돈을 받고 他同性戀愛者와 性行爲를
하였으며 調查對象의 10名의 應答者는 돈을 주고 同性戀愛의 性行爲를
한 것으로 밝혀졌다.

18) 業主 및 從業員 62名에 대한 HIV抗體檢査의 結果는 모두 陰性
으로 나타났다.

業主와 從業員이 固定된 場所가 되는 酒店에서 年中 쉴새없이 他同性
戀愛者에게 露出되어 있는 狀況을 考慮할 때 全員이 陰性으로 判定된 事實은
意外이나 무척 多幸한 일이라 보여진다. 外國의 높은 同性戀愛者
의 HIV抗體感染率<表4-6 參照>에 비추어 지금이 바로 本 高危險集團의
管理에 倍前의 努力を 強化할 것을 示唆하는 것이라 하겠다.

<表4-6> 同性戀愛者 HIV抗體陽性率(%) 數個國 比較

調査地域	検査年度	受検者数	陽性率
서울*	1989	62	0
Mexico ²¹	1988	325	30
London ²²	1987	250	26
Sanfrancisco ²³	1988	313	51

* 本調査

19) 調査한 21 個 業所의 客室面積 크기의 分布는 3 — 8坪, 座席數는 4 — 78석, 業主를 포함한 全體 從業員數는 1 — 7名, 調査當時 1日平均 利用顧客數는 10 — 50名으로 나타났고, 外國人 顧客은 10個業所에 出入하고 있다고 應答하였다.

第五章 政策建議

調查結果에 비추어 본 調查研究陣은 AIDS의豫防 및 管理政策의一環으로 아래와 같이 建議한다.

첫째, 高危險群이 주로出入하는 全國의 酒店, 理髮所, 사우나 等을正確히 把握하여 이곳에 從事하는 從業員과 業主(同性戀愛者로 알려진境遇)의 定期的 HIV抗體検査를 受檢하도록 誘導하거나 制度의인 裝置를 構築하여야 한다.

둘째, 上記場所에 適切한 곳을 擇하여 無料콘돔函을 設置하여 出入者が 必要한 境遇 無料로 恒時 利用할 수 있도록 한다.

세째, 韓國健康管理協會가 現在 相談電話를 運營하고 있으나 더 積極的方法으로 言論媒體에 相談電話를 弘報하여 相談을 願하는 一般國民이 보다 容易하게 相談電話서비스를 받게 하도록 한다. 또는 相談電話 및 相談室運營을 研究機關에 委託하여 R & D事業으로 一定期間 推進한다.

네째, 콘돔의 使用等豫防에 對한 弘報啓蒙事業을 一般國民을 對象으로 TV, 言論, 大型 看板等을 利用하여 重點推進한다.

다섯째, 本 調查의 後續研究事業으로 政府가豫算을 確保하여 世界保健機構가 加盟國에 勸獎하고 있는 社會階層別 性行態 및 AIDS에 對한 KAP調査를 實施하도록 支援하여야 한다.

參 考 文 獻

1. Kak Lee Peng: sexual behavior studies and KABP surveys in Singapore, presented at regional WHO workshop on social and behavioural studies related to AIDS, Manila, Philippines, 8-12 Jan 1990.
2. Tsunetsuga Munakata. AIDS knowledge and attitude of Tokyo metropolitan citizen (provisional data from the Tokyo health randomized survey), Nov. 1988
3. Advance data of national health interview survey 1988, USA.
4. DiClemente RJ, et al.: minorities and AIDS: knowledge, attitudes, and misconceptions among black and latino adolescents. Am J Public Health 1988; 78:55-57
5. Roffman RA, Gillmore MR, et al.: continuing unsafe sex: assessing the need for AIDS prevention counseling. Public Health Reports March - April 1990; Vol. 105, No. 2: Page 206.
6. Valdiserri RO, Lyter D, Levition LC, et al.: variables influencing condom use in a cohort of gay and bisexual men. Am J PH 1988; 78:801-805.

7. The AIDS Manual NSW Department of Health, Australia: Chapter I, Epidemiology Table 1.3.
8. Schechter MT, Craib K JP, et al.: patterns of sexual behavior and condom use in a cohort of homosexual men. Am J Public Health Dec. 1988; 78:1535-1538.
9. McCusker J, Stoddard AM, et al.: behavioral risk factor for HIV infection among homosexual men at a Boston community health center. Am J Public Health 1988; 78:68-71.
10. Center for Disease Control: condoms for preventions of sexually transmitted diseases: MMWR 1988;37:133-137.
11. Solomon MZ, DeJong W: recent sexually transmitted disease preventions efforts and their implications for AIDS health education. Health Educ Q, 1986;13:301-316.
12. Solomon MZ and DeJong W: preventing AIDS and other STDs through condom promotion: a patient education intervention. Am J Public Health April 1989; 79:453-458.
13. McCusker J, Stoddard AM, et al.: efforts of HIV antibody test knowledge on subsequent sexual behaviors in

a cohort of homosexually active men. Am J Public Health April 1988; 78:466

14. Darrow WW: risk factors for human immunodeficiency virus infections in homosexual men. Am J Public Health 1987; 77:479-483.
15. MoKusick LJ, Horstman W, Coates TJ, et al.: AIDS and sexual behavior as reported by gay men in Sanfrancisco. Am J Public Health 1988; 75:493-496.
16. Winkelstein W Jr, Wiley LN, et al.: The Sanfrancisco men's health study: continued decline in HIV seroconversion rates among homosexual/bisexual men. Am J Public Health Nov. 1988; 78:1472-1474
17. Coates RA, Calzavara LM, et al.: risk factors for HIV infection in male sexual contacts of men with AIDS or an AIDS-related condition. Am J Epidemiol 1988; 128:729-739
18. Chemiel JS, Detels R, et al.: factors associated with prevalent HIV infection in the multicentre AIDS cohort study. Am J Epidemiol Oct 1987; 126:568-57
19. Darrow WW, Barrett D, et al.: the gay report on sexually transmitted diseases. Am J Public Health 1981; 71:1004-1011

20. Jaffe HW, Choi K, Thomas PA, et al.: national case-control study of Kaposi's sarcoma and pneumocystis carinii pneumonia in homosexual men: Part I, epidemiologic results, Annals of Internal Medicine 1983; 99:145-151
21. Vazquez-valls E, Torres-Mendoza B, et al.: tendency of anti-HIV antibodies in masculine homosexuals during the last five years in Guadalajara, Jalisco. [Abstract] in: Montreal conference
22. Loveday C, Pomeroy L, et al.: human immunodeficiency viruses in patients attending a sexually transmitted disease clinic in London 1982-7. BMT 298(6671):419-422 Feb. 18, 1989
23. Hessol NA, et al.: incidence and prevalence of HIV infection among homosexual and bisexual men 1978-1988. [Abstract] in: Montreal Conference p.50

附 錄

1. 郵便調査用 設問書

본 설문조사는 선생님의 신분노출이 되지 않도록 무기명으로 작성 토록 되어 있으니 수고스럽지만 협조하여 주시기 바랍니다. 우리 모두가 걱정하는 에이즈(후천성면역결핍증) 감염자수가 이제 50명이 넘게 늘어 났습니다. 이 병은 성행위 뿐만 아니라 수혈 등 여러 경로를 통해 감염되며, 우리나라에서는 그동안 외국인을 상대로 하는 접객부, 외항선원, 외국장기체류자, 동성연애자 등이 감염된 것으로 나타나고 있습니다.

한국인구보건연구원에서는 에이즈로부터 우리 모두를 보호할 수 있는 방법을 찾기 위해 본 설문조사를 하게 되었으니 선생님께서 느끼시고 알고 계신대로 답하여 주시면 대단히 감사하겠습니다.

작성하신 설문서는 우표가 첨부되어 있는 봉투에 넣어 봉하신 후 우편함에 넣어 주시면 감사하겠습니다.

※ 다음 질문에 선생님께서 해당된다고 생각하시는 번호 앞 안에 V(체크) 표시를 하여 주시고, 또는 응답내용을 직접 기록하는 질문에는 간단하게 기록하여 주십시오.

1. 현재 나이는 만으로 몇세이며, 떠는 무슨 땡입니까?

나이 : 만 _____ 세, 떠 : _____

2. 학교는 어디까지 다니셨는지 해당되는 곳에 표시하여 주십시오.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ① 무 학 | <input type="checkbox"/> ② 국민학교중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ③ 국민학교졸업 | <input type="checkbox"/> ④ 중학교중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 중학교졸업 | <input type="checkbox"/> ⑥ 고등학교중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 고등학교졸업 | <input type="checkbox"/> ⑧ 전문학교중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 전문학교졸업 | <input type="checkbox"/> ⑩ 대학교중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑪ 대학교졸업 | <input type="checkbox"/> ⑫ 대학원이수 또는 이상 |

3. 현재 혼인상태는 어떤하십니까?

- ① 미 혼이다.
② 결혼생 활중이다 (재혼 포함)
③ 결혼했으나 별거중이거나 이혼 또는 사별하여 현재 독신이다.
④ 기타 (_____)

4. 현재 하시는 일 (직업)은 무엇입니까? (구체적으로 써 주십시오)

하시는 일 : _____

5. 에이즈라는 병에 대해 어느정도 알고 있다고 생각하십니까?

- └─① 잘 알고 있다.
② 잘 모른다 → 질문 7번부터 하여 주십시오.



6. 아래의 설명중 에이즈에 관해 맞는 것으면 0 표 ,틀리면 × 표를 ()안에 하여 주십시오.

- ① 에이즈 환자의 첫 증상은 감기나 몸살과 비슷하다. ()
- ② 임신한 여자가 에이즈에 걸려있다 하더라도 낳는 얘기는 에이즈에 걸리지 않는다. ()
- ③ 성행위를 할때 콘돔을 사용하면 콘돔이 파손되지 않는 한 거의 에이즈에 걸리지 않는다. ()
- ④ 에이즈 환자와 악수만하여도 에이즈에 걸릴 위험이 높다. ()
- ⑤ 주사기는 남이 안 쓴 새것의 1회용 주사기를 사용하는 것이 에이즈예방에 한 방법이다. ()

7. 에이즈 검사를 받아보신 적이 있습니까?

<input type="checkbox"/> ① 있다 →	어디에서 받으셨습니까?
<input type="checkbox"/> ② 없다	<input type="checkbox"/> ① 보건소 <input type="checkbox"/> ② 병·의원 <input type="checkbox"/> ③ 헌혈하면서 <input type="checkbox"/> ④ 기타(어디에서 : _____)

질문 10번부터 하여 주십시오

8. 검사를 받아 보시지 않은 이유는 무엇입니까? (해당되는 곳에 모두 표시 하십시오)

- ① 할 필요가 없다고 생각해서 하지 않았다.
- ② 검사받는 것이 창피해서
- ③ 결과가 두려워서
- ④ 어디서 하는지를 몰라서
- ⑤ 신분이 노출될까 두려워서
- ⑥ 기타(이유를 구체적으로 적어 주십시오 : _____)

9. 다음중 어떤 방법이라면 에이즈 검사를 받으시겠습니까?

- ① 가명으로 검사를 받고 전화로 결과를 알 수 있다면
- ② 신분을 밝히더라도 비밀이 보장된다면
- ③ 남의 눈에 띄지 않는 장소에서라면
- ④ 기타(어떤 방법 : _____)
- ⑤ 받을 필요가 없다고 생각한다.

10. 에이즈에 대한 계몽 홍보가 필요하다고 생각하십니까?

- ① 필요하다 → 어떤 방법으로 하는 것이 좋겠습니까?
(해당되는 곳에 모두 표시하십시오)
- ② 필요하지 않다.
- ③ 모르겠다.
- ① 에이즈 홍보용 인쇄물을 만들어 배포한다.
- ② 텔레비전, 라디오에서 방영한다.
- ③ 에이즈에 대해 상담할 수 있는 상담전화를 설치한다.
- ④ 에이즈에 대해 상담할 수 있는 상담소를 설치한다.
- ⑤ 사람이 많이 모이는 곳을 찾아 계몽한다.
- ⑥ 위의 모든 방법
- ⑦ 기타(어떤 방법 : _____)

11. 에이즈에 관한 계몽·홍보 인쇄물을 배포한다면 다음 어느곳에 하 는 것이 좋다고 생각하십니까?

- ① 보건의료시설(병원, 의원, 보건소, 약국, 조산소등)의 대 기실
- ② 시외 및 고속버스터미널의 대기실

- ③ 유흥음식점 (맥주홀 , 카바레 등) , 식당의 화장실내
- ④ 철도역 , 전철역내
- ⑤ 직장의 휴게실
- ⑥ 위의 모든 시설에
- ⑦ 기타 (어느곳 : _____)

12. 현재 에이즈에 대해 상담을 원하십니까?

<p><input type="checkbox"/> ① 상담을 원한다.</p> <p>○ 어떤 방법으로 하시기를 원하십니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ① 상담소가 있으면 찾아가서 <input type="checkbox"/> ② 상담전화가 있으면 전화로 <input type="checkbox"/> ③ 위 두가지 방법 모두 <input type="checkbox"/> ④ 기타 (어떤방법 : _____) <p>○ 상담소를 설치한다면 어느곳에 하는 것이 좋겠습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ① 특수병원 <input type="checkbox"/> ② 보건소와 같은 공공기관 <input type="checkbox"/> ③ 일반 병의원 <input type="checkbox"/> ④ 신분증 확인없이 출입이 자유롭고 일반에게 노출이 되지 않는장소 <p>□ ⑤ 기타 (어느곳 : _____)</p> <p>○ 상담은 어떤 사람이 해주기를 원하십니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ① 의사 <input type="checkbox"/> ② 간호사 <input type="checkbox"/> ③ 심리학자 <input type="checkbox"/> ④ 기타 (누구 : _____) 	<p><input type="checkbox"/> ② 원하지 않는다.</p> <p>상담을 원치 않는 이유는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ① 에이즈에 대해서 이미 잘 알고 있기 때문에 <input type="checkbox"/> ② 귀찮아서 <input type="checkbox"/> ③ 창피해서 <input type="checkbox"/> ④ 이미 검사에서 양성자로 나타났기 때문에 <input type="checkbox"/> ⑤ 에이즈에 감염될 기회가 전혀 없기 때문에 <input type="checkbox"/> ⑥ 특별한 이유가 없다. <input type="checkbox"/> ⑦ 기타 : _____
--	---

13. 동성연애를 처음 경험했을때

- 그때 선생님의 나이는 몇세이었습니까? 만_____세
- 그때 상대는 누구였습니까?
 - ① 친구
 - ② 선배
 - ③ 후배
 - ④ 친형
 - ⑤ 친동생
 - ⑥ 학교선생
 - ⑦ 외국인
 - ⑧ 같은 곳에 근무하는 동료(군인, 선원등)
 - ⑨ 처음 소개받았거나 우연히 만난사람(모르는 사람)
 - ⑩ 기타(누구: _____)

14. 동성연애를 하신지 얼마나 오래 되셨습니까?

동성연애기간 : _____년 _____월

15. 동성이거나 또는 이성과의 성접촉은 한달평균 몇회나 하십니까?

동성과 : _____회, 이성과 : _____회

16. 지난 1년간 몇사람의 서로 다른 동성과 또는 이성과 성접촉을 하셨습니까?

동성 : _____명, 이성 : _____명

17. 이성(여성)과의 성접촉을 하신분의 경우 성행위 대상은 누구였습니까? (해당되는 곳에 모두 표시하여 주십시오)

- ① 여자친구
- 2. 부인
- ③ 개인목적으로 교제한 여자
- ④ 이성과는 하지 않는다.
- ⑤ 기타(어떤 대상: _____)

18. 외국인과 동성연애를 하신 경험이 있습니까?

- ① 있다. ② 없다.

- 이제까지 외국사람과 동성연애를 한 사람은 어느 나라 사람이며, 각각 몇 명이나 되십니까?

나라이름 국 명
 국 명
 국 명

- 지난 1년간 몇 사람의 외국사람과 동성연애를 하셨습니까?

모두 : _____ 명

19. 동성연애시 성행위를 어떻게 하십니까?

(해당되는 곳에 모두 표시하십시오.)

- ① 키스 ② 서로 자위행위하여 주기
 ③ 입으로 하여 주기 ④ 다리사이에 넣어주기
 ⑤ 항문에 음경을 넣기
 ⑥ 기타(어떤방법 : _____)

20. 동성연애를 하시면서 상대방의 정액을 실수든 아니든 삼켜보신 적이 있습니까?

- ① 있다. ② 없다.
 ③ 그러한 성행위는 하지 않는다.

21. 동성연애시 콘돔을 어느정도 사용하십니까?

- ① 나와 상대방이 반드시 사용하도록 한다.
 ② 서로 사용하지 않는다.
 ③ 상대방의 사용에 관계없이 나는 반드시 사용한다.

④ 상대방은 반드시 사용토록 권유한다.

⑤ 기타 : _____

22. 과거에 히로뽕(향정신성 의약품)과 같은 것을 주사로 맞아보신 경험이 있습니까?

① 있다.
↓

② 없다.

○ 주사를 어떻게 맞았습니까?

① 자신이 직접 놓았다.

② 남으로부터 맞았다.

③ 자신이 놓기도 하고 남이 놓기도 하였다.

④ 기타 : _____

○ 주사기는 어떻게 사용하셨습니까?

① 1회용 새 주사기를 반드시 한사람에게만 사용했다.

② 1회용 주사기이지만 다른 사람과 같이 사용했다.

③ 소독하여 다른 사람과 같이 사용했다.

④ 기타 : _____

23. 선생님께서 건의 및 요구사항이 있으시면 각량하게 적어 주십시오.

* 대단히 감사합니다 *

2. 顧客調查用 設問書

* 다음 질문에 해당된다고 생각하시는 번호 앞 안에 V(체크) 표시를 하여 주시고, 또는 응답내용을 직접 기록하는 질문에는 간단하게 기록하여 주십시오.

1. 현재 나이는 만으로 몇세이며, 띠는 무슨띠입니까?

만나이 : _____ 세, 띠 : _____

2. 학교는 어디까지 다니셨는지 해당되는 곳에 표시하여 주십시오.

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ① 무학 | <input type="checkbox"/> ② 국민학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ③ 국민학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ④ 중학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 중학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑥ 고등학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 고등학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑧ 전문학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 전문학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑩ 대학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑪ 대학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑫ 대학원 이수 또는 이상 |

3. 현재 혼인상태는 어떤하십니까?

- ① 미혼이다. → 현재 결혼상대자 또는 애인(여성)이 있습니다?
① 있다. ② 없다.

- ② 결혼생활중이다.(재혼포함)

- ③ 결혼했으나 별거중이거나 이혼 또는 사별하여 현재 독신이다.

- ④ 기타(_____)

4. 현재 살고 계신곳은 어디십니까?

_____ 시·도 _____ 구·시·군

5. 현재 누구와 같이 살고 계십니까?

- ① 가족과 함께
② 혼자서 자취 또는 하숙
③ 다른사람과 같이 자취 또는 하숙
④ 기숙사에 거주
⑤ 기타 _____

6. 한달 평균수입은 현재 얼마나 되십니까?

원

7. 에이즈라는 병에 대해 알고 있다고 생각하십니까?

① 알고있다.

② 모르고 있다.

1) 에이즈(후천성 면역결핍증)라는 병에 대해 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ① 신문, 잡지 ② 텔레비전, 라디오 방송
 ③ 전문서적 ④ 친구, 선·후배, 직장동료
 ⑤ 의료기관을 통해 ⑥ 기타(어떤경로: _____)

2) 아래의 설문중 에이즈에 관해 맞는 것이면 ○표, 틀리면 ×표를 ·()안에 하여주십시오.

- ① 에이즈 환자의 첫 증상은 감기나 몸살과 비슷하다()
② 임신한 여자가 에이즈에 걸려있다 하더라도 낳는 얘기는 에이즈에 걸리지 않는다.()
③ 성행위를 할때 콘돔을 사용하면 콘돔이 파손되지 않는 한 거의 에이즈에 걸리지 않는다.()
④ 에이즈 환자와 악수만 하여도 에이즈에 걸릴 위험이 높다.()
⑤ 주사기는 남이 안쓴 1회용 새주사기를 사용하는 것이 에이즈 예방에 한 방법이다.()

8. 에이즈 검사를 받아보신 적이 있습니까?

- ① 있다. →
 ② 없다.

1) 어떻게 해서 받으셨습니까?

- ① 보건소에서 에이즈 검사를 받아보고 싶어서
 ② 병·의원에서 에이즈 검사를 받아보고 싶어서
 ③ 현혈하면서
 ④ 기타(어떻게 해서 : _____)

1) 검사를 받아보시지 않은 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 검사할 필요가 없다고 생각해서 하지 않았다.
 ② 검사받는 것이 창피해서
 ③ 검사결과가 두려워서
 ④ 어디서 하는지를 몰라서
 ⑤ 신분이 노출될까 두려워서
 ⑥ 기타(이유를 구체적으로 적어 주십시오 : _____)

9. 에이즈 검사를 편리하게 정기적으로 받을 수 있도록 하여 드린다면
검사를 받으시겠습니까?

- ① 받겠다.

- ② 받지 않겠다. ③ 모르겠다.

어떤 방법으로 검사해 드리면
좋겠습니까?

- ① 남에 눈에 띄지 않는 장
소에서 신분을 밝히지
않아도 된다면
 ② 남의 눈에 띄는 장소라
도 신분만 밝히지 않아
도 된다면

받지 않겠다고 하시는 가장 큰 이
유는 무엇입니까? (간단히 이유
를 적어 주십시오)

- ③ 신분을 밝히더라도 남의 눈에 띄지 않는 장소에 서라면
- ④ 신분도 밝히고, 남의 눈에 띄는 장소라도 편리하기만 하면
- ⑤ 모든 진료기관에서 본인의 요구에 따라 받을 수 있다면
- ⑥ 기타(어떤방법 : _____)

10. 현재 우리나라에도 에이즈 감염자가 늘어나고 있는데, 에이즈 감염에 대한 두려움을 어느정도 갖고 계십니까?

- ① 두렵다.
- ② 보통이다.
- ③ 두렵지 않다.

11. 에이즈 감염자중 동성연애자가 많다는 사실을 알고 계십니까?

- ① 알고 있다. ② 모르고 있다.

지금부터 동성연애를 하실때 에이즈 감염을 어떻게 예방하시겠습니까?

- ① 모르는 사람하고는 동성연애를 절대로 하지 않겠다.
- ② 동성연애를 할때마다 반드시 콘돔을 사용하겠다.
- ③ 외국인하고는 동성연애를 절대로 하지 않겠다.
- ④ 동성연애를 하지 않겠다.
- ⑤ 기타(어떻게 예방 : _____)

12. 현재 에이즈에 대해 상담을 원하십니까?

└─ ① 상담을 원한다.

1) 어떤 방법으로 하시기를 원하십니까?

- ① 상담소가 있으면 찾아가서
- ② 상담전화가 있으면 전화로
- ③ 위 두가지 방법 모두
- ④ 기타(어떤 방법; _____)

2) 상담소를 설치한다면 어느곳에 하는 것이 좋겠습니까?

- ① 특수병원에
 - ② 보건소와 같은 공공기관에
 - ③ 일반 병의원에
 - ④ 신분증 확인없이 출입이 자유롭고 일반에게 노출이 되지 않는 장소에
- ⑤ 기타(어느곳: _____)

3) 상담은 어떤 사람이 해주시기를 원하십니까?

- ① 의사 ② 간호사
- ③ 심리학자
- ④ 기타(누구: _____)

└─ ② 원하지 않는다.

2) 상담을 원치 않는 이유는 무엇입니까?

- ① 에이즈에 대해서 이미 잘 알고 있기 때문에
- ② 귀찮아서
- ③ 창피해서
- ④ 이미 검사에서 양성자로 나타났기 때문에
- ⑤ 에이즈에 감염될 기회가 전혀 없기 때문에
- ⑥ 특별한 이유가 없다
- ⑦ 기타: _____

13. 현재 에이즈에 대한 계몽, 홍보가 필요하다고 생각하십니까?

- ① 필요하다. ② 필요하지 않다. ③ 모르겠다.

1) 어떤 방법으로 계몽, 홍보를 하는 것이 좋겠습니까?

(해당되는 곳에 모두 표시하십시오)

- ① 에이즈 홍보용 인쇄물을 만들어 배포한다.
 ② 텔레비전, 라디오에서 방영한다.
 ③ 에이즈에 관하여 상담할 수 있는 상담전화를 설치한다.
 ④ 에이즈에 관하여 상담할 수 있는 상담소를 설치한다.
 ⑤ 사람이 많이 모이는 곳을 찾아 계몽한다.
 ⑥ 기타(어떤방법 : _____)

2) 에이즈에 관한 계몽, 홍보 인쇄물(책자, 팜프렛등)을 배포한다면 다음 어느곳에 하는 것이 가장 좋다고 생각하십니까?

- ① 보건의료시설(병원, 의원, 보건소, 약국, 조산소등)의 대기실
 ② 시외 및 고속버스터미널의 대기실 및 화장실
 ③ 유홍음식점(맥주홀, 카페, 캐바레등) 식당의 화장실내
 ④ 철도역, 전철역내
 ⑤ 직장의 휴게실
 ⑥ 위의 모든 시설에
 ⑦ 기타(어느곳 : _____)

14. 동성연애를 처음 경험했을때

1) 그때 나이는 몇세이었습니까? 만 _____ 세

2) 그때 무엇을 하셨습니까?

- ① 학교에 재학중이었다.
- ② 군복무중이었다.
- ③ 외국에 나가 있었다.(외항선원, 유학, 해외파견근무등)
- ④ 교도소에 있었다.
- ⑤ 뚜렷이 하는 일이 없었다.
- ⑥ 개인사업을 하고 있었다.
- ⑦ 직장에 다니고 있었다.
- ⑧ 기타(어떤일 _____)

3) 그때 상대는 누구였습니까?

- ① 친구 ② 선배 ③ 후배 ④ 친척
- ⑤ 학교선생 ⑥ 외국인
- ⑦ 같은 곳에 근무하는 동료(군인, 선원등)
- ⑧ 처음 소개 받았거나 우연히 만난사람(업소에 온 사람등)
- ⑨ 기타(누구: _____)

15. 지금까지 동성연애를 하신 기간은 얼마나 되십니까?

동성연애를 하신 기간: _____ 년 _____ 개월

16. 동성(남자끼리) 또는 이성(여자)과의 성 접촉은 한달평균 몇 회나 하십니까? (해당되는 회수에 표시하십시오)

<u>성접촉 횟수</u>	<u>동성끼리만 하는 경우</u>	<u>이성과도 하는 경우</u>
① 1 ~ 3회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 4 ~ 6회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 7 ~ 9회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 10 ~ 12회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 13 ~ 15회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 16 ~ 20회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 21회이상 몇회(_____회)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. 지난 1년간 대략 몇 사람의 서로 다른 동성과 또는 이성과 성행위를 하셨습니까?

동성 : _____ 명, 이성 : _____ 명

18. 이성(여성)과의 성행위를 하신분의 경우 성행위 대상은 누구였습니까? (해당되는 곳에 모두 표시하여 주십시오)

- ① 여자친구
- ② 부인
- ③ 개인목적으로 교제한 여자
- ④ 이성과는 하지 않는다.
- ⑤ 기타(어떤 대상 : _____)

19. 평상시 동성연애를 할때 성행위를 어떻게 하십니까? (해당되는 곳에 모두 표시 하십시오)

1) 자극부위 : ① 키스

- ② 서로 손으로 하여주기
- ③ 입으로 하여주기
- ④ 허벅지 사이에 넣어 주기
- ⑤ 항문에 음경을 넣기
- ⑥ 항문에 손을 넣어주기
- ⑦ 항문에 인조음경을 넣기
- ⑧ 기타(_____)

2) 자세 : ① 주로 수동적이다.(여성역할)

- ② 주로 능동적이다.(남성역할)
- ③ 상황에 따라 모두 한다.
- ④ 기타(어떻게 ; _____)

20. 동성연애를 하시면서 상대방의 정액을 실수든 아니든 삼켜보신 적이 있습니까?

- ① 있다.
- ② 없다.

21. 항문 성행위시 콘돔을 어느정도 사용하십니까?

- ① 나와 상대방이 반드시 사용하도록 한다.
- ② 서로 사용하지 않는다.
- ③ 상대방의 사용에 관계없이 나는 반드시 사용한다.
- ④ 상대방이 반드시 사용하도록 권유한다
- ⑤ 기타 (_____)
- ⑥ 항문 성행위는 하지 않는다.

22. 입으로 성행위를 할때 콘돔을 어느정도 사용하십니까?

- ① 나와 상대방이 반드시 사용하도록 한다.
- ② 서로 사용하지 않는다.
- ③ 상대방의 사용에 관계없이 나는 반드시 사용한다.
- ④ 상대방이 반드시 사용도록 권유한다.
- ⑤ 기타 (_____)
- ⑥ 입으로는 성행위를 하지 않는다.

23. 동성연애의 상대방을 어떻게 선택하십니까?

- ① 처음 만난 사람과도 의사만 통하면 누구하고도 한다.
- ② 처음 만난 사람하고는 절대로 하지 않는다.
- ③ 처음 만난 사람일지라도 소개해준 사람을 믿고 한다.
- ④ 기타 (_____)

24. 동성연애를 시작한 후 다음 성병중 감염된 것이 있으시면 표시해 주십시오.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ① 임질 | <input type="checkbox"/> ② 매독 |
| <input type="checkbox"/> ③ 비임균성 요도염 | <input type="checkbox"/> ④ 허피스 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 연성하감 | <input type="checkbox"/> ⑥ 기타 (_____) |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 없다. | |

25. 외국인과 동성연애를 하신 경험이 있습니까?

① 있다.

② 없다.

- 1) 이제까지 외국사람과 동성연애를 한 사람은 어느나라 사람이며,
각각 몇 명이나 되십니까?

나라 이름

동성연애자수

_____ 국

_____ 명

26. 외국에 갔다오신 경험이 있습니까?

① 있다.

② 없다.

- 1) 어느나라에 몇번이나 갔다 오셨으며, 그때 그 나라사람과 동성
연애를 하신 경험이 있습니까?

외국에 간 일자

나라이름

동성연애여부

19 _____년 _____월 _____국 ① 하였다 ② 하지 않았다

19 _____년 _____월 _____국 ① 하였다 ② 하지 않았다

19 _____년 _____월 _____국 ① 하였다 ② 하지 않았다

19 _____년 _____월 _____국 ① 하였다 ② 하지 않았다

- 2) 외국에 가셔서 동성연애를 하신 분의 경우 주로 어떻게 상대자
를 만나게 되셨는지 간략하게 적어 주십시오.
-
-
-

27. 아래에 기록한 것 중 사용해 보신 경험이 있으십니까?

1) 마리화나

- ① 피워본 적이 있다. ② 전혀 없다.

2) 히로뽕

- ① 주사를 맞아본 적이 있다. ② 전혀 없다.

3) 기타 마약계통

- ① 사용해 본적이 있다. ② 전혀 없다.

무엇을 사용하셨습니까? _____

1) (히로뽕 주사를 맞으신 분의 경우) 어떻게 주사를 맞으셨습니까?

- ① 자신이 직접 놓았다. ② 남으로부터 맞았다.

- ③ 자신이 놓기도 하고 남이 놓기도 하였다.

④ 기타 : _____

2) 주사기는 어떻게 사용하셨습니까?

- ① 1회용 새 주사기를 반드시 한사람에게만 사용했다.

- ② 1회용 주사기를 다른 사람과 같이 사용했다.

- ③ 소독하여 다른 사람과 같이 사용했다.

④ 기타 : _____

3. 業主 및 從業員用 設問書

* 다음 질문에 해당된다고 생각하시는 번호 앞 안에 V(체크) 표시를 하여 주시고, 또는 응답을 기록하는 경우 간단하게 써 주십시오.

1. 현재 나이는 만으로 몇세이며, 띠는 무슨띠입니까?

만나이 : _____ 세, 띠 : _____

2. 현재 거주하고 계신 곳은 어디입니까?

- ① 근무하고 있는 업소 근처에 거주하고 있다.
- ② 근무하고 있는 업소내에 거주하고 있다.
- ③ 서울시 _____ 구에 거주하고 있다.
- ④ 기타지역 (_____ 시 · 도 _____ 시 · 구 · 군)에 거주하고 있다.

3. 학교는 어디까지 다니셨는지 해당되는 곳에 표시하여 주십시오.

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ① 무학 | <input type="checkbox"/> ② 국민학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ③ 국민학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ④ 중학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 중학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑥ 고등학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 고등학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑧ 전문학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑨ 전문학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑩ 대학교 중퇴 |
| <input type="checkbox"/> ⑪ 대학교 졸업 | <input type="checkbox"/> ⑫ 대학원 이수 또는 이상 |

4. 현재 혼인상태는 어떠하십니까?

- ① 미혼이다. → 현재 결혼상대자 또는 애인(여성)이 있습니까?

① 있다

② 없다

② 결혼생활중이다(재혼포함)

③ 결혼했으나 별거중이거나 이혼 또는 사별하여 현재 독신이다.

④ 기타(_____)

5. 현재의 업소에서 하시는 일은 무엇입니까?

① 본 업소의 주인이다 ② 본 업소의 지배인이다.

③ 본 업소의 종업원이다. ④ 기타(_____)

6. 동성연애자들이 이용하는 술집에 종사하신 기간은 얼마나 오래 되셨습니까?

종사기간: _____년 _____개월

7. 지금과 같은 업소(동성연애자 전용술집)에 근무하시게 되었을때,

1) 근무하시게된 가장 큰 이유는?

① 경제적으로 수입이 좋을것 같아서

② 동성연애를 하기 때문에 좋을것 같아서

③ 아는 사람의 소개로

④ 우연히

⑤ 기타(어떤이유: _____)

2) 근무하시기 전에 동성연애 경험이 있으셨습니까?

① 있다 ② 없다

3) 근무하시기전에 동성연애자 전용 술집이라는 것을 알고 취업 하셨습니까?

① 알고 하였다. ② 모르고 하였다.

8. 지금과 같은 업소(동성연애자들이 이용하는 술집)에 종사하기 전에는 무슨 일을 하셨습니까? 하셨던 일을 간단하게 모두 적어 주십시오.

하셨던 일(직업) : _____

9. 현재의 직업에 대해 얼마나 만족하고 계십니까?

- ① 만족한다. ② 보통이다.
 ③ 불만이다.

10. 앞으로의 희망(하시고 싶은 일)은 무엇입니까?

하시고 싶은 일(직업) : _____

11. 현재 한달평균 수입이 수입원별로 대략 얼마나 되십니까?

해당되는 수입원에 금액을 기재하여 주십시오.

수 입 원	수 입 액
월 급	_____ 원
보너스	_____ 원
능율급	_____ 원
팁	_____ 원
기타	_____ 원

12. 에이즈라는 병에 대해 알고 있다고 생각하십니까?

- ① 알고 있다 ② 모르고 있다

1) 에이즈(후천성 면역결핍증)라는 병에 대해 어떤 경로를 통해 알게 되셨습니까?

- ① 신문, 잡지 ② 텔레비전, 라디오 방송
 ③ 전문서적 ④ 친구, 선·후배, 직장동료
 ⑤ 의료기관을 통해 ⑥ 기타(어떤경로 : _____)

2) 아래의 설문중 에이즈에 관해 맞는 것이면 ○표, 틀리면 ×표를 ()안에 하여 주십시오.

- ① 에이즈 환자의 첫 증상은 감기나 몸살과 비슷하다.()
- ② 임신한 여자가 에이즈에 걸려있다 하더라도 낳는 애기는 에이즈에 걸리지 않는다.()
- ③ 성행위를 할때 콘돔을 사용하면 콘돔이 파손되지 않는 한 거의 에이즈에 걸리지 않는다()
- ④ 에이즈 환자와 악수만 하여도 에이즈에 걸릴 위험이 높다()
- ⑤ 주사기는 남이 안 쓴 1회용 새주사기를 사용하는 것이 에이즈 예방에 한 방법이다()

13. 에이즈 검사를 받아보신 적이 있습니까?

- | | |
|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ① 있다 → | 1) 어떻게 해서 받으셨습니까? |
| <input type="checkbox"/> ② 없다 | <input type="checkbox"/> ① 보건소에서 건강진단 수첩을 발급받기 위해서 |
| | <input type="checkbox"/> ② 병·의원에서 에이즈 검사를 받아보고 싶어서 |
| | <input type="checkbox"/> ③ 헌혈하면서 |
| | <input type="checkbox"/> ④ 기타(어떻게 해서 : _____) |

1) 검사를 받아보시지 않은 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 검사할 필요가 없다고 생각해서 하지 않았다
- ② 검사받는 것이 창피해서
- ③ 검사결과가 두려워서
- ④ 어디서 하는지를 몰라서
- ⑤ 신분이 노출될까 두려워서
- ⑥ 기타(이유를 구체적으로 적어 주십시오 : _____)

14. 에이즈 검사를 편리하게 정기적으로 받을 수 있도록 하여 드린다면
검사를 받으시겠습니까?

① 받겠다

어떤 방법으로 검사해 드리면 좋겠습니까?

① 남의 눈에 띄지 않는 장소에서 신분을 밝히지 않는다면

② 남의 눈에 띄는 장소라도 신분만 밝히지 않는다면

③ 신분을 밝히더라도 남의 눈에 띄지 않는 장소에 서라면

④ 신분도 밝히고, 남의 눈에 띄는 장소라도 편리하기만 하면

⑤ 오늘과 같이 업소에 와서 해주었으면

⑥ 기타(어떤 방법 ; _____)

② 받지 않겠다 ③ 모르겠다

받지 않겠다고 하시는 가장 큰 이유는 무엇입니까? (간단히 이유를 적어 주십시오)

20. 현재 에이즈에 대한 계몽, 홍보가 필요하다고 생각합니까?

- ① 필요하다. ② 필요하지 않다 ③ 모르겠다

1) 어떤 방법으로 계몽, 홍보를 하는것이 좋겠습니까?

(해당되는 곳에 모두 표시하십시오.)

- ① 에이즈 홍보용 인쇄물을 만들어 배포한다.
 ② 텔레비전, 라디오에서 방영한다.
 ③ 에이즈에 대해 상담할 수 있는 상담전화를 설치한다.
 ④ 에이즈에 대해 상담할 수 있는 상담소를 설치한다.
 ⑤ 사람이 많이 모이는 곳을 찾아 계몽한다.
 ⑥ 기타(어떤방법 : _____)

2) 에이즈에 관한 계몽, 홍보 인쇄물(책자, 팜프렛등)을 배포한다면 다음 어느곳에 하는 것이 가장 좋다고 생각하십니까?

- ① 보건의료시설(병원, 의원, 보건소, 약국, 조산소등)의 대기실
 ② 시외 및 고속터미널의 대기실 및 화장실
 ③ 유흥음식점(맥주홀, 카페, 캐바레등), 식당의 화장실내
 ④ 철도역, 전철역내
 ⑤ 직장의 휴게실
 ⑥ 위의 모든 시설에
 ⑦ 기타(어느곳 : _____)

16. 현재 우리나라에도 에이즈 감염자가 늘어나고 있는데, 에이즈 감염에 대한 두려움을 어느정도 갖고 계십니까?

- ① 두렵다
 ② 보통이다
 ③ 두렵지 않다.

17. 현재 에이즈에 대해 상담을 원하십니까?

① 상담을 원한다.

1) 어떤 방법으로 하시기를 원하십니까?

① 상담소가 있으면 찾아가서

② 상담전화가 있으면 전화로

③ 위 두가지 방법 모두

④ 기타(어떤방법 : _____)

2) 상담소를 설치한다면 어느 곳에 하는 것이 좋겠습니까?

① 특수병원에

② 보건소와 같은 공공기관에

③ 일반 병의원에

④ 신분증 확인없이 출입이 자유롭고 일반에게 노출이 되지 않는 장소에

⑤ 기타(어느곳 : _____)

3) 상담은 어떤 사람이 해주시기를 원하십니까?

① 의사 ② 간호사

③ 심리학자

④ 기타(누구 : _____)

② 원하지 않는다.

2) 상담을 원치 않는 이유는 무엇입니까?

① 에이즈에 대해서 이미 잘알고 있기 때문에

② 귀찮아서

③ 창피해서

④ 이미 검사에서 양성자로 나타났기 때문에

⑤ 에이즈에 감염될 기회가 전혀없기 때문에

⑥ 특별한 이유가 없다

⑦ 기타 : _____

18. 동성연애를 처음 경험하였을때,

- 1) 그때 나이는 몇세이었습니까? 만 _____ 세
- 2) 그때 무엇을 하셨습니까?
- ① 학교에 재학중이었다.
 - ② 군복무중이었다.
 - ③ 외국에 나가 있었다.(외항선원 , 유학 , 해외파견근무 등)
 - ④ 현재의 업소와 유사한 업소에 종사하고 있었다.
 - ⑤ 뚜렷이 하는 일이 없었다.
 - ⑥ 개인사업을 하고 있었다.
 - ⑦ 직장에 다니고 있었다.
 - ⑧ 기타(어떤일 _____)

3) 그때 상대는 누구였습니까?

- ① 친구 ② 선배 ③ 후배 ④ 친척
- ⑤ 학교선생 ⑥ 외국인
- ⑦ 같은 곳에 근무하는 동료(군인 , 선원등)
- ⑧ 처음 소개 받았거나 우연히 만난사람(업소에 온 사람등)
- ⑨ 기타(누구 : _____)

19. 지금까지 동성연애를 하신 기간은 얼마나 되십니까?

동성연애를 하신 기간 : _____ 년 _____ 개월

20. 현재 동성연애 대상자는 누구입니까? (해당되는 곳에 모두 표시하
십시오)

- ① 근무하고 있는 업소에 오는 손님
- ② 근무하고 있는 업소에는 오지 않으나 다른 업소에 오는 손님
- ③ 같은 업에 종사하는 종업원
- ④ 다른 사람의 소개로 만나는 사람
- ⑤ 극장, 사우나등 동성연애자들이 많이오는 장소(술집제외)에서 만나는
사람
- ⑥ 기타(누구 : _____)

21. 에이즈 감염자중 동성연애자가 많다는 사실을 알고 계십니까?

① 알고 있다.

② 모르고 있다.

지금부터 동성연애를 하실때 에이즈 감염을 어떻게 예방하시겠습니까?

① 모르는 사람하고는 동성연애를 절대로 하지 않겠다.

② 동성연애를 할때마다 반드시 콘돔을 사용하겠다

③ 외국인하고는 동성연애를 절대로 하지 않겠다

④ 동성연애를 하지 않겠다

⑤ 기타(어떻게 예방 : _____)

22. 동성(남성끼리) 또는 이성(여자)과의 성 접촉은 한달평균 몇회나 하십니까? (해당되는 회수에 표시하십시오)

성접촉횟수	동성끼리만 하는 경우	이성과도 하는 경우
① 1 ~ 3회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 4 ~ 6회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 7 ~ 9회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 10 ~ 12회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 13 ~ 15회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 16 ~ 20회	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 21회이상 몇회(____회)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. 지난 1년간 대략 몇사람의 서로 다른 동성과 또는 이성과 성행위를 하셨습니까?

동성 : _____명, 이성 : _____명

24. 이성(여성)과의 성행위를 하신분의 경우 성행위 대상은 누구였습니까? (해당되는 곳에 모두 표시하여 주십시오)

- ① 여자친구
- ② 부인
- ③ 개인목적으로 교제한 여자
- ④ 이성과는 하지 않는다
- ⑤ 기타(어떤대상 : _____)

25. 평상시 동성연애를 할때 성행위를 어떻게 하십니까?

(해당되는 곳에 모두 표시하십시오)

1) 자극부위 : ① 키스

- ② 서로 손으로 하여 주기
- ③ 입으로 하여주기
- ④ 허벅지 사이에 넣어 주기
- ⑤ 항문에 음경을 넣기
- ⑥ 항문에 손을 넣어주기
- ⑦ 항문에 인조음경을 넣기
- ⑧ 기타(_____)

2) 자세 : ① 주로 수동적이다(여성역할)

- ② 주로 능동적이다(남성역할)
- ③ 상황에 따라 모두 한다
- ④ 기타(어떻게 : _____)

26. 동성연애를 하시면서 상대방의 정액을 실수든 아니든 삼켜보신 적이 있습니까?

- ① 있다.
- ② 없다.

27. 항문 성행위시 콘돔을 어느정도 사용하십니까?

- ① 나와 상대방이 반드시 사용하도록 한다
- ② 서로 사용하지 않는다
- ③ 상대방의 사용에 관계없이 나는 반드시 사용한다
- ④ 상대방은 반드시 사용토록 권유한다
- ⑤ 기타 (_____)
- ⑥ 항문 성행위는 하지 않는다

28. 입으로 성행위를 할때 콘돔을 어느정도 사용하십니까?

- ① 나와 상대방이 반드시 사용하도록 한다
- ② 서로 사용하지 않는다.
- ③ 상대방의 사용에 관계없이 나는 반드시 사용한다.
- ④ 상대방은 반드시 사용토록 권유한다.
- ⑤ 기타 (_____)
- ⑥ 입으로 성행위를 하지 않는다.

29. 동성연애의 상대방을 어떻게 선택하십니까?

- ① 처음 만난 사람과도 의사만 통하면 누구하고도 한다.
- ② 처음 만난 사람하고는 절대로 하지 않는다.
- ③ 처음 만난 사람일지라도 소개해준 사람을 믿고 한다.
- ④ 기타 (_____)

30. 동성연애를 시작한 후 다음 성병중 감염된 것이 있으시면 표시해 주십시오.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> ① 임질 | <input type="checkbox"/> ② 매독 |
| <input type="checkbox"/> ③ 비임균성 요도염 | <input type="checkbox"/> ④ 허피스 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 연성하감 | <input type="checkbox"/> ⑥ 기타 (_____) |
| <input type="checkbox"/> ⑦ 없다 | |

31. 업소에 오는 손님이나 다른 사람의 소개로 만나 동성연애를 할때 상대자로부터 대가(팁)를 받는 경우가 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

1) 대가를 받는 경우가 한 달 평균 몇 번이나 있습니까? _____ 회

2) 1회 평균 대가로 얼마나 받으십니까? _____ 원

3) 외국인의 경우도 대가가 같습니까?

- ① 같다. ② 더 많다
 ③ 더 적다 ④ 외국인과는 하지 않는다

32. 업소를 찾아오는 손님 가운데 본인과 매우 친하기 때문에 오는 단골 손님이 계십니까?

- ① 있다 ② 없다

그분들의 연령계층별로 몇 명이나 되며, 그중 결혼하신 분은 몇 명이나 되는지 기록하여 주십시오.

연령계층	명 수	결혼한 사람수
20 대	_____ 명	_____ 명
30 대	_____ 명	_____ 명
40 대	_____ 명	_____ 명
50 대	_____ 명	_____ 명

33. 다음에 기술한 내용 중 맞는다고 생각되시는 것에는 ○ 표, 틀리면 × 표를 ()에 하여 주십시오.

- 1) 업소에 오는 손님간에 서로 동성연애 파트너가 되기도 한다.
()
- 2) 업소에 오는 내국인 손님과 외국인 손님간에 서로 동성연애 파트너가 되기도 한다()

- 3) 업소에 근무하는 종업원과 업소에 오는 내국인 손님과 서로 동성연애 파트너가 되기도 한다()
- 4) 업소에 근무하는 종업원과 업소에 오는 외국인 손님과 서로 동성연애 파트너가 되기도 한다()
- 5) 종업원이 업소에 오는 손님간에 서로 동성연애 파트너가 되도록 소개를 해주는 경우도 있다()
- 6) 종업원이 업소에 오는 내국인 손님과 외국인 손님간에 서로 동성연애 파트너가 되도록 소개해 주는 경우도 있다()
- 7) 업소에 오는 외국인 손님과 다른 업소에 근무하는 종업원간에 서로 동성연애 파트너가 되도록 소개해 주는 경우도 있다()

34. 외국인과 동성연애를 하신 경험이 있습니까?

① 있다

② 없다

- 1) 이제까지 외국사람과 동성연애를 한 사람은 어느나라 사람이며, 각각 몇명이나 되십니까?

나 라 이 름

동성연애자수

_____ 국

_____ 명

_____ 국

_____ 명

_____ 국

_____ 명

_____ 국

_____ 명

- 2) 지금까지 외국인과 동성연애를 하신 경우 주로 어떻게 상대자를 만나게 되었습니까?

① 근무하는 업소에서 주로 만났다.

② 근무하는 업소외의 다른 장소에서 주로 소개로 만났다.

③ 근무하는 업소외의 다른 장소에서 우연히 만났다.

④ 기타(어떻게 : _____)

35. 외국에 갔다오신 경험이 있습니까?

① 있다

② 없다

- 1) 어느나라에 몇번이나 갔다 오셨으며, 그때 그 나라사람과 동성연애를 하신 경험이 있습니까?

외국에 간 일자	나라이름	동 성 연 애 여 부
----------	------	-------------

19__년__월 ____국 ① 하였다 ② 하지 않았다

- 2) 외국에 가셔서 동성연애를 하신 분의 경우 주로 어떻게 상대자를 만나게 되셨는지 간략하게 적어 주십시오.
-
-
-

36. 아래에 기록한 것 중 사용해 보신 경험이 있으십니까?

- 1) 마리화나

① 피워본 적이 있다 ② 전혀없다

- 2) 히로뽕

① 주사를 맞아본 적이 있다. ② 전혀없다.

- 3) 기타 마약계통

① 사용해 본적이 있다. ② 전혀없다

→ 무엇을 사용하셨습니까? _____

→ 1) (히로뽕 주사를 맞으신 분의 경우) 어떻게 주사를 맞으셨습니까?

- ① 자신이 직접 놓았다.
- ② 남으로부터 맞았다.
- ③ 자신이 놓기도 하고 남이 놓기도 하였다.
- ④ 기타 : _____

2) 주사기는 어떻게 사용하셨습니까?

- ① 1회용 새 주사기를 반드시 한 사람에게만 사용했다.
- ② 1회용 주사기이지만 다른 사람과 같이 사용했다.
- ③ 소독하여 다른 사람과 같이 사용했다.
- ④ 기타 : _____

37. 현재 건강진단수첩(보건증)을 가지고 계십니까?

① 가지고 있다

1) 현재 가지고 있는 건강진단수첩은 언제 발급을 받으셨습니까?

발급받은일자 : 19____년____월

2 없다

1) 건강진단수첩을 발급받지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 어디서 어떻게 발급받아야 하는지를 몰라서
- ② 발급받지 않아도 될 것 같아서
- ③ 발급 받으면 오히려 귀찮을 것 같아서
- ④ 기타(이유 : _____)

HIV 感染의 高危險集團(同性戀愛者) 實態調查
報告書 — 서울地域을 中心으로 —

1990년 12월 일 인쇄

1990년 12월 일 발행

발행인: 지 달 현

발행처: 한국보건사회연 구원

서울특별시 은평구 불광동 산 42-14

전화 355-8003~7

인쇄처: 상지문화사 (273-9081)

(비 매 품)

