


## Countermeasures for Prevention of Adolescent Alcohol Use



1. (18 ~ 64 )  
 ( )  
 15.9% ( 8.1%, 13.1%)  
 , 25.2%, 6.3%  
 4 2)  
 가 10 20

1) : 가 , 가 , : 12  
 2) (2001),<sup>F</sup> ( : (2001),<sup>F</sup> )<sup>ㅁ</sup>

( 57.7%, 69.0%) 14

가 5.4 가

가

74.4%( 57.8%) 가

(52.0%) 가 가 5).

51.6% 31.3% 가

44.9% 가 3).

4).

(性) 6).

가 21

3) (2004. 11), 7

4) (2000), 7 가

5) U.S(Nov. 2003), " Department of Health and Human services", Underage drinking and the future of children.

6) (2000), 7

1)

가 ,

가

7).

가

8 4

가 26

(19 가 )

4 4

2.

( )

가 ( 1 )

가 가

8).

가 가

9).

7) NIAAA(July, 1997), Alcohol Alert, No. 37.

8). National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, " Preventing Alcohol Abuse and Dependence ", NIAAA Social Work Education Module 3, 2004.

9). (2004. 12), 7 2004 가

1.

		-
		( 3 , 4 , 5 )
		- 가 (27 ).
		- ( 9 ).
		- ( 11 )
		- ( 8 )
		- ( 10 )
		- (4 ).
		- ( )
		- ( 3 ).
		- ( 19 )

2)

(1)

2010  
(Health Plan 2010)

TV,

10)

2004

31

10)

가

(2)

가 . . . . . 가 6  
가 , 2004  
2003  
가 , 2004  
가 . 가  
2002  
2000

CD가

(3)

( , 가 , )

가

가

(2002)

(4)

NGO

NGO

가

가

가 , 가 , 가 가 가

11) . , , 가 가 .

( NGO)

1)

3.

- : 가 가

12) , , 가 가 가

- : , , 가

가

11) (2003), ㅁ

12) National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism(2004), "Preventing Alcohol Abuse and Dependence", NIAAA Social Work Education Module 3.

가

- : , NGO

가

- : 가 , , 가

2)

가

가 가 가 가

가 13)

3)

(CDC)

13) (2000), ㅁ

가  
가 가  
가 가

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 가
- (impairments, )
- 가
- 가

- 
- 
- 
- 
- 

가

가

가

- 
- \* 가 가
- 
- 
- 가 ,

- 가 , ,
- 
- 
- 가 , 가
- 가

4.

가

가

가

가